


272



272F

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

## آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل سال ۱۳۹۳

دسته‌بندی  
گیاهان زینتی (کد ۲۴۰۸)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت، اصول تولید گیاهان باغیانی، زنتیک و اصلاح گیاهان باغیانی، تغذیه و متابولیسم گیاهان باغیانی، فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی، اصلاح گل و گیاهان زینتی)	۸۰	۱	۸۰

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از بروزگاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌نمود.

- کدام یک از محصولات زیر نیاز به خنک کردن اولیه (pre-cooling) ندارند؟  
 ۱) پرتقال و نارنگی      ۲) پیاز و سبب زمینی      ۳) توت و توت فرنگی      ۴) کاهو و اسفناج  
 قهوه‌ای شدن اکسیداتیو توسط کدام یک از آنزیمه‌های زیر انجام می‌شود و ماده قهوه‌ای تولید شده چه نام دارد؟  
 ۱) کلروفیلاز - ملاتین      ۲) پکتیناز - تیروزین      ۳) پلی فل اکسیداز - ملاتین      ۴) پراکسیداز - ملاتین  
 بهترین شاخص برای تشخیص مرحله بلوغ میوه کیوی کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟  
 ۱) مقدار نشاسته      ۲) تغییر رنگ زمینه      ۳) سفتی میوه      ۴) درصد مواد جامد محلول  
 مقدار اکسیژن کم و  $\text{CO}_2$  بالا چه تأثیری بر کیفیت محصولات نگهداری شده در سردخانه دارد؟  
 ۱) عامل تخمیر و تجمع اتانول و الدهید استیک خواهد شد.  
 ۲) عامل تنفس بالا و مصرف زیاد قندها خواهد شد.  
 ۳) سبب حفظ سلامتی میوه‌ها و ماندگاری آن تا مدت دلخواه خواهد شد.  
 ۴) سبب افزایش فسفوریل‌اسیون و کاهش تنفس و افزایش فتوسنتز در سبزی‌های برگی خواهد شد.
- کدام یک از موارد زیر دارای شکل تنفسی از نوع غیر فرازگرا می‌باشد؟  
 ۱) سیرهای برگی      ۲) مرکبات، توت فرنگی و سبب  
 ۳) تاماریلو، انگور و گیلاس      ۴) میوه سنجد، گل ساعتی، آواکادو  
 برای شکستن کدام یک از ترکیبات زیر آنزیمه‌های لازم در بدن انسان ساخته می‌شود؟  
 ۱) سلولز      ۲) همی سلولز      ۳) نشاسته  
 قندهای پنج کربنی      ۴) تنفس فرازگرا همزمان با مرحله ..... صورت می‌گیرد.
- ۱) رسیدن      ۲) بالغ شدن      ۳) تقسیم یاخته  
 کدام دسته از آنزیمه‌های زیر، در فرایند تنفس نوری در کلروپلاست مشارکت دارند؟  
 ۱) فسفوگلیکولات فسفاتاز، گلیسرین دکربوکسیلاز، کاتالاز  
 ۲) رابیسکو، فسفوگلیکولات فسفاتاز، گلیرات کیناز  
 ۳) رابیسکو، گلیکولات اکسیداز، سرین آمینوترانسفراز  
 ۴) گلسرین دکربوکسیلاز، گلیرات کیناز، گلی اوکسیلات آمینو ترانسفراز  
 رشد گیاهانی که نور ماوراء بنفس دریافت می‌کنند چگونه است؟  
 ۱) دارای برگ‌های کوچک و ساقه بلند خواهند بود.  
 ۲) دارای برگ‌های ضخیم و ساقه متراکم و کوتاه خواهند بود.  
 ۳) در ارتفاعات شدت این نور بیشتر بوده و موجب تولید گیاهان بلند قامت می‌شود.  
 ۴) شدت این نور در مناطق پست بیشتر از ارتفاعات بوده و بنابراین گیاهان این مناطق بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
- اگر برای تولید هر مول ATP، معادل ۳ کیلوژول، و برای تولید هر مول NADPH، معادل ۲۰۰ کیلوژول انرژی لازم باشد، برای سنتز یک مول گلیسر آلدید تری فسفات از ۶ مول  $\text{CO}_2$  در چرخه کلوبین، به چند کیلوژول انرژی نیاز است؟  
 ۱) ۱۳۸۰      ۲) ۱۹۸۰      ۳) ۱۴۷۰      ۴) ۲۰۷۰
- غلظت مورد انتظار کلسیم در سلولی براساس معادله نرنسن، ۱۴۰۰ میلی مولار محاسبه شده است، در صورتی که غلظت واقعی اندازه‌گیری شده ۳ میلی مولار بوده است. این تفاوت نشان‌دهنده چیست؟  
 ۱) جذب کلسیم فعال بوده است.  
 ۲) کلسیم به صورت غیر فعال به داخل و خارج سلول منتشر می‌شود.  
 ۳) کلسیم به صورت فعال به خارج سلول پمپ شده است.  
 ۴) با اطلاعات داده شده، امکان تعیین فعال یا غیر فعال بودن انتقال کلسیم میسر نمی‌شود.
- در اکسیداسیون ماده آلتی در رابطه مقابل:  $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5 + 3\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{Energy}$  مقدار کسر تنفسی (RQ) چقدر است؟  
 ۱) ۰/۵      ۲) ۰/۷۵      ۳) ۱/۳      ۴) ۱/۳۳
- انرژی آزاد و آنتروپی در کل سیستم‌های بیولوژیک به ترتیب به سمت ..... و ..... پیش می‌روند.  
 ۱) افزایش - کاهش      ۲) افزایش - افزایش      ۳) کاهش - کاهش      ۴) کاهش - افزایش
- $\text{H}^+ - \text{ATPase}$  و اکوئلی، یک پمپ ..... و پمپ  $\text{H}^+ / \text{K}^+$  یک پمپ ..... است.
- ۱) الکتروژنی - الکترونوتراال - الکترونوتراال      ۲) الکترونوتراال - الکتروژنی      ۳) اکسترونوتراال - الکترونوتراال      ۴) اکسترونوتراال - الکتروژنی
- علت اصلی مقاومت خوب درختان خرما نسبت به شوری چیست؟  
 ۱) درخت خرما NaCl را به کلی جذب نمی‌کند.  
 ۲) خروج املاح از سطح برگ‌های درخت خرما  
 ۳) حذف یون سدیم در مراحل جذب از محلول خاک و یا جذب کمتر این عنصر  
 ۴) حذف یون کلر در مراحل جذب از محلول خاک و یا جذب کمتر این عنصر

-۱۶

میزان حساسیت به سرما در کدام یک از مرکبات زیر کمتر است؟

(۱) Citrus reticulata (۴) Citrus aurontifolia (۳) Citrus medica (۲) Citrus limon

-۱۷

چرا انگور رقم تامسون سیدلیس را باید به صورت بلند یا مختلط هرس کرد؟

(۱) چون این رقم جوانه‌های پایین شاخه پکساله، خوش تولید کند.

(۲) چون در این رقم جوانه‌های روی شاخه، خوش تولید نمی‌کنند.

(۳) چون در این رقم تمام جوانه‌های روی شاخه، تولید خوش کافی می‌کنند.

(۴) چون در این رقم چیرگی انتهایی وجود ندارد و تمام جوانه‌های روی شاخه رشد می‌کنند.

-۱۸

شرایط آب و هوای لازم برای درختان میوه مناطق معتدله کدام است؟

(۱) درجه حرارت بهار بایستی طوری باشد تا گل درختان دیر باز شوند تا از خطر سرمای بهاره مصون بمانند.

(۲) طول رشد آنقدر طولانی باشد تا درختان بتوانند در صورت نیاز ۲ بار در سال تولید میوه نمایند.

(۳) محدودیتی از نظر درجه حرارت‌های زیر صفر برای درختان وجود ندارد ولی لازم است درجه حرارت سرد قادر به تأمین نیاز سرمایی جوانه باشد.

(۴) درجه حرارت زمستان نباید آنقدر سرد باشد تا باعث مرگ درخت شود ولی آنقدر سرد باشد تا نیاز سرمایی جوانه‌ها را تأمین نماید.

-۱۹

کدام یک از موارد زیر از کاربردهای کائولین در باغ‌های درختان میوه نمی‌باشد؟

(۱) کاهش خسارت تنفس خشکی

(۲) بهبود کیفیت میوه‌ها

(۳) جلوگیری از خسارت سرمآزادگی

(۴) جلوگیری از آفتاب سوختگی

-۲۰

ارقام همیج را بر چه اساسی طبقه‌بندی می‌نمایند؟

(۱) نسبت طول به قطر ریشه و شکل ریشه

(۲) طول ریشه و رنگ ریشه

(۳) شکل ریشه و رنگ ریشه

-۲۱

در فرآیند اهلی شدن کاهو، کدام تغییر روی نداده است؟

(۱) کاهش پاچوش‌دهی

(۲) کاهش تلخی بافت

(۳) افزایش حساسیت به بولتینگ

(۴) افزایش حساسیت به زیر، رقم (کولتیوار) می‌تواند لاین خالص (Pure line) باشد؟

-۲۲

در کدام یک از سبزی‌های زیر، رقم (کولتیوار) می‌تواند لاین خالص (Pure line) باشد؟

(۱) سیر ۲ کاهو (۲) کاهو ۳ کلم پیچ

(۴) سبزه‌زمینی ۴ گرده افسانی و تولید میوه در گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای چگونه است؟

-۲۳

(۱) پارتو کارپ است.

(۲) خودگشتن است و با لرزش گل‌ها به راحتی تلقیح می‌شود.

(۳) دگرگش است و توسط حشرات گرده افسانی می‌شود.

(۴) پارتو کارپ است اما گرده افسانی باعث بهبود میوه‌دهی می‌شود.

-۲۴

در درختان زینتی با کاهش میزان  $C/N$  و افزایش سن، زاویه شاخه‌ها به ترتیب ..... و ..... می‌شود.

(۱) بی‌اثر- کاهش ۲ کاهش- بی‌اثر (۲) کاهش- افزایش ۳) بی‌اثر- افزایش

-۲۵

داوودی اگر در شرایط نور قرمز قرار گیرد، ..... .

(۱) تأثیری در گلدهی آن ندارد.

(۲) باعث افزایش ارتفاع گیاه می‌شود.

(۳) با توجه به روز کوتاهی داوودی باعث تسریع در گلدهی می‌گردد.

(۴) بهدلیل افزایش فایتوکروم قرمز دور از گلدهی آن جلوگیری می‌شود.

-۲۶

در مورد گلخانه‌ای با پوششی که شدت نور عبور کرده از آن کمتر از ۴۰۰۰ فوت کندل باشد، کدام مورد صحیح است؟

(۱) بنت قنسول سریعتر به گل رفته بنایر این برآکته‌ها زودتر تشکیل می‌گردد.

(۲) نمی‌توان گیاه بنت قنسول گلدانی را کشت نمود زیرا ارتفاع گیاه افزایش می‌یابد.

(۳) مناسب کشت میخک گل بریده است زیرا القاء گلدهی در این گیاه در نور پایین صورت می‌گیرد.

(۴) با توجه به نیاز نوری بالاتر از ۱۵۰۰ فوت کندل بنفسه آفریقایی، این گیاه قادر به تولید گل نیست.

-۲۷

گل‌های ماده درخت ..... زینت بخش فضای سبز است.

(۱) Magnolia soulangiana (۲) Photinia serulata

(۳) Ailanthus altissima (۴) Cotinus Coggygria

-۲۸

کدام یک از موارد زیر در تجزیه و تحلیل توارث مندلی مشکل آفرین نمی‌باشد؟

(۱) اپیستازی ۲ پیوستگی تنوع (۳) تشکیل اجسام بار

(۴) اثرات پلیوتربوی

-۲۹

کدام مورد زیر فعالیت آمینواسیل سنتتاز را تشریح می کند؟

۱) فعالسازی اسید آمینه

۲) اتصال دو اسید آمینه در رشته پیتیدی  
mRNA ۳) اتصال اسید آمینه به کدون مربوطه روی mRNA  
انتقال ژن از یک باکتری به باکتری دیگر توسط فائز ..... انجام می شود.

-۳۰

۱) Transformation ۲) Recombination ۳) Conjugation ۴) Transduction

اگر در یک وارونگی پاراسنتریک دو کیاسما در داخل حلقه هر ۴ رشته را درگیر کند، چند درصد گامت های حاصل سالم می باشند؟

۱) ۱۰۰٪ ۲) ۷۵٪ ۳) ۵۰٪ ۴) ۰٪

-۳۱

به ژن هایی که در تمام سلول های یک موجود بروز می یابند ..... گویند.

-۳۲

Roentgens ۱) Housekeeping ۲) Polygenes ۳) Oncogenes

برومواوراسیل چیست و چه فعالیتی را انجام می دهد؟

۱) هیدروکربن حلقوی - آلکیل گذاری

۲) هیدروکربن حلقوی - تغییر در رمز ژنتیکی

۳) آنالوگ باز تیمین - جابجایی تاتومری در حین همانندسازی DNA

۴) آنالوگ باز اوراسیل - جابجایی تاتومری در حین نسخه برداری از DNA

-۳۳

در زمان باز شدن دو رشته DNA در موقع همانندسازی چه عاملی از بسته شدن مجدد آنها جلوگیری می کند؟

۱) پروتئین هلیکاز ۲) پروتئین لیکاز ۳) پروتئین توپوایزومراز ۴) پروتئین S.S.P

-۳۴

در صورتی که نوعی بیماری توسط ژن مغلوب اتوزومی کنترل شود، اگر اولین فرزند زن و مردی سالم، بیمار باشد احتمال بیمار بودن فرزند دوم چقدر است؟

۱)  $\frac{1}{3}$  ۲)  $\frac{2}{3}$  ۳)  $\frac{1}{4}$  ۴)  $\frac{1}{16}$

-۳۵

در تلاقي  $AABB \times aabb$  با فرض مستقل بودن مکان های ژنی چه نسبتی از افراد نسل  $F_4$  برای هر دو مکان ژنی خالص خواهند بود؟

۱)  $\frac{7}{8}$  ۲)  $\frac{1}{16}$  ۳)  $\frac{32}{64}$  ۴)  $\frac{49}{64}$

-۳۶

در تلاقي  $Aa \times Aa$  کمترین تعداد نتاج که در آن احتمال وجود حداقل یک فرد با ژنوتیپ aa بیشتر از ۹۵ درصد باشد، چقدر است؟

۱) ۱۴ ۲) ۱۱ ۳) ۱۰ ۴) ۶

-۳۷

از پرایمر الیگو dT در تکنیک ساخت رشته cDNA در ..... استفاده می شود.

-۳۸

۱) اول - پروکاریوت ۲) دوم - پروکاریوت ۳) اول - یوکاریوت ۴) دوم - یوکاریوت

-۳۹

از کدام یک از روش های اصلاحی زیر برای شناسایی بهترین هیبرید استفاده می شود؟

-۴۰

۱) تلاقي دی آلل ۲) انتخاب دوره ای ۳) روش شجره ای ۴) روش بالک

-۴۱

در اپرون لاکتوز کدام یک از موارد زیر جزء عناصر تنظیمی سیس به حساب می آید؟

-۴۲

۱) توالی اپراتور ۲) آلولاکتوز ۳) پروتئین تنظیمی ۴) پروتئین تنظیمی

-۴۳

فرم یونی جذب عناصر غذائی مولیبدن، سلنیوم و بور (B) توسط گیاه به چه شکل می باشد؟

-۴۴

۱)  $H_7BO_3^- Se^{2-}, MoO_4^-$

۲)  $H_7BO_3^-, HBO_3^{2-}, SeO_3^{2-}, MoO_4^-$

۳)  $H_7BO_3^-, HB_7^{2-} - H_7BO_3^-, Se^{2+}, MO_4^-$

۴)  $H_7BO_3^{2-} - HBO_3^{2-} - H_7BO_3^-, SeO_4^{2-}, MoO_4^-$

-۴۵

قویترین محل های مصرف عناصر غذایی متحرک (mobile) در گیاهان به ترتیب در چه اندام هایی می باشد؟

-۴۶

۱) ریشه > برگ ها > ساقه > جوانه ها > گل ها > میوه

-۴۷

۲) ساقه > جوانه ها > برگ ها > میوه > گل ها > ریشه

-۴۸

۳) ریشه > ساقه > برگ ها > جوانه ها > میوه > گل ها


-۴۹

۴) میوه ها > گل ها > جوانه ها > ساقه > برگ ها > ریشه

-۵۰

-۴۳

A, B, C, D, E شکل زیر غشاء سلول گیاهی و فرایند جذب یون‌ها را نشان می‌دهد. در کدام گزینه فرایند جذب برای حروف A, B, C, D, E درست بیان شده است؟



۱) A انتقال از کanal، B انتقال از کanal، C انتشار ساده، D انتقال فعال ، E انتقال غیر فعال

۲) A انتقال از پروتئین، B انتقال از کanal، C انتقال از غشاء، D انتقال فعال ، E انتقال فعال

۳) A انتشار، B انتقال غیر فعال، C انتقال فعال، D انتقال غیر فعال ، E انتقال فعال

۴) A انتقال از کanal، B انتقال از ناقل، C انتقال از غشا فسفولیپیدی، D انتقال فعال ، E انتقال غیر فعال

فرمول شیمیایی کود سوپر فسفات تریپل در کدام گزینه صحیح می‌باشد؟



در آسیمیلاسیون آمونیوم ( $\text{NH}_4^+$ ) کدام ماده گیرنده آمونیوم بوده و چه آنزیمی در این و اکنش نقش دارد؟

(۱) گلوتامات، آنزیم گلوتامات سنتاز

(۲) گلوتامین، آنزیم گلوتامین سنتاز

(۳) گلوتامات، آنزیم گلوتامین سنتاز

(۴) محل ذخیره و تبدیل نیترات ( $\text{NO}_3^-$ ) به اسید آمینه در ریشه و برگ گیاه، در کدام اندامک‌ها می‌باشد؟

۱) محل ذخیره در ریشه و برگ واکوئل بوده و محل تبدیل به اسید آمینه در ریشه پلاستید و در برگ کلروپلاست می‌باشد.

۲) محل ذخیره در ریشه و برگ در سیتوپلاسم سلول بوده و محل تبدیل به اسید آمینه در واکوئل و در برگ در سیتوپلاسم می‌باشد.

۳) محل ذخیره در ریشه و برگ در آپوپلاست و سیمپلاست سلول‌ها بوده و محل تبدیل به اسید آمینه در ریشه سیتوپلاسم و برگ پلاستید می‌باشد.

۴) محل ذخیره در ریشه و برگ بافت‌های پارانشیمی بوده و محل تبدیل به اسید آمینه در ریشه در میتوکندری و در برگ در کلروپلاست می‌باشد.

محدوده  $\text{pH}$  در واکوئل، سیتوپلاسم و آپوپلاسم به ترتیب از راست به چپ در چه محدوده‌ای می‌باشد؟

(۱) ۷-۸, ۵-۵/۵, ۵-۵/۵ (۲) ۵-۵/۵, ۷-۷/۲, ۵-۵/۵

(۳) ۵-۶, ۷-۸, ۷-۷/۲ (۴) ۵-۵/۵, ۵-۵/۵, ۷-۸

در فرایند نیتریفیکاسیون (Nitrification) یک مول منوآمونیوم فسفات ( $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ ) چند مول  $\text{H}^+$  تولید می‌گردد؟

(۱) ۱ مول  $\text{H}^+$  یا همان  $\text{HNO}_3$  تولید می‌شود.

(۲) ۴ مول  $\text{H}^+$  یا همان  $\text{HNO}_2$  تولید می‌شود.

(۳) ۲ مول  $\text{H}^+$  یا همان  $\text{HNO}_2$  تولید می‌شود.

بر اساس معادله نرنست (Nernst) اگر غلظت کاتیون تک ظرفیتی در بیرون از سلول ۱ میلی مول و در داخل سلول ۱۰ میلی مول باشد، در اینصورت  $\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{RT}{4F} \ln \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$  اخلاف بار الکتریکی غشاء و این یون به صورت جذب می‌شود.

(۱) ۱۲۰-میلی ولت - فعال

(۲) غشاء +۶۰ ولت - فعال

(۳) +۱۲۰ میلی ولت - غیر فعال

(۴) غشاء -۶۰ میلی ولت - فعال

اگر منحنی افزایش عملکرد به ازای مصرف هر واحد کود با معادله  $\log(A - y) = \log A - Cx$  بیان گردد، کدام مورد درباره پارامترهای این معادله صحیح می‌باشد؟

(۱) ضریب کارایی کود، A عملکرد اولیه و C مقدار مصرف کود

(۲) X مقدار مصرف اولیه کود، A عملکرد اولیه و C مقدار عملکرد نهایی

(۳) X مقدار مصرف کود، A حداقل عملکرد و C ضریب کارایی کود

(۴) X عملکرد اولیه، A حداقل عملکرد و C مقدار مصرف کود

عارضه دم شلاقی (whip tail) در کلم مربوط به کمبود کدام عنصر است؟

(۱) بور (B) (۲) مولیبدون (Mo) (۳) روی (Zn)

-۴۹

-۵۰

-۵۱

- گیاهان مبتلا به کمبود نیکل، دارای رشد ..... بوده و مقدار زیادی ..... در برگ‌ها انباشته می‌شود.  
 ۱) ناهنجار - اوره (۲) مناسب - اوره (۳) مناسب - نیترات (۴) ناهنجار - نیترات  
 در ارتباط با نسبت نیترات به آمونیوم در محلول غذایی به طور کلی کدام نسبت بیشتر توصیه می‌شود؟  
 ۱) نسبت ۲۵٪ (نیترات) به ۷۵٪ (آمونیوم) پیشنهاد می‌شود.  
 ۲) از هر دو منبع نیترات و آمونیوم به یک نسبت پیشنهاد می‌شود.  
 ۳) نسبت آمونیوم در محلول غذایی بیشتر از ۵۰٪ پیشنهاد می‌شود.  
 ۴) نسبت ۷۵٪ (نیترات) به ۲۵٪ (آمونیوم) پیشنهاد می‌شود.
- چرا گیاهان کلسیم دوست در خاک‌های با pH پایین نمی‌توانند زندگی کنند؟  
 ۱) گیاهان کلسیم دوست در این نوع خاک‌ها به دلیل جذب بسیار بالای کلسیم، مسموم می‌گردند.  
 ۲) در این نوع خاک‌ها، گیاهان تحمل حضور یون‌های سنگین از قبیل  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Mn}^{2+}$  و  $\text{Fe}^{2+}$  را تدارند.  
 ۳) در این نوع خاک‌ها، غلظت یون آهن کاهش یافته و وسیب کاهش رشد و نمو گیاهان خواهد شد.  
 ۴) در این نوع خاک‌ها، غلظت یون‌های مغذی و بی‌کربنات افزایش یافته و سبب جلوگیری از رشد طبیعی گیاهان می‌گردد.  
 عارضه **Bul head** در کدام گیاه اتفاق می‌افتد و دلیل عمدۀ آن کدام است؟  
 ۱) گل لاله - به دلیل DIF منفی  
 ۲) گل رز - معمولاً به دلیل DIF منفی  
 ۳) گل لاله - به دلیل درجه حرارت پایین در زمان تشکیل گل  
 ۴) گل رز - معمولاً به دلیل درجه حرارت بسیار پایین محیط در زمان تشکیل گل  
 گل‌انگیزی در گل میمون به ..... وابسته است.
- ۱) تعداد برگ در گیاهان نونهال  
 ۲) درجه حرارت و طول روز  
 ۳) مدت طول روز کوتاه  
 کدام گروه از گیاهان زیر دیرگله می‌باشد؟  
 ۱) ختمی + یاس زرد (۲) توری + ختمی (۳) اسپیره + پیراکانتا (۴) طاووسی + زرشک  
 در کدام یک از تیمارهای زیر با شبشکنی توسط نور، جوانهزنی بذر بیشتر صورت می‌گیرد؟  
 R-FR-R (۲)  
 R-FR-R-FR-R (۴)
- گزینه درست در مورد گل آذین شاتون کدام است؟  
 ۱) گل آذین محدود با آرایش حلقه‌ای گل‌ها  
 ۲) گل آذین نامحدود، بدون گلپوش و تک جنسی  
 در کدام یک از واکنش‌های فتوسنتزی در گیاهان سبز، اکسیژن آزاد می‌گردد؟  
 ۱) در PSI در اثر کاتالیز آب  
 ۲) در PSII در اثر کاتالیز آب  
 ۳) در PSII در اثر اکسیداسیون  $\text{CO}_2$   
 کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد گلدهی پیاز گل نرگس صحیح می‌باشد؟  
 ۱) سرما فقط رشد ساقه گل دهنده نرگس را کند می‌کند.  
 ۲) سرما برای گلدهی سریع نرگس ضروری است و بدون آن گلدهی رخ نمی‌دهد.  
 ۳) گرمادهی پیاز نسبت به سرما اثر بیشتری بر گلدهی نرگس دارد.  
 ۴) سرما برای گلدهی سریع نرگس ضروری است، اما بدون آن هم گلدهی رخ می‌دهد.  
 به چه گیاهانی از نظر گلدهی حد وسط (intermediate day) گویند؟  
 ۱) به گیاهانی که برای گلدهی طول دوره شب نباید از یک مقدار کمتر و از یک حد بیشتر باشد.  
 ۲) به گیاهانی که برای گلدهی طول دوره تاریکی بیش از شب بحرانی باشد.  
 ۳) به گیاهانی که در یک دامنه وسیعی از طول روز قادر به گلدهی هستند.  
 ۴) به گیاهانی که برای گلدهی وابسته به طول روز نمی‌باشد.  
 کدام یک از گیاهان زیر طول روز در گلدهی آن‌ها نقش ندارد؟  
 ۱) همیشه بهار - بخشش - آلاله (۲) مینا یکساله - هوستا - شببو (۳) بگونیا همیشه گلدار - شمعدانی - پرنده بخششی (۴) اطلسی - رودبکیا (کوکب کوهی) - گازانیا
- در کدام یک از گیاهان زیر جهمت گل شاخه بریده از روش cut استفاده نمی‌شود؟  
 ۱) آسترومیرا (۲) لیلیوم (۳) زنبق (۴) رز  
 بد شکلی و کاهش تعداد گل در گل آذین گیاه کالانکوئه به دلیل ..... می‌باشد.  
 ۱) طول روز کوتاه (۲) طول روز بلند (۳) درجه حرارت‌های خیلی زیاد و یا خیلی کم

- ۶۶ برای گل انگیزی در هورتانسیا می توان از ..... و ..... استفاده نمود.
- ۱) defoliation - درجه حرارت پایین  
۲) defoliation - روز بلندر  
۳) defoliation - روز کوتاه
- ۶۷ در تکثیر کالادیوم از ..... استفاده می شود.
- ۱) طوفه (۴) ریشه غدهای (۳) ساقه غدهای (۲) ریزوم
- ۶۸ کدام روش در تولید گیاهان هاپلوتید در رز موفق تر بوده است؟
- ۱) کشت گرده تحت تابش و نجات جنین  
۲) کشت میکروسپور و استفاده از کلشی سین  
۳) کدام نسترن ایرانی (رز و حشی) از نوع پرپر می باشد؟
- ۶۹ ۱) R.muschata (۴) R.begeriana (۳) R.persica (۲) R.canina
- کدام گزینه از نظر نگهداری ژرم پلاسم گیاهان زینتی (در بانک ژن) از اولویت کمتری برخوردار است؟
- ۱) ارقام اصلاح شده مدرن  
۲) گونه های موجود در خزانه ژنی ثانویه  
۳) گونه های موجود در خزانه ژنی اولیه (heirloom and landrace)  
برای تولید بذرهای F<sub>1</sub> در گل ابری از ..... استفاده می کنند.
- ۷۰ ۱) نر عقیمی موجود در این گیاه واخته سازی  
۲) خودناسازگاری و نر عقیمی موجود در این گیاه  
۳) از اخته سازی و خودناسازگاری که در این گیاه است.  
کدام گزینه را برای تولید لاین های خالص از سیکلامن در کوتاه ترین زمان ممکن به منظور به کار گیری آن ها در تولید ارقام هیبرید F<sub>1</sub> یکنواخت پیشنهاد می کنید؟
- ۷۱ ۱) چندین نسل خویش آمیزی ارقام تتراپلوئید  
۲) کشت بساک یا میکروسپور ارقام تراپلوئید و مضاعف ساختن کروموزوم گیاهان حاصله  
۳) کشت بساک یا میکروسپور ارقام تراپلوئید برای تولید مستقیم گیاهان دیپلوئید هموزیگوس  
۴) کشت بساک یا میکروسپور ارقام دیپلوئید و مضاعف ساختن کروموزوم گیاهان حاصله  
در کدام یک از موارد زیر کارآبی گزینش تودهای بیشتر خواهد بود؟
- ۷۲ ۱) گزینش برای صفت غالب در گیاه دگر بارور  
۲) گزینش برای صفت غالب در گیاه خود بارور  
۳) گزینش برای صفت غالب در گیاه خود بارور  
بگونیاهای ریزدمدار دارای گل های نر و ماده با چه ویژگی ای هستند؟
- ۷۳ ۱) با هم ظاهر می شوند.  
۲) هم زمان ظاهر نمی شوند.  
۳) گل های نر آن عقیم می باشند.  
۴) گل های نر و گل های ماده روی دو پایه جداگانه ظاهر می شوند.
- ۷۴ کدام عبارت برای گل تاج الملوك صحیح است؟
- ۱) گیاهی است که تولید بذرهای خودگشن دارد.  
۲) گیاهی است که خودناسازگاری شدیدی دارد.  
۳) این گیاه دگر گشن بوده و برای تشکیل بذر نیاز به عامل گرده افشار دارد.  
۴) این گیاه نر عقیم (male strike) بوده و برای تشکیل بذر هیبرید شرایطی مناسب دارد.
- ۷۵ نرگس های یومی ایران از نوع ..... می باشند.
- ۷۶ ۱) Psudo - narcissus (۴) miscellaneous (۳) cyclamineus (۲) tazeta
- کدام گزینه از نظر اهداف اصلاحی در گیاهان زینتی از اهمیت کمتری برخوردار می باشد؟
- ۱) عمر گل جایی Vase life  
۲) جنبه ظاهری و زیبایی پسندی  
۳) اصلاح برای مقاومت به بیماری های خاکزad
- ۷۷ کدام یک از مطالب زیر در مورد لیسیانتوس صحیح است؟
- ۱) گیاهی دگرگشن بوده و برای ایجاد برگهای دو رنگ هموزیگوس پایدار نیاز به ۴ تا ۵ نسل خودگشنسی دارد.  
۲) گیاهی دگرگشن است، رنگ حاشیه گلبرگ ناپایدار بوده و این صفت بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی است.  
۳) گیاهی است که در طبیعت واریته های پربر آن یافت شده و اصلاح گران در صدد معطر نمودن گل های آن هستند.  
۴) گیاهی فاقد خودناسازگاری است که گل های سفید آن ممکن است نتیجه یک ژن مغلوب و یا حاصل پدیده ای سازی باشد.

-۷۹

کدام یک از موارد زیر در مورد اطلسی نادرست است؟

۱) در اطلسی انگیزه مسئول رنگ کل فلاونوئیدها هستند.

۲) اطلسی‌های تریپلوبloid معمولاً به علت فقدان تشکیل multivalent بارور هستند.

۳) اطلسی‌های هاپلوبloid عقیم هستند و قادر به تولید گرده زنده نیستند.

۴) آنوبلوبloidی در اطلسی وجود دارد و گیاهان Trisomic سالم بوده و بارور هستند.

آلوبلوبloid چگونه ایجاد می‌شود؟

۱) با دو برابر کردن کروموزومهای لاین

۲) دو برابر کردن کروموزومهای یک فرد هاپلوبloid

۳) با تلاقي اتو تراپلوبloidهای حاصل از گیاهان والدی

-۸۰

۱) با دو برابر کردن کروموزومهای لاین

۳) با دو برابر کردن کروموزومهای یک فرد هموزیگوت