

301

F



نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه
۹۲/۱۲/۱۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل سال ۱۳۹۳

بیماری‌شناسی گیاهی (کد ۲۴۴۰)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (بیماری‌های گیاهی - مدبریت و کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی و نمادندشناختی)	۸۰	۱	۸۰

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقوقی و حقوقی نهادها با مجوز این سازمان مجاز نمی‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

<p>۱- مهم‌ترین مانع در استفاده از ویروس‌های قارچی برای کنترل بیماری‌های قارچی چیست؟</p> <p>۱) تنو زیاد در گروههای سازگار رویشی قارچ عامل بیماری و کاهش نرخ انتقال ویروس به نژاد ویروس‌لان</p> <p>۲) انتقال ویروس‌ها از طریق آسکوسبورها و افزایش جمعیت نژاد ویروس‌لان و خنثی کردن اثر نژاد هیپوویرولانت حاوی ویروس</p> <p>۳) انتقال ویروس‌ها از طریق کنیدیومها و افزایش جمعیت نژاد هیپوویرولانت و خنثی کردن اثر نژاد هیپوویرولانت حاوی ویروس</p> <p>۴) انتقال ویروس‌ها از طریق آسکوسبورها و کنیدیومها و افزایش جمعیت نژاد ویروس‌لان و خنثی کردن اثر نژاد هیپوویرولانت حاوی ویروس</p> <p>براساس نظریه واندرپلانک، بیمارگرهای گیاهی از نظر تکثیر زادمایه اولیه مشابه سود بانکی مقایسه شده‌اند. به نظر شما کدام یک از بیمارگرهای زیر طبق سود بانکی مرکب تکثیر می‌یابد؟</p>	<p>۱) <i>Verticillium dahliae</i> (۲)</p> <p>۲) <i>Pythium aphanidermatum</i> (۴)</p> <p>۳) <i>Puccinia graminis</i></p> <p>۴) <i>Polymyxa betae</i></p>
<p>۱) Fludioxonil (۴)</p> <p>۲) Fluazinam (۳)</p> <p>۳) Zozamide (۲)</p> <p>۴) Allite</p>	<p>۱) کاهش زادمایه اولیه بیمارگر در مدیریت کدام بیماری بسیار مؤثر است؟</p> <p>۲) <i>Puccinia graminis</i> (۲)</p> <p>۳) <i>Erysiphe necator</i> (۱)</p> <p>۴) <i>Verticillium dahliae</i> (۳)</p>
<p>۱) مهم‌ترین تفاوت جنس <i>Xanthomonas</i> و <i>Xylophilus</i> کدام یک از موارد ذیل می‌باشد؟</p> <p>۱) جنس <i>Xanthomonas</i> دارای اندوسپور ولی <i>Xylophilus</i> فاقد اسپور می‌باشد.</p> <p>۲) جنس <i>Xanthomonas</i> دارای یک تازک قطبی و جنس <i>Xylophilus</i> دارای چند تازک قطبی می‌باشد.</p> <p>۳) جنس <i>Xanthomonas</i> هوایی اجباری ولی <i>Xylophilus</i> بیهوایی اختیاری است.</p> <p>۴) جنس <i>Xanthomonas</i> به <i>Xylophilus</i> - γ و جنس <i>Xylophilus</i> به <i>Xylophilus</i> - β-Subclass تعلق دارد.</p>	<p>۱) مهم‌ترین مشخصات جنس <i>Phytoplasma</i> کدام یک از موارد ذیل می‌باشد؟</p> <p>۱) فاقد دیواره‌ی سلولی، غیرقابل کشت، محدود به آوندهای چوبی</p> <p>۲) بدون دیواره‌ی سلولی، غیرقابل کشت، محدود به آوندهای آبکشی</p> <p>۳) بدون دیواره‌ی سلولی، قابل کشت و محدود به آوندهای آبکشی</p> <p>۴) دارای دیواره‌ی سلولی، غیرقابل کشت و محدود به آوندهای آبکشی</p>
<p>۱) کدام یک از ژن‌های ذیل در باکتری‌ها در پدیده تشخیص (Recognition) دخالت دارند?</p> <p>۱) <i>dsp</i> (۴)</p> <p>۲) <i>avr</i> (۳)</p> <p>۳) <i>hrp</i> (۲)</p> <p>۴) <i>hsv</i></p>	<p>۱) کدام یک از توکسین‌های ذیل از فعالیت آنزیم RNA Polymerase جلوگیری می‌کند؟</p> <p>۱) <i>Phaseolotoxin</i> (۴)</p> <p>۲) <i>Syringomycin</i> (۳)</p> <p>۳) <i>Rhizobiotoxin</i> (۲)</p> <p>۴) <i>Tabtoxin</i></p>
<p>۱) در مورد همکنش ویروس‌های ناپایا با شته‌های ناقل شان کدام گزینه صحیح می‌باشد؟</p> <p>۱) عمل بلع یا «regurgitation» نقش مهمی در این نوع انتقال دارد.</p> <p>۲) این نوع از انتقال صرفاً مکانیکی است و هیچ ارتباط اختصاصی وجود ندارد.</p> <p>۳) این نوع از انتقال مستلزم همکنش پوشش پروتئینی ویروس با نواحی خاصی از لایه کوتیکولی استایلت می‌باشد.</p> <p>۴) این نوع انتقال در گرو عبور ویروس از لایه‌های روده میانی و ورود به همولنف و سپس ورود به غدد بزاقی است.</p>	<p>۱) محل همانندسازی ویروئیدها کجا سلول است؟</p> <p>۱) هسته و سیتوپلاسم</p> <p>۲) کلروپلاست و هسته</p> <p>۳) سیتوپلاسم و میتوکندری</p>
<p>۱) از میان چهار پروتئین رمزگذاری شده توسط TMV، پروتئین کیلو دالتون در انتشار ویروس از سلولی به سلول دیگر نقش اختصاصی دارد.</p>	<p>۱) <i>17/6</i> (۴)</p> <p>۲) <i>126</i> (۳)</p> <p>۳) <i>۳۰</i> (۲)</p> <p>۴) <i>۱۸۳</i> (۴)</p>
<p>۱) علاوه بر ویروس‌های جنس <i>Potyvirus</i> ویروس‌های کدام جنس تیره Rymovirus با شته‌ها منتقل می‌شوند؟</p>	<p>۱) <i>Potyvirus</i> (۴)</p> <p>۲) <i>Bymovirus</i> (۳)</p> <p>۳) <i>Tritomovirus</i> (۲)</p> <p>۴) <i>Macluravirus</i></p>
<p>۱) کدام یک از شرایط زیر در فرآیند «بهبودی» (recovery) علائم ویروس‌های گیاهی مؤثر نمی‌باشد؟</p> <p>۱) زمان آلووده شدن گیاه</p> <p>۲) افزایش دمای محیط</p> <p>۳) نوع گیاه میزبان</p> <p>۴) نوع ویروس</p>	<p>۱) <i>Cricoviridae</i> (۲)</p> <p>۲) <i>Nanovirus</i> (۱)</p> <p>۳) <i>Babutovirus</i> (۳)</p>
<p>۱) ویروس عامل بیماری بروگ دسته‌ای موز (Banana bunchy top) متعلق به جنس از خانواده می‌باشد.</p>	<p>۱) <i>Aphelenchaididae</i> (۴)</p> <p>۲) <i>Pratylenchidae</i> (۳)</p> <p>۳) <i>Dolichodoridae</i> (۲)</p> <p>۴) <i>Tylenchidae</i> (۱)</p>
<p>۱) گونه‌ها و یا جنس‌های کدام گروه از نماتدهای زیر فقط به صورت اکتوپارازیت از میزبان‌های گیاهی تغذیه می‌کنند؟</p>	<p>۱) <i>Danlod Klye Sowalat Azmon Doktri Dr Web Site Pi Aj Di Test</i></p>

- ۱۶ کدام یک از جنس‌های زیر از نظر ریخت‌شناسی بیشتر به هم شباهت داشته و وجه تمایز آن‌ها کدام است؟
 ۱) *Scutellonema* و *Hoplolaimus* - شکل سر، نوع و محل فاسمید
 ۲) *Scutellonema* و *Rotylenchus* - وضعیت همپوشانی مری و محل فاسمید
 ۳) *Helicotylenchus* و *Rotylenchus* - وضعیت همپوشانی مری نسبت به روده
 ۴) *Rotylenchulus* و *Rotylenchus* - محل ریزش غده پشتی مری، شکل و اندازه دم
 کدام یک از موارد زیر در مورد جنس‌های *Globodera* و *Heterodera* صادق نیست؟
 ۱) نماتدهای نر و لاروها کرمی شکل و ماده‌ها متورم هستند.
 ۲) دم نرها نیم کروی و کوتاه و ماده‌ها فاقد دم هستند.
 ۳) مرحله مهاجم آن‌ها کرمی شکل با دم مخروطی و دارای هیالین می‌باشد.
 ۴) غدد مری در افراد بالغ و لاروها رشد یافته، نسبت به روده همپوشانی دارد.
- ۱۷ بر هم کنش بین نماتدهای انگل گیاهی و قارچ‌های بیمارگر گیاهی در کدام گروه از بیماری‌ها بیشتر دیده می‌شود؟
 ۱) پوسیدگی طوقه و پر ریشک شدن
 ۲) پژمردگی و لکبرگی
 ۳) پوسیدگی ریشه و لکبرگی
 یکی از بیمارگرهای زیر منحصرآندام خاصی از گیاه را مورد حمله قرار می‌دهد؟
 ۱) *Ustilago nuda*
 ۲) *Ustilago maydis*
 ۳) *Urocystis tritici*
 ۴) *Stagonospora nodorum*
- ۱۸ سیاهک هندی گندم یا کارنال بانت چه تفاوتی با سایر سیاهک‌های غلات دارد؟
 ۱) سیاهک هندی میزبان را در مرحله گیاهچه‌ای آلوده می‌کند و تولید تلیوپسپور در گیاهان آلوده در سال بعد صورت می‌گیرد.
 ۲) سیاهک هندی میزبان را در مرحله گلدهی آلوده می‌کند و تولید تلیوپسپور در گیاهان آلوده در سال بعد صورت می‌گیرد.
 ۳) سیاهک هندی میزبان را در مرحله گلدهی آلوده می‌کند و تولید تلیوپسپور در گیاهان آلوده در همان فصل رشدی صورت می‌گیرد.
 ۴) سیاهک هندی میزبان را در مرحله گیاهچه‌ای آلوده می‌کند و تولید تلیوپسپور در گیاهان آلوده در همان فصل رشد صورت می‌گیرد.
- ۱۹ مهار راه شیمیایی با کدام یک از بیمارگرهای زیر آسان‌تر می‌باشد؟
 ۱) *Erysiphe necator*
 ۲) *Tranzschelia discolor*
 ۳) *Taphrina deformans*
 ۴) *Polystigma amygdalinae*
- ۲۰ انتقال با بدتر در کدام یک از بیماری‌های ناشی از زنگ مهم می‌باشد؟
 ۱) زنگ آفتتابگردان
 ۲) زنگ سیاه گندم
 ۳) زنگ سیب
 ۴) زنگ گلنگ
- ۲۱ براساس یافته‌های جدید، کدام گونه از قارچ‌های زیر مولد زنگ روی درختان هسته‌دار در ایران است و گسترش بیشتری دارد?
 ۱) *Tranzschelia iranica*
 ۲) *Tranzschelia pruni-spinosa*
 ۳) *Tranzschelia hyrcanica*
- ۲۲ کدام یک از سیاهک‌های زیر در تمامی گیاه سیستمیک می‌شود و به قسمت‌های مختلف مانند برگ، جوانه و ریشه گیاه حمله می‌کند؟
 ۱) سیاهک معمولی ذرت
 ۲) سیاهک پاکوتاه یا کوتوله
 ۳) سیاهک پنهان گندم
 ۴) سیاهک نیشکر
- ۲۳ قارچ *Ophiostoma nova-ulmi* عامل بیماری برگ هلندي نارون، چگونه زمستان‌گذاري می‌کند؟
 ۱) به صورت پریتسیوم در پوست درختان نارون بریده شده
 ۲) به صورت ریشه و کورمیوم در پوست درختان نارون در حال مرگ یا بریده شده
 ۳) به صورت کنیدیوم در داخل آوندهای چوبی درختان نارون در حال مرگ یا بریده شده
 ۴) به صورت پریتسیوم و کورمیوم در داخل آوندهای چوبی درختان نارون ضعیف شده
- ۲۴ انتشار بیماری لکه قمهوهای برگ یونجه و شبدر *Pseudopeziza medicaginis* (P) و آلودگی بوته‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟
 ۱) توسط آسکوپسپورهای تشکیل شده در برگ‌های نپوسیده
 ۲) توسط کنیدیوم‌های تشکیل شده در برگ‌های بقایایی ریخته شده
 ۳) توسط پکنیدیوم‌های تشکیل شده روی بقایایی گیاهی
 ۴) توسط آپوتسیوم‌های تشکیل شده روی بقایایی دارای برگ‌هایی با عالائم ضمن بازدید از مزرعه آفتتابگردان در استان آذربایجان غربی متوجه خواهید شد که برخی از بوته‌ها دارای برگ‌هایی با عالائم موزائیک، گیاهان کوتاه و طبق گل سر به هوا مانده هستند، در صورتی که در حالت عادی طبق رو به پایین است. به کدام یک از عوارض زیر مشکوک می‌شوید؟
- ۲۵ ۱) فیتوپلاسم
 ۲) اثر علف‌کش
 ۳) سفیدک کرکی
 ۴) نوعی بیماری ویروسی
- ۲۶ ضمن بازدید از مزارع خربزه یا طالبی در اوایل فصل رشد، مشاهده خواهید کرد که برخی از بوته‌ها دارای رشد کم و به صورت یک طرفه برگ‌ها و شاخه‌ها زرد رنگ است. به کدام یک از بیمارگرهای مشکوک خواهید شد؟
 ۱) عامل کرلی تاپ
 ۲) نماتد ریشه گرگی
 ۳) عامل پژمردگی آوندی
 ۴) عامل پوسیدگی ریشه و طوقه
- ۲۷ از بین گونه‌های فیتوفتورا که دارای میزبان وسیع و معمولاً به درختان حمله می‌نماید، یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید؟
 ۱) *Ph. infestans*
 ۲) *Ph. capsici*
 ۳) *Ph. cactorum*

در کدام یک از بیماری‌های زیر، آلودگی در نتیجه دو مرحله مجزای جنسی و غیرجنسی است؟	-۳۰
۱) شانکر انجیر ۲) سیاهک ذرت ۳) سیاهک پاکوتاه گندم ۴) سیاهک پاکوتاه گندم	-۳۱
ملکول‌های پیام رسان (signals) که در فعال کردن سیستم حد نصاب احساس (Quorum sensing) باکتری بیوکنترل <i>Pseudomonas syringae</i> مؤثر است، کدام یک از موارد زیر است؟	-۳۲
۱) اسیل هموسین لاکتون (AHL) ۲) الیگو پپتید oligopeptide ۳) پلی پپتید Glycopeptide ۴) گلیکو پپتید Polypeptide	-۳۳
جهت افزایش راندمان اخذ اسپورهای خشک در فضای کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟	-۳۴
۱) حداقل سرعت باد ۲) سطح صاف اسپورگیر ۳) کاهش سطح اسپورگیر ۴) افزایش سطح اسپورگیر	-۳۵
کدام باکتری در تعامل با سودوموناس‌های فلورسنت، در ایجاد خاک‌های بازدارنده (suppressive soils) علیه بیماری پاخوره گندم (take-all) مؤثر شناخته شده است؟	-۳۶
<i>Lysobacter enzymogenes</i> (۲) <i>Rhoizobium etli</i> (۱)	-۳۷
<i>Azospirillum brasilense</i> (۴) <i>Bdellovibrio bacteriovoruse</i> (۳)	-۳۸
میزان اینوکولرم اولیه در کدام یک موارد زیر در توسعه اپیدمی نقش عمده ندارد؟	-۳۹
<i>Peronospora tabacina</i> (۲) <i>Polystigmmina rubrum</i> (۱)	-۴۰
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i> (۴) <i>Verticillium dahliae</i> (۳)	-۴۱
رهایی اسپور در کدام یک از گزینه‌های زیر در شب صورت می‌گیرد؟	-۴۲
<i>Blumeria graminis</i> (۲) <i>Ascochyta rabiei</i> (۱)	-۴۳
<i>Daldinia concentrica</i> (۴) <i>Peronospora tabacina</i> (۳)	-۴۴
کدام یک از عوامل بیماری‌زای زیر ممکن است محدودیت میزبانی کمتری داشته باشد؟	-۴۵
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radici-cucumerinum</i> (۱) <i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i> (۲)	-۴۶
	-۴۷
	-۴۸
	-۴۹
اعمال تنابع گیاهی با گونه‌های مختلف یک خانواده گیاهی، برای کدام یک از بیمارگرهای زیر مؤثر می‌باشد؟	-۵۰
<i>Phytophthora melonis</i> (۲) <i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>pisi</i> (۱)	-۵۱
<i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i> (۴) <i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (۳)	-۵۲
کدام پروتئین در هر دو مسیر مقاومت القایی در گیاهان (ISR, SAR) دخالت دارد؟	-۵۳
PR 5 (۴) PR 2 (۳) NPR 1 (۲) PR 1 (۱)	-۵۴
کدام آنزیم در باکتری <i>Pseudomonas putida</i> از تولید اتیلن ممانعت می‌کند و چه تأثیری روی سیستم ریشه گیاه دارد؟	-۵۵
۱) Acc oxidase – افزایش رشد طولی ریشه ۲) Acc deaminase – کاهش رشد طولی ریشه	-۵۶
۳) Acc deaminase – افزایش رشد طولی ریشه ۴) کاهش رشد طولی ریشه	-۵۷
mekanisim تأثیر برخی استرین‌های <i>Bacillus thuringiensis</i> در بیوکنترل باکتری <i>Pectobacterium carotovorum</i> چیست؟	-۵۸
۱) اختلال در سیستم ترشحی نوع سوم ۲) ممانعت از تجمع باکتری و تشکیل بیوفیلم	-۵۹
۳) تولید متابولیت‌های ضد باکتری (آنتی بیوز) ۴) اختلال در سیستم تنظیمی Quorum sensing	-۶۰
نقش کدام یک از موجودات ساکن خاک در آماده‌سازی جوانه زدن در برخی از گونه‌های فیتوفتورا به اثبات رسیده است؟	-۶۱
۱) پادمان‌ها ۲) کرم‌های خاکی ۳) برخی از حلزون‌ها ۴) کنه‌های قارچ‌خوار	-۶۲
پدیده میکوفالزی باکتریایی (<i>Magnaporthe grisea</i>) علیه قارچ (<i>Bacterial mycophagy</i>) در کدام باکتری دیده شده است؟	-۶۳
۱) <i>Stenotrophomonas</i> sp. (۴) <i>Bacillus subtilis</i> (۳) <i>Bacillus cereus</i> (۲) <i>Pseudomonas</i> sp. (۱)	-۶۴
چگونه ممکن است بین تکامل گونه و تکامل ژن هماهنگی وجود <u>نداشته باشد</u> ؟	-۶۵
۱) به دلیل نوترکیبی کروموزوم‌های جنسی ۲) به دلیل تغییر شکل گونه ناشی از سازگاری	-۶۶
۳) به دلیل انتقال عمودی ژن‌ها و هیبریداسیون	-۶۷

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

-۴۴

کدام یک از گزینه‌ها جایگاه فیلوزنیکی راسته **Microbotryales** را به صورت صحیح بیان می‌کند؟

۱) از نظر تکاملی به قارچ‌های راسته **Tilletiales** نزدیک هستند و از لحاظ مرفوولوژی با قارچ‌های راسته **Ustilaginales** همگرایی دارند.

۲) از لحاظ مرفوولوژی با قارچ‌های راسته **Pucciniales** و اگرایی دارند و از نظر تکاملی به قارچ‌های راسته **Tilletiales** نزدیک هستند.

۳) از نظر تکاملی به قارچ‌های راسته **Ustilaginales** نزدیک هستند و از لحاظ مرفوولوژی با قارچ‌های راسته **Pucciniales** همگرایی دارند.

۴) از نظر تکاملی به قارچ‌های راسته **Pucciniales** نزدیک هستند و از لحاظ مرفوولوژی با قارچ‌های راسته **Ustilaginales** همگرایی دارند.

-۴۵

سینگامی (Syngamy) در قارچ‌ها به چه معنی مفهومی به کار بردہ می‌شود؟

۱) اگر تولید مثل جنسی از طریق امتزاج کامل دو گامت مختلف صورت پذیرد.

۲) اگر تولید مثل جنسی از طریق ادغام گامتانژیوم نر و ماده به صورت مستقل انجام شود.

۳) اگر تولید مثل جنسی از طریق امتزاج دو گامت مشابه از نظر اندازه و شکل انجام شود.

۴) اگر تولید مثل جنسی از طریق ادغام گامتانژیوم نر و ماده از نظر شکلی مشابه ولی از نظر اندازه متفاوت انجام شود.

در انتوژنی کنیدیوم، اگر سلول کنیدیوم زا به تدریج از قاعده رشد کند و کنیدیوم‌ها پشت سر هم و به تدریج تولید شوند، به این نوع زایش کنیدیوم چه می‌گویند و در چه گروهی از قارچ‌ها دیده می‌شود؟

-۴۶

۱) انتربلاستیک - در قارچ‌های مولد فومازین دیده می‌شود.

۲) هولوبلاستیک - در قارچ‌های مولد سفیدک‌های پودری **Erysphaceae** دیده می‌شود.

۳) تالیک غیر مریستانیک - در قارچ‌های مولد لکه‌برگی مانند تمامی آسروں داران دیده می‌شود.

۴) تالیک مریستانیک - در قارچ‌های مولد سفیدک‌های پودری **Erysiphaceae** دیده می‌شود.

کدام یک از گزینه‌ها چگونگی استقرار ال‌های تیپ آمیزشی در قارچ **Podospora anserina** را بیان می‌کند؟

-۴۷

۱) در هر اسپور جنسی یک ال تیپ آمیزشی در دو هسته هاپلوبائید متقابل قرار دارد.

۲) در هر کنیدیوم یک ال تیپ آمیزشی در دو هسته هاپلوبائید قرار دارد.

۳) در هر اسپور جنسی دو ال تیپ آمیزشی متقابل در دو هسته هاپلوبائید قرار دارد.

۴) در هر کنیدیوم دو ال تیپ آمیزشی متقابل در یک هسته هاپلوبائید قرار دارد.

کدام یک از موارد زیر به عنوان مهمترین عامل گونه‌زایی و تکامل در قارچ‌ها مطرح است؟

-۴۸

۱) نوترکیبی با ایجاد ال‌های جدید

۲) جهش با ایجاد ال‌های جدید

۳) نوترکیبی با ایجاد ژنوتیپ‌های جدید

۴) هتروکاریوza و چرخه شبه جنسی

کدام یک از گزینه‌های زیر مفهوم **Cryptic species** در قارچ‌ها را بهتر بیان می‌کند؟

-۴۹

۱) گروه‌هایی مشابه از نظر مرفوولوژیکی در دورن یک گونه هستند که از نظر زیستگاه با هم تفاوت دارند.

۲) گروه‌هایی مشابه از نظر مرفوولوژیکی در درون یک گونه قارچی هستند که بین آن‌ها جدایی تولیدمثلی به وجود آمده است.

۳) گروه‌هایی درون یک گونه هستند که از نظر مرفوولوژیکی متفاوت ولی از نظر ژنتیکی مشابه هستند.

۴) گروه‌هایی در دورن یک گونه هستند که در نتیجه پدیده گونه‌زایی، از نظر مرفوولوژیکی بین آن‌ها تفاوت ایجاد شده است.

تفاوت دو جنس **Helmintosporium** و **Bipolaris** در چیست؟

-۵۰

۱) در **Bipolaris** کنیدیوم درای دیواره کاذب بوده و کنیدیوفور دارای رشد سمپودیال است اما در **Helmintosporium** کنیدیوم دارای دیواره واقعی و کنیدیوفورها با رشد نامحدود هستند.

۲) در **Bipolaris** کنیدیوم سمپودیال است و اولین کنیدیوم در کناره‌های کنیدیوفور تولید می‌شود. اما در **Helmintosporium** کنیدیوفور راست بوده و پس از تولید کنیدیوم در نوک، رشد کنیدیوفور متوقف می‌شود.

۳) در **Bipolaris** کنیدیوم دارای دیواره کاذب بوده و کنیدیوفور دارای رشد سمپودیال است اما در **Helmintosporium** کنیدیوم دارای دیواره واقعی و کنیدیوم‌ها در کناره‌ها تولید می‌شوند و پس از تولید کنیدیوم در نوک، رشد کنیدیوفور متوقف می‌شود.

۴) در **Bipolaris** کنیدیوفور سمپودیال و دارای رشد نامحدود بوده و اولین کنیدیوم در نوک کنیدیوفور تولید می‌شود. اما در **Helmintosporium** کنیدیوفور راست بوده کنیدیوم‌ها در کناره‌ها تولید می‌شوند و پس از تولید کنیدیوم در نوک، رشد کنیدیوفور متوقف می‌شود.

-۵۱

کدام گزینه زیر به مفهوم وجود یک زن در دو گونه به دلیل پدیده گونه‌زایی است؟

(۱) Paralogy (۴) (۲) Analogy (۳) (۳) Xenology (۴) Orthology

اعضای شاخه **Oomycota** با کدام گروه از موجودات زیر ارتباط فیلوزنیک دارند؟

-۵۲

(۱) جلبک‌های بدون تازک

(۲) جلبک‌های هتروکنلت با دو تازک غیر همسان

(۳) جلبک‌های هتروکنلت با دو تازک همسان

- پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری
- کدام جمله در مورد میسلیوم *Leveillula* صحیح است؟
 ۱) همه ریسه داخلی است و کنیدیوفورها از آن منشا می‌گیرند.
 ۲) بخشی از ریسه داخلی است و کنیدیوفورها از آن منشا می‌گیرند.
 ۳) بخشی از ریسه سطحی است و کنیدیوفورها از آن منشا می‌گیرند.
 ۴) بخشی از ریسه داخلی است و کنیدیوفورها از ریسه داخلی و سطحی منشا می‌گیرند.
- کدام یک از موارد زیر در قارچ‌های شاخه *Ascomycota* **apomorphic** بیانگر وضعیت در تاریخ تکاملی آن‌ها است؟
 ۱) وجود پارافیز - آسک‌های دوجداره - آسکوکارپ‌های کلیستوتیسیوم و پریتیسیوم
 ۲) وجود پارافیز - هیف آسکزا - آسک‌های دوجداره - آسکوکارپ‌های آپوتیسیوم و پریتیسیوم
 ۳) آسکوکارپ‌های پریتیسیوم و کلیستوتیسیوم - آسک‌های یک جداره - سلول‌های سر عصایی
 ۴) آسکوکارپ‌های آسکوستروما - آسک‌های یک جداره - سلول آسکزا - آسک پروتوتونیکیت
 برای ردیابی کدام یک از جنس‌های ویروسی، روش پی‌سی آر مقرر به صرفه‌تر و اقتصادی‌تر است?
 ۱) پوتی ویروس‌ها و رئوویروس‌ها
 ۲) لوتوویروس‌ها و کوموویروس‌ها
 ۳) کوکوموویروس‌ها و توباموویروس‌ها
 ۴) بگوموویروس‌ها و کالیموویروس‌ها
 آلدگی همزمان یک گیاه به چند ویروس با چه روش‌هایی قابل ردیابی است?
 ۱) ریز آرایه (Microarray)
 ۲) پی‌سی آر چندگانه (Multiplex-PCR)
 ۳) الایزا (ELISA)
 ۴) الایزا (Microarray), پی‌سی آر چندگانه (Real-time PCR) و الایزا (ELISA)
- بر همکنش مولکولی پوتی ویروس - شته از نوع بوده و موتیف **DAG** پروتئین پوششی به اتصال می‌یابد.
 ۱) غیر مستقیم - HC-Pro
 ۲) غیر مستقیم - دیواره استایلت
 ۳) مستقیم - دیواره استایلت
 ۴) مستقیم - HC-Pro
- ژنوم ویروس‌های جنس *Phytoreovirus* از نوع بوده و هر پیکره دارای قطعه ژنومی می‌باشد.
 ۱) یک بخشی - یک ds RNA
 ۲) چند بخشی - ۱۰ ds RNA
 ۳) چند بخشی - ۱۲ ss RNA
 ۴) چند بخشی - ۱۵ ds RNA
- عمومی ترین راهبرد ترجمه ژن‌های ویروس‌های گیاهی با ژنوم آر ان ای مشتب تک لا می‌باشد.
 ۱) چند پروتئینی
 ۲) پیوسته خوانی
 ۳) ار ان ای زیر ژنومی
 ۴) تغییر چارچوب خواندنی
- بروتئین‌های ویروس‌های تیره *Caulimoviridae* در گیاه میزان چگونه بیان می‌شوند؟
 ۱) از روی ترانسکریپت ۱۹S ویروس در هسته سلول گیاه
 ۲) از روی ترانسکریپت ۳۵S ویروس در سیتوپلاسم سلول گیاه
 ۳) از روی هر دو ترانسکریپت ۳۵S و ۱۹S ویروس در هسته سلول گیاه
 ۴) از روی هر دو ترانسکریپت ۳۵S و ۱۹S ویروس در سیتوپلاسم سلول گیاه
- در ارتباط ویروس - شته از نوع چرخشی - غیر تکثیری، وجود با منشا در همولنف شته ضروری است.
 ۱) سیمبیونین - ویروس
 ۲) HC-Pro و سیمبیونین - شته ناقل
 ۳) HC-Pro - باکتری‌ها جنس *Buchneria* spp. - سیمبیونین - باکتری‌های جنس *Buchneria* spp.
 در رابطه با اختصاصیت انتقال ویروس‌های پایا توسط ناقلين، کدام یک از پروتئین‌های زیر نقش دارد؟
 ۱) حرکتی
 ۲) پوششی
 ۳) پلی مراز
 ۴) پروتئاز
- در ویروس‌های آر ان ا دار، تولید همسانه عفونتزا (**infectious clone**) شامل:
 ۱) ساخت دی ان از روی ژنوم و انتقال آن به ژنوم گیاه است.
 ۲) خالص‌سازی ویروس و انتقال آن به گیاه به کمک آگروباکتریوم یا تفنگ ژنی است.
 ۳) وارد کردن ژنوم ویروس در *E.coli* و تکثیر آن در محیط کشت مخصوص است.
 ۴) تکثیر ویروس در محیط *invitro* به حدی است که بتواند در میزان عفونت ایجاد کند.
- همانند سازی به روش دایره غلتان:
 ۱) مربوط به کالیمو ویروس‌ها است.
 ۲) تنها مربوط به پلاسمیدها است.
- کدام یک از یافته‌های بیولوژیکی مولکولی با استفاده از ویروس‌ها کشف نشده است؟
 ۱) شناسایی فاکتورهای رونویسی
 ۲) شناسایی آنزیم آر ان ا پلیمراز
 ۳) شناسایی Cap IRES
- کدام یک از راهبردهای زیر برای تولید گیاه مقاوم مبتنی بر بیمارگر نیست؟
 ۱) تک ژن مقاوم غالب hairpin RNA
 ۲) Dominant resistance gene
 ۳) amiRNA
- دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست

- ۶۷ تازگ در باکتری‌های گرم منفی از نظر ساختمانی و انتقال مواد به کدام نوع از سیستم‌های ترشحی (secretion system) بیشترین شباht و قربت را دارد؟
- ۱) نوع اول ۲) نوع دوم
۳) نوع سوم ۴) نوع چهارم
- ۶۸ علت وجود مقاومت به حرارت و مواد شیمیایی در اندوسپور باکتری‌ها چیست؟
- ۱) وجود Exosporium ۲) وجود پروتئین‌ها و پلی‌ساقاریدها
۳) وجود DPA و کلسیم در دیواره سلولی ۴) وجود پیتیدوگلوکان در دیواره سلولی
- ۶۹ عامل بیماری‌هایی است که اغلب یا همگی آنها به روش‌های قابل انتقال و انتشار به مسافت‌های دور و نزدیک هستند.
- ۱) زنجیرک‌ها و بذر ۲) پیوند و مکانیکی
۳) مکانیکی و زنجیرک‌ها به روش پایا (Persistent)
- ۷۰ علائم زردی ایجاد شده توسط سم (توکسین) تاجتی توکسین (Tagetitoxin) در نتیجه است.
- ۱) بازداری از ساخته شدن اجزای کلروپلاست و برخی از واکنش‌های بیوشیمیایی و جلوگیری از سنتز پروتئین‌ها است.
۲) تخرب کلروپلاست‌های جوان به ویژه تیلاکوئیدها و بازداری از سنتز ذره بزرگ ریبوزومها
۳) تخرب کلروپلاست‌ها به ویژه تیله‌ها، تیلاکوئیدها و ریبوزومها است.
۴) بازداری از واکنش‌های القایی توسط نور (واکنش‌های روز - روشنایی)
- ۷۱ مهم‌ترین نیاز اسپرپلاسمها (spiroplasma) که در ساخت محیط کشت آزمایشگاهی (میکروبی) باید در نظر گرفته و به محیط کشت اضافه و یا تأمین شود شامل است.
- ۱) تأمین کلسترول (یا استرول مشابه یا سرم خون مناسب مثلاً سرم جنین گاو) و فشار اسمزی مناسب (به شکل افزودن ساکاراز یا سوربیتول) است.
۲) افزودن سرم گوساله تازه متولد شده به اضافه تنظیم فشار اسمزی و عصاره مخمر است.
۳) افزودن سرم خون مناسب، تنظیم فشار اسمزی و عصاره مخمر است.
۴) افزودن سرم گوساله یا اسب جوان، تنظیم فشار اسمزی با نمک است.
- ۷۲ بیماری‌های اسپرپلاسمایی گیاهی که تاکنون به طور قطع شناسایی و اثبات بیماری‌زایی شده‌اند، عبارتند از:
- ۱) استاپورن یا ریز برگی مرکبات، زردی اسپرپلاسمایی پروانش، شکنندگی ریشه ترب اسبی و برگ سفیدی مرغ
۲) استاپورن مرکبات (ریز برگی مرکبات)، کوتولگی ذرت، فیلودی و زردی پروانش و شکنندگی ریشه ترب اسبی
۳) استاپورن یا ریز برگی مرکبات، کوتولگی ذرت و شکنندگی ریشه ترب اسبی
۴) استاپورن مرکبات و کوتولگی ذرت از ویژگی‌های مهم بیماری‌های ناشی از *Xylella fastidiosa* است.
- ۷۳ ۱) وقوع بیماری در مناطق گرم‌سیری، ناقل زنجیرک‌ها با رابطه پایا، و انتقال با پیوند
۲) وقوع بیماری در مناطق با زمستان‌های سرد و یخ‌بندان، ناقل زنجیرک‌های متعدد با رابطه ناپایا، انتقال با پیوند
۳) وقوع بیماری در مناطقی با زمستان‌های سرد، ناقلین زنجیرک‌های بسیار اختصاصی با رابطه ناپایا، عدم انتقال مکانیکی یا پیوند
۴) وقوع در مناطق بدون زمستان‌های سرد، انتقال توسط زنجیرک‌های متعدد با رابطه پاتوژن - ناقل از نوع ناپایا، منتهی به پژمردگی و مرگ گیاه آلوده و انتقال با پیوند (graft) با استفاده از کدام خصوصیات زیر می‌توان جنس‌های *Aphelenchoides* و *Paraphelenchus* را از *Aphelenchus* یکدیگر متمایز کرد؟
- ۱) وضعیت انتهای مری، شکل دم و دریچه حباب میانی مری
۲) تعداد شیارهای طولی سطوح جانبی، وضعیت انتهای مری و شکل آلت نرینه
۳) میزان رشد گرهای استایلت، تعداد شیارهای طولی سطوح جانبی و تعداد لوله‌های جنسی
۴) تعداد شیارهای سطوح جانبی، وجود گرهای استایلت و تعداد لوله‌های جنسی
- ۷۴ یون کلسیم در دو فعالیت زیست شناختی نماتدها مثل و نقش مهمی بازی می‌کند.
- ۱) ترشح - بقا ۲) جفت‌گیری - عمل دفع ۳) تغذیه - تخم‌گذاری ۴) تفریخ - انقباض ماهیچه‌ها
- ۷۵ کدام یک از نماتدهای انگل گیاهی زیر دارای استایلت قوی و رشد یافته، همپوشانی مری (overlap) نسبت به روده و دارای دایرید هستند؟
- ۱) *Hirschmanniella* ۲) *Pratylenchoides* ۳) *Scutellonema* ۴) *Hoplolaimus*
- ۷۶ وجود هشت تورم (طناب) اپیدرمی، وجود استایلت در مراحل آلوده کننده و امکان تغذیه از طریق کوتیکول از مشخصات کدام گروه از نماتدها است؟
- ۱) mermithid ۲) heterorhabditid ۳) allontonematid ۴) steinernematid

-۷۸

- چرا به عالمت ایجاد شده توسط **Nacobbus** گره کاذب ریشه گفته می‌شود؟
- ۱) گرهها به ندرت تشکیل می‌شوند.
 - ۲) فقط یک گره در هر ریشه تولید می‌گردد.
 - ۳) گرهها در لای ریشه‌های فرعی نا به جا مخفی هستند.
 - ۴) گرهها تشکیل نمی‌شوند و یا فقط در نوک ریشه دیده می‌شوند.

-۷۹

- با استفاده از کدام صفات می‌توان سه جنس *Paralongidorus* و *Longidorus* و *Xiphinema* را از یکدیگر متمایز کرد؟
- ۱) شکل آمفید- اندازه و محل هسته غده پشتی مری
 - ۲) وجود تورم انتهای استایلت و شکل آمفید و شکل سر
 - ۳) وجود و محل حلقه و یا غلاف هادی استایلت- محل هسته غده پشتی مری
 - ۴) وجود و محل حلقه و یا غلاف هادی استایلت- وجود تورم انتهای استایلت

-۸۰

- اختلافهای مرفولوژیکی که می‌توان بر اساس آن‌ها مراحل فعال خارج از ریشه نماتدهای ریشه گرهی را از نماتدهای سیستی متمایز کرد، کدام است؟
- ۱) مشخصات سطح کوتیکول، شیارهای سطوح جانبی و شکل سر
 - ۲) میزان رشد استایلت، شبکه کوتیکولی سر، نوع هم پوشانی مری
 - ۳) نوع همپوشانی مری، مشخصات دم و محل قرار گرفتن آمفید
 - ۴) شکل سر، محل قرار گرفتن آمفید، تعداد و آرایش شیارهای عرضی دم