



272F

کد کنترل

272

F

## آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

### دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

رشته آمار  
(کد ۲۲۳۲)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مجموعه دروس تخصصی:	مواد امتحانی
- سیانی آنالیز ریاضی - ریاضی عمومی ۱	۲۵
- احتمال ۱	۲۵
- استنباط آماری ۱	۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوال‌های هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حرفی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفان برای مفروضات رفتار می‌شود.

# پی اچ دی تست؛ فحستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

این‌جانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان‌بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ فرض کنید  $\{x_n\}$  یک دنباله بازگشتی باشد به‌طوری‌که  $x_1 = x_n$  و به‌ازای هر  $n \in \mathbb{N}$ . در

این صورت دنباله  $\{x_n\}$ :

- (۱) بی‌کران است و لذا واگرا است.
- (۲) نزولی و کراندار است و لذا همگرا است.
- (۳) کوشی نیست و لذا واگرا است.
- (۴) صعودی و کراندار است و لذا همگرا است.

-۲ کدام گزینه درباره سری  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{1+n^2})$  درست است؟

- (۱) همگرای مطلق است.
- (۲) همگرای مشروط است.
- (۳) واگرا به بی‌نهایت است.
- (۴) دنباله مجموع جزئی آن کراندار است ولی سری واگرا است.

-۳ فرض کنید  $A$  زیرمجموعه‌ای نامتناهی و سره از  $\mathbb{R}$  باشد و  $A^\circ$  و  $\partial A$  به ترتیب مجموعه نقاط درونی و مرزی  $A$  باشند. کدام گزینه درست است؟

- (۱) اگر  $A^\circ$  متناهی باشد، آنگاه  $A^\circ = \emptyset$ .
- (۲) اگر  $\partial A$  نامتناهی باشد، آنگاه  $A^\circ = \emptyset$ .
- (۳) اگر  $\partial A$  نامتناهی باشد، آنگاه  $(\partial A)^\circ \neq \emptyset$ .
- (۴) اگر  $A$  باز و در  $\mathbb{R}$  چگال باشد، آنگاه  $\partial A$  متناهی است.

-۴ فرض کنید تابع  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  به ازای هر  $x, y \in \mathbb{R}$  در شرط  $f(x+y) = f(x) + f(y)$  صدق کند. کدام گزینه معادل پیوستگی  $f$  بر  $\mathbb{R}$  نیست؟

- (۱) ایکنووا است.
- (۲)  $f$  بر هر بازه بسته و کراندار انتگرال پذیر ریمان است.
- (۳)  $f | \mathbb{Q}^c$  (تحدید  $f$  به مجموعه اعداد گنگ)، پیوسته است.
- (۴)  $f | \mathbb{Q}$  (تحدید  $f$  به مجموعه اعداد گویا)، پیوسته است.

# پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

-۵- فرض کنید تابع حقیقی  $f$  بر بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر باشد. کدام گزینه درست است؟

(۱) اگر  $f'$  بر  $(a, b)$  پیوسته باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود است.

(۲) اگر  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود باشد، آنگاه  $f'$  بر  $(a, b)$  کراندار است.

(۳) اگر  $f'$  بر  $(a, b)$  کراندار باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود است.

(۴) اگر  $f$  بر  $(a, b)$  کراندار باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود است.

-۶- حاصل کدام است؟  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(2n)!(3n)!}{n!(4n)!} \right)^{\frac{1}{n}}$

$\frac{27}{64}$  (۱)

$\frac{9}{64}$  (۲)

$\frac{27}{16}$  (۳)

$\frac{9}{16}$  (۴)

-۷- حاصل کدام است؟  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{4n}}{4^n (2n-1)!}$

$\frac{\pi}{2}$  (۱)

$\frac{\pi}{4}$  (۲)

$-\frac{\pi}{2}$  (۳)

$-\frac{\pi}{4}$  (۴)

-۸- شاع همگرایی سری  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} x^n$  کدام است؟

$e$  (۱)

$\frac{1}{e}$  (۲)

$\infty$  (۳)

$1$  (۴)

# پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۴

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

-۹ معادلات پارامتری زیر معرف کدام منحنی در صفحه است؟

$$\begin{cases} x = 1 + t \cosh t \\ y = t \sinh t \end{cases} \quad -\infty < t < \infty$$

۲) دو خط متقطع

(۱) سهمی

۴) یک شاخه از یک هذلولی

(۳) بیضی

-۱۰ مقدار انتگرال  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos^2 x) \cdot \cos(\sin^2 x) dx$  کدام است؟

$\frac{\pi}{4} \cos 1$  (۱)

$\frac{\pi}{4} \sin 1$  (۲)

$\frac{\pi}{2} \cos 1$  (۳)

$\frac{\pi}{2} \sin 1$  (۴)

-۱۱ مینیمم مقدار تابع  $f(x, y, z) = xyz + z^2$  بر سطح کره واحد به مرکز مبدأ، کدام است؟

$-\frac{11}{27}$  (۱)

$-\frac{5}{27}$  (۲)

$-\frac{8}{27}$  (۳)

$\frac{1}{27}$  (۴)

-۱۲ حجم ناحیه محدود به رویه‌های  $x^2 + y^2 + 3z = 4$  و  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کدام است؟

$\pi$  (۱)

$\frac{\pi}{2}$  (۲)

$\frac{\pi}{3}$  (۳)

$\frac{\pi}{4}$  (۴)

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

۱۳ - اگر  $\chi$  م حاصل از برخورد دو رویه  $S_2 : 4x^2 - 4y^2 + 4z^2 = 3$  ،  $S_1 : x^2 - y^2 - z^2 = \frac{1}{4}$  در نیم‌فضای  $x > 0$

و در جهت راست‌گرد باشد و  $\oint_C F \cdot dr = (x, -z, y)$  آن‌گاه کدام است؟

$\frac{\pi}{2}$  (۱)

$\frac{\pi}{3}$  (۲)

$\pi$  (۳)

$\frac{3}{2}$  (۴)

۱۴ - در کیسه اول ۴ مهره قرمز و ۶ مهره آبی و در کیسه دوم ۱۶ مهره قرمز و تعدادی مهره آبی وجود دارد. یک مهره به تصادف از هر کیسه انتخاب می‌شود، اگر احتمال اینکه هر دو مهره انتخابی همنگ باشند به تقریب برابر  $0.44$  باشد، تعداد مهره‌های آبی کیسه دوم چقدر است؟

۱۰ (۱)

۸ (۲)

۶ (۳)

۴ (۴)

۱۵ - شخصی یک تاس سالم را به صورت متوالی پرتاب می‌کند. اگر شماره روی تاس ۶ بالا بباید، فوراً برنده می‌شود (و بازی متوقف می‌گردد) و اگر شماره روی تاس  $k$  بباید، برای هر  $k$  بین ۱ تا ۵، دقیقه صیر کرده و سپس دوباره تاس را پرتاب می‌کند. متوسط زمان سپری شده از زمان شروع به پرتاب تا برنده شدن، کدام است؟ (توجه: اگر شخص در اولین پرتاب برنده شود، زمان سپری شده را صفر در نظر بگیرید).

۱۵ (۱)

۲۰ (۲)

۲۵ (۳)

۳۰ (۴)

۱۶ - اگر متغیر تصادفی  $X$  دارای توزیع کشی استاندارد با تابع توزیع  $F(x)$  باشد، مقدار

$\ln(2)$  (۱)

$\frac{1}{3}$  (۲)

$1 - \ln(2)$  (۳)

وجود ندارد. (۴)

# پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۶

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

- ۱۷ - A و B بهطور مستقل از هم سکه‌ای را سه بار پرتاب می‌کنند. با فرض سالم بودن سکه، احتمال آنکه تعداد شیرها در پرتاب‌های آن‌ها یکسان باشد چقدر است؟

$$\frac{1}{8} \quad (1)$$

$$\frac{11}{64} \quad (2)$$

$$\frac{5}{16} \quad (3)$$

$$\frac{7}{64} \quad (4)$$

- ۱۸ - اگر X یک متغیر تصادفی پواسون باشد، آنگاه مقدار  $\frac{E[X(X-1)(X-2)(X-3)]}{E[X(X-1)]}$  کدام است؟

$$\frac{E[X^4]}{E[X^2]} \quad (1)$$

$$E[X(X-1)] \quad (2)$$

$$E[X^3] \quad (3)$$

$$E[(X-2)(X-3)] \quad (4)$$

- ۱۹ - فرض متغیر تصادفی X دارای توزیع یکنواخت  $[0, 1]$  باشد،تابع چگالی احتمال  $Y = \frac{X}{1+X}$  کدام است؟

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\ln 2(1-y)} & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases} \quad (1)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y(1-y) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases} \quad (2)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y)^2 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases} \quad (3)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} (1-y)^{-2} & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases} \quad (4)$$

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۷

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

۲۰ - اگر  $Y$  روی فاصله  $[1, 9]$  دارای توزیع یکنواخت باشد،تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی  $U = Y^2$  کدام است؟

$$f(u) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda\sqrt{u}} & 0 \leq u \leq 1 \\ \frac{1}{4\sqrt{u}} & 1 < u \leq 9 \end{cases} \quad (1)$$

$$f(u) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{u}} & 0 \leq u \leq 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{u}} & 1 < u \leq 9 \end{cases} \quad (2)$$

$$f(u) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq u \leq 1 \\ \frac{1}{16} & 1 < u \leq 9 \end{cases} \quad (3)$$

۴) دارای توزیع یکنواخت روی  $[1, 9]$

۲۱ - فرض کنید تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی  $X$  برابر  $M_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3}\right)^n$  باشد. مقدار واریانس  $X$  کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{1}{9} \quad (2)$$

$$\frac{1}{27} \quad (3)$$

$$\frac{1}{81} \quad (4)$$

۲۲ - فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع از  $E(3X - 2Y | X + Y = 2) = \text{Bin}\left(3, \frac{1}{4}\right)$  باشند. مقدار

کدام است؟

$$1 \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{1}{4} \quad (4)$$

# پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۳- فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی مستقل باشند به‌طوری که  $(X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2))$  است.  
تحت چه شرطی  $L_2 = C_1X + C_2Y$  و  $L_1 = C_3X + C_4Y$  مستقل هستند؟

$$C_1 + C_3 + C_2 + C_4 = 0 \quad (1)$$

$$C_1C_2 + C_3C_4 = 0 \quad (2)$$

$$C_1C_4 + C_2C_3 = 0 \quad (3)$$

$$C_1C_3 + C_2C_4 = 0 \quad (4)$$

- ۲۴- فرض کنید  $X_1, X_2$  و  $X_3$  مستقل و به ترتیب دارای توزیع نمایی با میانگین‌های  $\lambda_1, \lambda_2$  و  $\lambda_3$  باشند.

$$P(X_1 = \min\{X_1, X_2, X_3\})$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \quad (1)$$

$$\frac{1}{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)}} \quad (2)$$

$$\frac{e^{-\lambda_1}}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} \quad (3)$$

$$\frac{e^{-\lambda_1}}{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)}} \quad (4)$$

- ۲۵- فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی گسسته با تابع جرم احتمال توأم زیر باشند.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} p^r(1-p)^{x+y-r} & x, y = 1, 2, \dots ; 0 < p < 1 \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$$

$$P(Y = 2X)$$

$$\frac{p^r(1-p)}{1 - (1-p)^r} \quad (1)$$

$$\frac{p^r(1-p)}{(1-p)^r(1-p)^r} \quad (2)$$

$$\frac{p(1-p)^r}{1 - (1-p)^r} \quad (3)$$

$$\frac{p^r}{(1-p)^r(1 - (1-p)^r)} \quad (4)$$

- ۲۶- فرض کنید  $X_1, X_2, X_3$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $U(0, 1)$  باشد. اگر  $(M \leq m, L \leq \ell)$  باشد، آنگاه مقدار  $P(M \leq m, L \leq \ell)$  کدام است؟

$$2m^r - 3(m-\ell)^r \quad (1)$$

$$2m^r - 2(m-\ell)^r \quad (2)$$

$$3m^r - 2(m-\ell)^r \quad (3)$$

$$m^r - (m-\ell)^r \quad (4)$$

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

- ۲۷- فرض کنید  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی باشد به‌طوری‌که

$$P\left[X_n = -\frac{1}{n}\right] = P\left[X_n = \frac{1}{n}\right] = \frac{1}{2} \quad \forall n \geq 1$$

اگر  $F(x)$  توزیع حدی  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  باشد، کدام گزینه صحیح است؟

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} < x \\ 1 & x > 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \end{cases} \quad (3)$$

(۴) توزیع حدی وجود ندارد.

- ۲۸- فرض کنید  $N(\theta, 1)$  دو نمونه تصادفی مستقل از هم به‌ترتیب از توزیع‌های  $(1)$  و  $(2)$  باشند. اگر قرار دهیم  $Z_i = X_i Y_i$ ، در این صورت آماره بسنده مینیمال برای  $(\theta, p)$ ، کدام است؟

$$\left( \sum_{i=1}^n I(Z_i = 0), \sum_{i=1}^n I(Z_i = 1) \right) \quad (1)$$

$$\left( \sum_{i=1}^n Z_i, \sum_{i=1}^n I(Z_i = 0) \right) \quad (2)$$

$$\left( \sum_{i=1}^n Z_i I(Z_i = 1), \sum_{i=1}^n Z_i I(Z_i = 0) \right) \quad (3)$$

$$\left( \sum_{i=1}^n Z_i, \sum_{i=1}^n I(Z_i = 1) \right) \quad (4)$$

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

-۲۹- اگر  $f_\theta(x) = e^{x-\theta}$ ,  $-\infty < x \leq \theta$  باشد،  $X_1, X_2, \dots, X_n$  نمونه‌ای تصادفی از توزیعی با تابع چگالی

$$\left( S^r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^r \right) \text{ کدام است؟} E(X_{(n)} S^r)$$

$$\theta - \frac{1}{n} \quad (1)$$

$$\theta - \frac{1}{n+1} \quad (2)$$

$$\theta + \frac{1}{n} \quad (3)$$

$$\theta + \frac{1}{n+1} \quad (4)$$

-۳۰- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع یکنواخت روی بازه  $(|\theta, \theta+1|)$  باشد که در آن  $\theta \neq 0$  است. برآورد گشتاوری  $\theta$ , کدام است؟

$$\hat{\theta} = 2\bar{X}I(\bar{X} > 0) + \frac{3}{2}\bar{X}I(\bar{X} < 0) \quad (1)$$

$$\hat{\theta} = 2\bar{X}I(\bar{X} > 0) + \frac{2}{3}\bar{X}I(\bar{X} < 0) \quad (2)$$

$$\hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{X}I(\bar{X} > 0) + 2\bar{X}I(\bar{X} < 0) \quad (3)$$

$$\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{X}I(\bar{X} > 0) + 2\bar{X}I(\bar{X} < 0) \quad (4)$$

-۳۱- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $Bin\left(2, \frac{\theta}{1+\theta}\right)$  باشد که در آن  $\theta > 0$  است. برآوردگر ماکسیمم درستنمایی  $\theta$ , کدام است؟

$$\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}} \quad (1)$$

$$\frac{\bar{X}}{2-\bar{X}} \quad (2)$$

$$\frac{\bar{X}}{1+\bar{X}} \quad (3)$$

(4) وجود ندارد.

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۱

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

- ۳۲- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  نمونه‌ای تصادفی (مستقل و هم توزیع) از جامعه‌ای با تابع چگالی احتمال زیر باشد.

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta-1}{3} \left(1 + \frac{x}{3}\right)^{-\theta} ; \quad x > 0, \quad \theta > 1$$

برآوردگر ماکزیمم درست‌نمایی برای پارامتر  $\theta$ ، کدام است؟

$$1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1 + \frac{X_i}{3})} \quad (1)$$

$$1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1 + \frac{X_i}{3}) \quad (2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1 + \frac{X_i}{3}) \quad (3)$$

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1 + \frac{X_i}{3})} \quad (4)$$

- ۳۳- فرض کنید  $X$  دارای تابع چگالی احتمال  $f_{\theta}(x) = \frac{1}{\sqrt{\theta}} e^{-|x-\theta|}$  ;  $x \in \mathbb{R}$  ،  $\theta \in \{1, 2, 4\}$  است. با استفاده از یافته نمونه تصادفی  $x_1 = 1$  ،  $x_2 = 2$  ،  $x_3 = 3$  برآورد ماکزیمم درست‌نمایی  $\theta$ ، کدام است؟

$$\hat{\theta} = a , \quad a \in \{1, 4\} \quad (1)$$

$$\hat{\theta} = a , \quad a \in \{2, 4\} \quad (2)$$

$$\hat{\theta} = a , \quad a \in \{1, 2\} \quad (3)$$

$$\hat{\theta} = a , \quad a \in \{1, 2, 4\} \quad (4)$$

- ۳۴- اگر  $P(X_1 < 0)$  باشد، برآوردگر UMVUE برای  $\theta \in \mathbb{R}$  که  $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\theta, 1)$  است.

( $\Phi$ ) تابع توزیع نرمال استاندارد است).

$$\Phi\left(\sqrt{\frac{n-1}{n}} \bar{X}\right) \quad (1)$$

$$\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{n-1}} \bar{X}\right) \quad (2)$$

$$\Phi\left(-\sqrt{\frac{n-1}{n}} \bar{X}\right) \quad (3)$$

$$\Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{n-1}} \bar{X}\right) \quad (4)$$

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

- ۳۵ - فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  نمونه‌ای تصادفی از توزیع  $F(x)$  باشد که در آن  $F(x)$  یک تابع توزیع پیوسته معلوم است و  $\theta > 0$  پارامتر  $\theta$  کدام است؟

$$\frac{1}{n(n-1)} \left[ \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \right] \quad (1)$$

$$\frac{1}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n (\ln F(X_i))^2 \quad (2)$$

$$\frac{1}{n(n+1)} \left[ \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \right]^2 \quad (3)$$

$$\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\ln F(X_i))^2 \quad (4)$$

- ۳۶ - فرض کنید  $T = \sum_{i=1}^n X_i$  نمونه‌ای تصادفی از توزیع دوجمله‌ای  $B(1, p)$  باشد و قرار دهید اگر

- $h_m(T)$ ، بهترین برآوردگر ناواریب  $(UMVUE)$  باشد، در این صورت بهترین برآوردگر ناواریب  $P(X_1 + X_2 > X_3)$  کدام است؟

$$2h_1(T) - 2h_2(T) + 3h_3(T) \quad (1)$$

$$2h_1(T) + 2h_2(T) + 2h_3(T) \quad (2)$$

$$3h_1(T) + 2h_2(T) + 3h_3(T) \quad (3)$$

$$2h_1(T) - 3h_2(T) + 2h_3(T) \quad (4)$$

- ۳۷ - فرض کنید  $Y_1, \dots, Y_n$  یک نمونه تصادفی مستقل و هم توزیع از یک جامعه با تابع چگالی زیر باشد:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{\theta\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2\theta^2}} & y > 0, \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

- یک برآوردگر سازگار بر حسب  $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$  برای  $\theta$ ، کدام است؟

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Y} \quad (1)$$

$$\sqrt{2\pi}\bar{Y} \quad (2)$$

$$\frac{\pi\bar{Y}}{2} \quad (3)$$

$$\sqrt{2\pi}\bar{Y} \quad (4)$$

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۳

آزمون (نیمه‌مت مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

- ۳۸ - فرض کنید  $\theta = 5^\circ$ ,  $x_1 = 0^\circ/25$ ,  $x_2 = 1^\circ$ ,  $x_3 = 0^\circ/25$  یافته‌های یک نمونه تصادفی از توزیع یکنواخت پیوسته  $(U(0, \theta))$  و

$L(\theta, a) = \left( \frac{a - \theta}{\theta} \right)^3$  نیز دارای توزیع پیشین یکنواخت پیوسته  $(U(0, 2))$  است. تحت تابع زیان توان دوم خطای وزنی

برآورده بیز پارامتر  $\theta^3$ , کدام است؟

$$\frac{3}{8} \quad (1)$$

$$\frac{15}{32} \quad (2)$$

$$\frac{8}{3} \quad (3)$$

$$\frac{32}{15} \quad (4)$$

- ۳۹ - فرض کنید  $(\theta - \delta) \sim N(\theta, 1)$  و  $X | \theta \sim N(\theta, 1)$ . با در نظر گرفتن تابع زیان  $1 - (\delta - \theta)$ .

برآورده بیز  $\theta$ , کدام است؟

$$\frac{X}{2} + \frac{1}{4} \quad (1)$$

$$\frac{X}{2} + \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{X}{2} - \frac{1}{4} \quad (3)$$

$$\frac{X}{2} - \frac{1}{2} \quad (4)$$

- ۴۰ - فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع گاما با میانگین  $\frac{\alpha}{\lambda}$  باشد که در آن  $\alpha$  معلوم است. با انتخاب توزیع

پیشین ناسرة  $\pi(\lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda}$  و تحت زیان توان دوم خطای برآورده بیزی تعمیم یافته برای پارامتر  $\lambda$ , کدام است؟

$$n\alpha \sum X_i \quad (1)$$

$$\frac{n\alpha}{\sum X_i} \quad (2)$$

$$\frac{\alpha(n-1)}{\sum X_i} \quad (3)$$

$$\alpha(n-1) \sum X_i \quad (4)$$

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۴

آزمون (نیمه‌مت مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

- ۴۱ فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  نمونه‌ای تصادفی از توزیعی با تابع چگالی احتمال زیر باشد.

$$f_{\theta}(x) = \frac{\gamma}{\theta^{\gamma}} e^{-\frac{x^{\gamma}}{\theta^{\gamma}}}; \quad x > 0, \quad \theta > 0$$

برآوردگر بیزی تعمیم‌یافته  $\theta$  تحت تابع زیان  $L(\theta, \delta) = (1 - \frac{\delta}{\theta})^2$  و نسبت به پیشین جفریز، کدام است؟

$$\frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n+\frac{1}{\gamma})} \sqrt{\sum X_i^{\gamma}} \quad (\textcircled{\text{۱}})$$

$$\frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n+\frac{1}{\gamma})} \sum X_i^{\gamma} \quad (\textcircled{\text{۴}})$$

$$\frac{\Gamma(n+\frac{1}{\gamma})}{\Gamma(n+1)} \sqrt{\sum X_i^{\gamma}} \quad (\textcircled{\text{۱}})$$

$$\frac{\Gamma(n+\frac{1}{\gamma})}{\Gamma(n+1)} \sum X_i^{\gamma} \quad (\textcircled{\text{۴}})$$

- ۴۲ فرض کنید  $\delta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + a$  و  $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bin}(1, \theta)$  باشد. تحت تابع

زیان توان دوم خطأ  $(\delta - \theta)^2$  برآوردگر مینیماکس برای  $\theta$  در این کلاس، کدام است؟

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n+1} \quad (\textcircled{\text{۱}})$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \quad (\textcircled{\text{۲}})$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n} \quad (\textcircled{\text{۳}})$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (\textcircled{\text{۴}})$$

- ۴۳ از میان برآوردگرهای  $D_1, D_2$  و  $D_3$  برای پارامتر  $\theta \in [1, 2]$  که به ترتیب دارای توابع مخاطره ۱

$R_1(\theta) = a\theta - 1$  و  $R_2(\theta) = -\theta^2 + a\theta$  هستند، برآوردگرهای مینیماکس و مجاز به ترتیب کدامند؟

$D_1, D_1 \quad (\textcircled{\text{۱}})$

$D_3, D_3 \quad (\textcircled{\text{۲}})$

$D_3, D_1 \quad (\textcircled{\text{۳}})$

$D_1, D_3 \quad (\textcircled{\text{۴}})$

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۵

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F

۴۴- مسئله تصمیم بدون داده با تابع زیان زیر را در نظر بگیرید.

A θ	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>
θ <sub>1</sub>	۰	۱۰	۴
θ <sub>2</sub>	۸	۰	۲

عمل مینیماکس آمیخته کدام است؟

$$\left( \frac{1}{8}, 0, \frac{7}{8} \right) \quad (1)$$

$$\left( \frac{1}{9}, \frac{8}{9}, 0 \right) \quad (2)$$

$$\left( \frac{1}{9}, 0, \frac{8}{9} \right) \quad (3)$$

$$\left( \frac{1}{8}, \frac{7}{8}, 0 \right) \quad (4)$$

۴۵- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  نمونه‌ای تصادفی از  $\text{Bin}(1, p)$  باشد. در برآورد پارامتر  $p$  فرض کنید تابع زیان را

در نظر بگیریم. کدامیک از گزاره‌های زیر درست است؟

$$\frac{n\bar{X}}{n+1} \quad (1) \quad \text{یک برآورده‌گر مجاز است.}$$

$$\bar{X} \quad (2) \quad \text{یک برآورده‌گر مجاز است.}$$

$$\frac{n+1}{n}\bar{X} \quad (3) \quad \text{یک برآورده‌گر مجاز است.}$$

$$\frac{n-1}{n}\bar{X} \quad (4) \quad \text{یک برآورده‌گر مجاز است.}$$

# پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۶

آزمون (نیمه‌تمم‌کز) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۲۳۲) ۲۷۲F