



307F

کد کنترل

307

F

آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کد ۲۳۲۲)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی
مجموعه دروس تخصصی: – ریاضیات مهندسی – مکانیک محیط پیوسته – تئوری الاستیسیتیه	۴۵	۱	۴۵	۱۵۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوال‌ها به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حرفی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفان برای مفروضات رفتار می‌شود.

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

307F

آزمون (نیمه‌تمترکز) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲)

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

۱- اگر $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ حول مبدأ مختصات کدام است؟

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n - 1}{z^{n+1}} \quad (1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1 - \frac{1}{z^{n+1}}) \frac{1}{z^n} \quad (2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1 + \frac{1}{z^{n+1}}) \frac{1}{z^{n+1}} \quad (3)$$

$$-\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} \right) \quad (4)$$

۲- کدام تبدیل $w = u + i v$ ، دایره‌ای به معادله $|z| = r$ را روی دایره‌ای به معادله $|w| = r$ می‌نگارد؟

$$w = \frac{z - 3}{z + 3} \quad (1)$$

$$w = \frac{z + 3}{z - 3} \quad (2)$$

$$w = 2 \frac{z - 3}{z + 3} \quad (3)$$

$$w = 2 \frac{z + 3}{z - 3} \quad (4)$$

۳- تابع $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ، بخش حقیقی تابع تحلیلی است. مقدار $f'(i)$ و $f''(i)$ به ترتیب از راست به چه کدام‌اند؟

(۱) $-3 + 6i$

(۲) $3 - 6i$

(۳) $3 + 6i$

(۴) $6i$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۴۲) ۳۰۷F

باشد، مقدار $u\left(\frac{\pi}{4}, t\right)$ ، کدام است؟

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & 0 \leq x \leq \pi, t \geq 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 & \text{اگر } u(x, t) \text{ جواب معادله} \\ u(x, 0) = \sin x + \sin 2x & 0 < x < \pi \end{cases}$$


$$\frac{e^t + 1}{e^t} \quad (1)$$

$$\frac{e^t - 1}{e^t} \quad (2)$$

$$\frac{e^{10} + 1}{e^{10}} \quad (3)$$

$$\frac{e^4 - 1}{e^4} \quad (4)$$

پاسخ معادله لاپلاس در داخل تونل شکل زیر، برای $C = 0$ و $B = \begin{cases} V_0 & 0 < x < 2 \\ 0 & 2 < x < 4 \end{cases}$ ، کدام است؟



$$U(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{V_0 \sin\left(\frac{m\pi}{4}y\right)}{m\pi \sinh\left(\frac{m\pi}{4}\right)} \cos\left(\frac{m\pi}{4}x\right) \sinh\left(\frac{m\pi}{4}y\right) \quad (1)$$

$$U(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{V_0 \sin\left(\frac{m\pi}{4}y\right)}{m\pi \sinh\left(\frac{m\pi}{4}\right)} \cos\left(\frac{m\pi}{4}x\right) \sinh\left(\frac{m\pi}{4}y\right) \quad (2)$$

$$U(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{V_0 \sin\left(\frac{m\pi}{4}y\right)}{m\pi \sinh\left(\frac{m\pi}{4}\right)} \cos\left(\frac{m\pi}{4}x\right) \sinh\left(\frac{m\pi}{4}y\right) \quad (3)$$

$$U(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{V_0 \sin\left(\frac{m\pi}{4}y\right)}{4m\pi \sinh\left(\frac{m\pi}{4}\right)} \sin\left(\frac{m\pi}{4}x\right) \sinh\left(\frac{m\pi}{4}y\right) \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۴

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲) ۳۰۷F

-۶ با استفاده از قضیه مانده‌ها حاصل انتگرال $\oint_{z=1} z^m e^z dz$ ، کدام است؟

$$\frac{\pi i}{(m+1)!} \quad (1)$$

$$\frac{2\pi i}{m!} \quad (2)$$

$$\frac{2\pi i}{(m+1)!} \quad (3)$$

$$\frac{\pi i}{m!} \quad (4)$$

-۷ حاصل انتگرال کوشی $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 2x + 2} dx$ ، کدام است؟

$$\frac{\pi}{2e}(\sin 1 - \cos 1) \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2e}(\cos 1 + \sin 1) \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{e}(\sin 1 - \cos 1) \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{e}(\sin 1 + \cos 1) \quad (4)$$

-۸ حاصل عبارت $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{1+z+z^2+z^3}$ ، کدام است؟

$$-\pi i \quad (1)$$

$$-\frac{\pi}{2}i \quad (2)$$

(3) صفر

$$\pi i \quad (4)$$

-۹ اگر بسط فوریه تابع $f(x) = \sin \alpha x$ برای $x \in [-\pi, \pi]$ که α عدد غیرصحیح است، به صورت

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(16n^2 - 1)^2} f(x) = \frac{2 \sin(\alpha\pi)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n-1}}{n^2 - \alpha^2} \sin(nx)$

قضیه پارسوال کدام است؟

$$\frac{\pi^2 - 2\pi}{512} \quad (1)$$

$$\frac{\pi^2 + 2\pi}{256} \quad (2)$$

$$\frac{\pi^2 - 2\pi}{128} \quad (3)$$

$$\frac{\pi^2 - \pi}{512} \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲) ۳۰۷F

- ۱۰ - فرض کنیم $f(x) = (2\sin x - 3\cos x)^r$ ، سری فوریه مثلثاتی تابع $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$ روى باشد. در این صورت، مقدار $a_0 \times b_2$ کدام است؟

- (۱) -۱۵
(۲) -۲۷
(۳) -۳۶
(۴) -۳۹

$$\int_0^\infty \frac{\omega \sin \omega x}{\omega^4 + 64} d\omega, \text{ باشد، حاصل عبارت } \int_0^\infty \frac{\omega \sin \omega x}{\omega^4 + k^4} d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-kx} \quad ۱۱$$

$$(\sin \alpha x = \frac{1}{2i} (e^{i\alpha x} - e^{-i\alpha x}))$$

$$\frac{\pi}{16} e^{-2x} \sin 2x \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{16} e^{-2x} \cos 2x \quad (۲)$$

$$\frac{\pi}{4} e^{-x} \sin x \quad (۳)$$

$$\frac{\pi}{4} e^{-x} \cos x \quad (۴)$$

- ۱۲ - فرض کنید \ln شاخه اصلی لگاریتم است. در این صورت حاصل انتگرال $\oint_{|z+i|=1} \frac{\ln(z)}{(z+i)^r} dz$ کدام است؟

- (۱) - πi
(۲) πi
(۳) - $2\pi i$
(۴) $2\pi i$

- ۱۳ - اگر ناحیه $2\pi = |z|$ را تحت رابطه $w = z + \frac{2}{z}$ ، نگاشت کنیم، مساحت ناحیه نگاشت شده چقدر است؟

- (۱) 2π
(۲) 3π
(۳) 4π
(۴) 6π

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۶

307F

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲)

- ۱۴- اگر برای $2 < x < \infty$ داشته باشیم: $x = \frac{4}{\pi}(\sin \frac{\pi x}{2} - \frac{1}{2}\sin \frac{2\pi x}{2} + \frac{1}{3}\sin \frac{3\pi x}{2} - \dots)$ در این صورت ضریب جمله $\cos \pi x$, در بسط عبارت x^2 , کدام است؟

$$\frac{16}{\pi^2} \quad (1)$$

$$\frac{8}{\pi^2} \quad (2)$$

$$\frac{4}{\pi^2} \quad (3)$$

$$\frac{2}{\pi^2} \quad (4)$$

- ۱۵- جواب معادله دیفرانسیل مشتقات نسبی $U(0,t) = U(\pi,t) = U(x,0) = 0$, کدام است؟

$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx} \\ U(0,t) = U(\pi,t) = U(x,0) = 0 \\ U_t(x,0) = k \sin 4x - \frac{k}{2} \sin 6x \end{cases}$$

$$U(x,t) = \frac{k}{3} \sin 4t \sin 4x - \frac{k}{12} \sin 6t \sin 6x \quad (1)$$

$$U(x,t) = \frac{k}{4} \sin 4t \sin 4x - \frac{k}{12} \sin 6t \sin 6x \quad (2)$$

$$U(x,t) = \frac{k}{3} \sin 4t \sin 4x - \frac{k}{4} \sin 6t \sin 6x \quad (3)$$

$$U(x,t) = \frac{k}{9} \sin 4t \sin 4x - \frac{k}{12} \sin 6t \sin 6x \quad (4)$$

- ۱۶- تانسور تنش در نقطه‌ای به شکل زیر است:

$$[T] = \begin{bmatrix} 14 & 7 & -7 \\ 7 & 21 & 0 \\ -7 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

بردار تنش را بر روی صفحه $6x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 12$ که از نقطه مذبور عبور می‌کند، کدام است؟

$$\vec{t} = 95 \vec{e}_1 + 63 \vec{e}_2 \quad (1)$$

$$\vec{t} = 6 \vec{e}_1 + 12 \vec{e}_2 + 9 \vec{e}_3 \quad (2)$$

$$\vec{t} = 95 \vec{e}_1 + 84 \vec{e}_2 + 63 \vec{e}_3 \quad (3)$$

$$\vec{t} = 11 \vec{e}_1 + 12 \vec{e}_2 + 9 \vec{e}_3 \quad (4)$$

- ۱۷- هرگاه تانسور تنش در یک نقطه از یک محیط پیوسته به صورت زیر بیان شود و مقادیر اصلی تنش در این نقطه به صورت زیر باشد، مقدار x چند مگاپاسکال است؟

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 7 & x & 0 \\ x & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\sigma_{(2)} = 3 \text{ MPa}, \sigma_{(2)} = 6 \text{ MPa}, \sigma_{(1)} = 9 \text{ MPa}$$

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۷

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲) ۳۰۷F

- ۱۸- حالت تنفس سه‌بعدی جسمی به صورت زیر است. تنفس نرمال و برشی در نقطه (۱,۱,-۲) در سطح داخلی یک کره با معادله $x_1^2 + (x_2 - 2)^2 + x_3^2 = 6$ ، کدام است؟

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} 2 & 2,5 & 2,5 \\ 2,5 & 0 & -1,5 \\ 2,5 & -1,5 & 1 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\dot{\epsilon}_{\text{normal}} = -\frac{17}{6\sqrt{6}}(-c_1 + c_2 - c_3), \dot{\epsilon}_{\text{shear}} = \frac{22}{6\sqrt{6}}(c_1 - c_2 - 2c_3) \quad (1)$$

$$\dot{\epsilon}_{\text{normal}} = \frac{22}{6\sqrt{6}}(c_1 - c_2 - 2c_3), \dot{\epsilon}_{\text{shear}} = -\frac{17}{6\sqrt{6}}(-c_1 + c_2 - c_3) \quad (2)$$

$$\dot{\epsilon}_{\text{normal}} = -\frac{17}{6\sqrt{6}}(c_1 - c_2 - 2c_3), \dot{\epsilon}_{\text{shear}} = \frac{22}{6\sqrt{6}}(-c_1 + c_2 - c_3) \quad (3)$$

$$\dot{\epsilon}_{\text{normal}} = -\frac{17}{6\sqrt{6}}(-c_1 + c_2 - 2c_3), \dot{\epsilon}_{\text{shear}} = \frac{22}{6\sqrt{6}}(c_1 - c_2 - 2c_3) \quad (4)$$

- ۱۹- عبارت اندیسی $(a_{ij}x_i x_j)_{,k}$ ثابت باشد، کدام است؟

$$a_{ik}x_i + a_{kj}x_j \quad (1)$$

$$a_{ij}x_i + a_{jk}x_j \quad (2)$$

$$a_{jk}x_i + a_{ik}x_j \quad (3)$$

$$a_{ki}x_i + a_{ij}x_j \quad (4)$$

- ۲۰- ترم $\epsilon_{ijk}\epsilon_{mjn}T_{pm}v_n$ ، معادل کدام یک از ترم‌های زیر است؟ ϵ_{ijk} همان تانسور تناوب permutation است.

$$T_{pi}v_k - T_{pk}v_i \quad (1)$$

$$T_{pk}v_i - T_{pi}v_k \quad (2)$$

$$T_{kp}v_i - T_{pi}v_k \quad (3)$$

$$T_{ki}v_p - T_{pk}v_i \quad (4)$$

- ۲۱- حاصلضرب خارجی دو بردار V و W به صورت $\nabla \times (V \times W)$ نوشته می‌شود. این عبارت برابر کدام است؟

$$(\nabla \cdot V)W + (W \cdot \nabla)V - V(\nabla \cdot W) - (V \cdot \nabla)W \quad (1)$$

$$(W \cdot \nabla)V - V(\nabla \cdot W) + W(\nabla \cdot V) - (V \cdot \nabla)W \quad (2)$$

$$(W \cdot \nabla)V + V(\nabla \cdot W) - W(\nabla \cdot V) - (V \cdot \nabla)W \quad (3)$$

$$(\nabla \cdot V)W - (W \cdot \nabla)V + V(\nabla \cdot W) + (V \cdot \nabla)W \quad (4)$$

- ۲۲- حرکت جسمی تابع زمان t طبق نگاشت $\vec{x} = (X_1 + t^2 X_2) \vec{e}_1 + (X_2 + t^2 X_1) \vec{e}_2 + X_3 \vec{e}_3$ است که مختصات (X_1, X_2, X_3) در حالت اولیه جسم است. اگر در لحظه $t=2$ موقعیت ذره (۶, ۶, ۱) باشد، موقعیت اولیه جسم کدام است؟

$$(1, 5, 1) \quad (1)$$

$$(2, 2, 1) \quad (2)$$

$$(5, 1, 1) \quad (3)$$

$$(1, 2, 1) \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۸

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۴۲)

- ۲۳ - موقعیت ذره در زمان t که ابتدا در (X_1, X_2, X_3) قرار داشت به صورت زیر است:
 $x_1 = X_1 + k(X_1 + X_2)t$ $x_2 = X_2 + k(X_1 + X_2)t$ $x_3 = X_3$
 مؤلفه‌های سرعت ذره (V_1, V_2, V_3) در زمان $t = 2$ را که در همین زمان در موقعیت $(1, 1, 0)$ قرار دارد، کدام است؟

$$V_1 = V_2 = \frac{4k}{1+2k}, V_3 = 0 \quad (1)$$

$$V_1 = V_2 = \frac{2k}{1+4k}, V_3 = 0 \quad (2)$$

$$V_1 = V_2 = \frac{k}{2+2k}, V_3 = 0 \quad (3)$$

$$V_1 = V_2 = \frac{k}{1+2k}, V_3 = 0 \quad (4)$$

- ۲۴ - اگر حرکت محیط پیوسته‌ای به صورت $x_1 = X_1 + ktX_2, x_2 = (1+kt)X_2, x_3 = X_3$ بوده و میدان دما توسط

$$\text{رابطه } \theta = \alpha(x_1 + x_2) \text{ بیان شود. آنگاه } \frac{D\theta}{Dt} \text{ برابر کدام است؟}$$

$$\frac{\alpha k x_2}{1+2kt} \quad (2)$$

$$\frac{2\alpha k x_2}{1+2kt} \quad (4)$$

$$\frac{\alpha k x_2}{2+kt} \quad (1)$$

$$\frac{2\alpha k x_2}{1+kt} \quad (3)$$

- ۲۵ - میدان جابه‌جایی در جسمی به صورت زیر است. کرنش‌های e_{zx}, e_{yz}, e_{xy} برابر با کدام مقدار است و آیا معادلات سازگاری برقرار است؟

$$u = v = 0, w = \frac{b}{4\pi} \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$e_{xy} = 0, e_{zx} = -\frac{b}{4\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, e_{yz} = \frac{b}{4\pi} \frac{x}{x^2 + y^2} \quad (1)$$

$$e_{xy} = 0, e_{zx} = -\frac{b}{4\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, e_{yz} = \frac{b}{4\pi} \frac{x}{x^2 + y^2} \quad (2)$$

$$e_{xy} = 0, e_{zx} = -\frac{b}{4\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, e_{yz} = \frac{b}{4\pi} \frac{y}{x^2 + y^2} \quad (3)$$

$$e_{xy} = 0, e_{zx} = -\frac{b}{4\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}, e_{yz} = \frac{b}{4\pi} \frac{y}{x^2 + y^2} \quad (4)$$

- ۲۶ - میزان کشش در المان با راستای $e_1 + e_2$ در تغییر شکل، $x_1 = X_1 + 2X_2, x_2 = X_2, x_3 = X_3$ کدام است؟

$$\sqrt{5} \quad (2) \qquad \qquad \qquad \frac{\sqrt{5}}{2} \quad (1)$$

$$2\sqrt{5} \quad (4) \qquad \qquad \qquad \sqrt{10} \quad (3)$$

- ۲۷ - میدان سرعت اوبلری در یک محیط پیوسته به صورت زیر داده شده است:

$$V_1 = X_1 - X_2, V_2 = X_1 + X_2, V_3 = 2X_3$$

برای سطح واحد انتخاب شده از وضع جاری، بیشترین نرخ تغییر اندازه مساحت کدام است؟

$$2 \quad (2) \qquad \qquad \qquad 1 \quad (1)$$

$$4 \quad (4) \qquad \qquad \qquad 3 \quad (3)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

307F

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲)

- ۲۸- اگر صفحهٔ تختی تحت تغییر شکل $x_i = C_i + A_{iR} X_R$ بردار یکه قائم بر سطح باشد

(۱) به متوازی‌الاضلاع تبدیل می‌شود.

(۲) به پانل استوانه‌ای تبدیل می‌شود.

(۳) به صفحهٔ تخت با بردار قائم $n \cdot A^{-1}$ تبدیل می‌شود.

- ۲۹- در میدان سرعت $v_1 = k(x_2 - y)^2, v_2 = -x_1 x_3, v_3 = kx_1 x_3$ ، مقدار k در سیال غیرقابل‌تراکم چقدر است؟

۱ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

۲ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

- ۳۰- در یک نقطه مؤلفه‌های تنسور تنش در دو سیستم مختصات کارتزینی متعامد به صورت دو ماتریس زیر هستند
مقادیر α و β کدام گزینه می‌توانند باشند؟

$$\begin{bmatrix} 5 & a & -a \\ a & 0 & b \\ -a & b & 0 \end{bmatrix} \text{ و } \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c \\ 0 & 2 & 0 \\ c & 0 & \beta \end{bmatrix}$$

-۴, -۷ (۲)

-۴, ۷ (۱)

۴, ۷ (۴)

۴, -۷ (۳)

- ۳۱- تابع تنش چندجمله‌ای درجه پنج $\phi = C_1 x^5 + C_2 x^3 y^2 + C_3 x^2 y^3 + C_4 y^5$ در صورتی قابل قبول است
که و یک میدان تنش را نتیجه می‌دهد.

(۱) $C_2 = -5C_1$ و $C_3 = -5C_4$ - درجه ۲

(۱) $C_2 = -5C_1$ - درجه ۳

(۴) $C_2 = 5C_1$ و $C_3 = 5C_4$ - درجه ۲

(۳) $C_2 = 5C_1$ - درجه ۳

- ۳۲- در یک جسم الاستیک تراکم‌ناپذیر که در معرض وضعیت تنش‌صفحه‌ای در صفحه xy قرار دارد، کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

(۲) کوچکترین تنش اصلی صفر است.

(۱) تنش‌برشی درون صفحه صفر است.

(۴) حداقل کرش‌برشی درون صفحه صفر است.

(۳) تنش‌های قائم درون صفحه قرینه یکدیگرند.

- ۳۳- در یک جسم الاستیک با نسبت پواسون منفی، کدام عبارت درست است؟


(۱) مدول برشی ماده همواره بزرگتر از مدول یانگ است.

(۲) مدول حجمی ماده همواره کوچکتر از مدول یانگ است.

(۳) مدول برشی ماده همواره کوچکتر از مدول یانگ است.

(۴) مدول حجمی ماده همواره بزرگتر از مدول یانگ است.

- ۳۴- المانی از صفحه مطابق زیر تحت میدان تنش است. تنش قائم روی لبه AC چقدر است؟



(۱) $-\tau_0$

(۲) $-\frac{\sqrt{3}}{2}\tau_0$

(۳) $-\frac{\sqrt{3}}{3}\tau_0$

(۴) $-\frac{1}{2}\tau_0$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰

307F

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲)

- ۳۵ - المانی تحت تنش تک محوری σ_x قرار دارد. کرنش حجمی در تغییر شکل‌های کوچک برابر است؟


$$\frac{1-v}{E} \sigma_x \quad (2)$$

$$\frac{1-v}{2E} \sigma_x \quad (1)$$

$$\frac{1-3v}{2E} \sigma_x \quad (4)$$

$$\frac{1-2v}{E} \sigma_x \quad (3)$$

- ۳۶ - انرژی کرنشی U در میله منشوری شکل زیر معادل کدام گزینه است؟



مقطع میله = A

مدول الاستیک = E

دانسیته = γ

$$\frac{\gamma AL^3}{6E} + \frac{\gamma PL^3}{2E} + \frac{P_0^3 L}{2AE} \quad (1)$$

$$\frac{\gamma AL^3}{6E} + \frac{\gamma PL^3}{E} + \frac{P_0^3 L}{AE} \quad (2)$$

$$\frac{\gamma AL^3}{6E} + \frac{\gamma PL^3}{2E} + \frac{P_0^3 L}{2AE} \quad (3)$$

$$\frac{\gamma AL^3}{6E} + \frac{\gamma PL^3}{E} + \frac{P_0^3 L}{AE} \quad (4)$$

- ۳۷ - در المان تحت تأثیر فقط تنش‌های انحرافی (deviatoric)

(۱) حجم المان تغییر می‌کند.
(۲) حجم المان ثابت می‌ماند.

(۳) هم حجم و هم شکل آن تغییر می‌کند.
(۴) شکل المان ثابت می‌ماند.

- ۳۸ - در چه صورت نتایج تنش صفحه‌ای با نتایج کرنش صفحه‌ای برابر است؟

$$v = \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$v = 0 \quad (1)$$

(۴) بستگی به جنس سازه دارد.

$$-1 < v < \frac{1}{2} \quad (3)$$

- ۳۹ - نمونه‌ای تحت شرایط تنش صفحه‌ای و کشش دو محوری به صورت $\sigma_x = 2\sigma_y$ قرار دارد. شبیه منحنی تنش - کرنش کدام است؟

$$\frac{E}{1-2v} \quad (2)$$

$$\frac{2E}{1-2v} \quad (1)$$

$$\frac{2E}{2-v} \quad (4)$$

$$\frac{E}{2-v} \quad (3)$$

- ۴۰ - شرط این‌که $\sigma_x = Ax_y, \sigma_y = 0, \tau_{xy} = B + Cy^2$ میدان تنش در محیط الاستیک باشد، کدام است؟

$$C = -2A \quad (2)$$

$$C = A \quad (1)$$

$$C = -\frac{A}{2} \quad (4)$$

$$C = A = 0 \quad (3)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۱

307F

آزمون (نیمه‌تمام) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲)

- ۴۱- انرژی تغییر شکل و انرژی تغییر حجم در میله تحت بارگذاری محوری $\sigma_x = \sigma$ به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
(با فرض $v = 0.25$)

$$\frac{\sigma}{6E}, \frac{5\sigma}{6E} \quad (2)$$

$$\frac{5\sigma}{6E}, \frac{\sigma}{6E} \quad (4)$$

$$\frac{\sigma}{12E}, \frac{5\sigma}{12E} \quad (1)$$

$$\frac{5\sigma}{12E}, \frac{\sigma}{12E} \quad (3)$$

- ۴۲- تانسور تنش در یک نقطه P به صورت زیر است. زاویه بین بردار تراکشن، t_1^P ، و راستای صفحه شامل نقطه P

$$n = \frac{2}{3}e_1 - \frac{2}{3}e_2 + \frac{1}{3}e_3$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$22/5 \quad (2)$$

$$35 \quad (4)$$

$$20 \quad (1)$$

$$30 \quad (3)$$

- ۴۳- در جسم جامد الاستیک خطی غیرقابل تراکم رابطه بین مدول یانگ و مدول برشی کدام است?
(مدول یانگ = E و مدول برشی = G)


$$G = \frac{1}{2}E \quad (1)$$

$$G = \frac{1}{3}E \quad (2)$$

$$G = \frac{2}{3}E \quad (3)$$

$$G = \frac{1}{4}E \quad (4)$$

- ۴۴- یک محیط نیمه‌بینهایت تحت فشار یکنواخت قرار گرفته است. تنش قائم در نقطه A که به فاصله معینی از سطح آزاد قرار گرفته برابر σ است. کرش حجمی برای المان در این نقطه چقدر است؟
(محیط را همگن با دو ثابت E و v فرض کنید).



$$\frac{-(1-v)(1-2v)\sigma_0}{(1+v)E} \quad (1)$$

$$\frac{(1+v)(1-2v)\sigma_0}{(1-v)E} \quad (2)$$

$$\frac{v\sigma_0}{(1-2v)E} \quad (3)$$


$$\frac{(1-2v)\sigma_0}{(1+v)(1-v)E} \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

آزمون (نیمه‌تمثیرکز) ورود به دوره‌های دکتری – کد (۲۳۲۲) ۳۰۷F

- ۴۵ - ورق مستطیلی یکنواخت ABCD در معرض بارگذاری دو محوره نشان داده شده است. در اثر این بارگذاری، طول قطر AC تغییر نمی‌کند. نسبت پواسون ماده ورق کدام است؟



(۱) صفر

-۱ (۲)

$-\frac{1}{4}$ (۳)

$-\frac{1}{2}$ (۴)