



472F

کد کنترل

472

F

آزمون (نیمه‌تمركز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

آمار (کد ۲۲۳۲)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – مبانی آنالیز ریاضی – ریاضی عمومی ۲ و احتمال ۱ و – استنباط آماری ۱	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

(۴۷۲F)

آمار (کد ۲۲۳۲)

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی: مبانی آنالیز ریاضی - ریاضی عمومی ۱ و ۲ - احتمال ۱ و ۲ - استنباط آماری ۱

-۱ هرگاه x عدد حقیقی بر بازه $[1, 5]$ باشد، کدام مورد برای عبارت $\lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{rn}(m! \pi x)$ درست است؟

(۱) برای هر x موجود و برابر صفر است.

(۲) در تمام نقاط گویا ۱ و در نقاط گنگ صفر است.

(۳) در تمام نقاط گویا ۱ و در نقاط گنگ حد موجود نیست.

(۴) در نقاط گنگ صفر و در نقاط گویا حد موجود نیست.

-۲ فرض کنید تابع $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ در $x = 1$ پیوسته و در شرط $f(x+y) = f(x) + f(y)$ به ازای هر $x, y > 0$ صادق باشد. (۱) f' برای هر $x > 0$ کدام است؟

(۱) $x + f'(x)$

(۲) $\frac{f'(x)}{x}$

(۳) $x f'(x)$

(۴) $x \in \mathbb{N}$ به ازای هر $f'(x)$

-۳ اگر f پیوسته و $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = M$ و $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = L$ کدام مورد درست است؟

(۱) M و L مشتق تابع f را تضمین نمی کنند.

(۲) M و L مشتق تابع f را تضمین می کنند.

(۳) $M = f'(x)$ مشتق تابع f را تضمین نمی کند و $L = f'(x)$

(۴) $M = f'(x)$ و $L = f'(x)$ مشتق تابع f را تضمین نمی کند.

-۴ فرض کنید $\psi(x) = \frac{d}{dx} (\ln \Gamma(x))$ و $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt : x > 0$. حاصل عبارت $\Delta\psi(x) = \psi(x+1) - \psi(x)$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{x}$

(۲) $\frac{1}{x-1}$

(۳) $\frac{1}{x+1}$

(۴) $\frac{1}{x^2}$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۳

(۴۷۲F)

آمار (کد ۲۲۳۲)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\sinh\left(\frac{1}{n}\right)}$$

مقدار -۵

(۱) صفر

ln(۲) (۲)

۱ (۳)

+∞ (۴)

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

کدام مورد برای درست است؟ -۶

(۱) تابع f در $(0, 0)$ دیفرانسیل پذیر است.

$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ و $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ (۲)

$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ موجود است ولی $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ (۳)

$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ موجود است ولی $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ (۴)

فرض کنید t فرض کنید t مورد درست است؟ -۷

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (۱)$$

$$-\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (۲)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (۳)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (۴)$$

$$\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x^3} dx$$

مقدار -۸

$\frac{\pi}{2}$ (۱)

$\frac{\pi}{3}$ (۲)

$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (۳)

$\frac{\sqrt{\pi}}{3}$ (۴)

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۴

(۴۷۲F)

آمار (کد ۲۲۳۲)

-۹- مقدار متوسط تابع $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ بر طوق $a \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq b$, کدام است؟

$$\frac{e^{-a^2} - e^{-b^2}}{\pi(b^2 - a^2)} \quad (1)$$

$$\frac{e^{-a^2} - e^{-b^2}}{b^2 - a^2} \quad (2)$$

$$\frac{e^{-(b^2+a^2)}}{b^2 - a^2} \quad (3)$$

$$\frac{e^{-(b^2+a^2)}}{\pi(b^2 - a^2)} \quad (4)$$

-۱۰- با توجه به اتحاد $(1) < x^n = \frac{1}{1-x}$; ($|x| < 1$) عدد است؟

۲) (۱)

۳) (۲)

$\frac{7}{2}$ (۳)

۴) (۴)

-۱۱- جعبه‌ای شامل ۴ مهره قرمز و ۴ مهره سفید است. از این جعبه ۵ مهره به تصادف و با جایگذاری انتخاب می‌شود. احتمال اینکه حداقل یک مهره قرمز و حداقل یک مهره سفید انتخاب شده باشد، کدام است؟

$\frac{31}{32}$ (۴)

$\frac{1}{32}$ (۳)

$\frac{15}{16}$ (۲)

$\frac{1}{16}$ (۱)

-۱۲- از بین ۱۰۰۰ کارت شماره‌گذاری شده از ۱ تا ۱۰۰۰ یک کارت به تصادف انتخاب می‌شود. احتمال اینکه بر ۸ بخش پذیر نباشد، چقدر است؟

۰/۹۹۲ (۴)

۰/۸۷۵ (۳)

۰/۱۲۵ (۲)

۰/۰۰۸ (۱)

-۱۳- فرض کنید $\{A_n, n \geq 1\}$ دنباله‌ای از پیشامدهای مستقل تصادفی باشد، به‌طوری‌که

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n \cup A_{n+1}) = 1 \quad \text{و} \quad P(A_1) = \frac{1}{4} \quad \text{و} \quad P(A_{n+1}) = \frac{1}{2} P(A_n), \quad (n \geq 1)$$

$\frac{7}{12}$ (۴)

$\frac{17}{24}$ (۳)

$\frac{15}{24}$ (۲)

$\frac{11}{24}$ (۱)

-۱۴- روی دایره‌ای به مرکز $(0, 0)$ و شعاع ۱، دایره‌ای به مرکز $(0, 0)$ و شعاع X . رسم می‌کنیم که در آن $(1, 0) \sim U$. در این صورت دایره به شعاع ۱ به دو قسمت تقسیم می‌شود. اگر Y مساحت قسمت بزرگ‌تر باشد، مقدار

$$P(Y \leq \frac{2\pi}{3}), \quad \text{کدام است؟}$$

$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{3}$ (۴)

$\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۳)

$\frac{\sqrt{2} - 1}{3}$ (۲)

$\frac{\sqrt{6}}{3}$ (۱)

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

(۴۷۲F)

آمار (کد ۲۲۳۲)

- ۱۵- فرض کنید X یک متغیر تصادفی با تابع مولد احتمال زیر باشد، مقدار $P(X=2)$ کدام است؟

$$\phi(z) = \frac{1}{e}(1+z+z^2)(1+z)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \quad (4)$$

$$\frac{1}{6} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

- ۱۶- فرض کنید X یک متغیر تصادفی نامنفی و $P(-\ln(X) + 2\ln(2) > 5) \geq 1$ باشد. مقدار $E(X^n) = \frac{2^n}{n+1}$ کدام است؟

$$1 - e^{-5} \quad (2)$$

$$1 - 2e^{-5} \quad (4)$$

$$2e^{-5} \quad (1)$$

$$e^{-5} \quad (3)$$

- ۱۷- اگر X_1 و X_2 یک نمونه تصادفی دوتایی از توزیع $U(0, 1)$ باشد و $E(Y)$ مقدار $E(Y) = \begin{cases} X_2 & X_1 < X_2 \\ 2X_1 & X_1 > X_2 \end{cases}$ کدام است؟

$$\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\frac{5}{2} \quad (4)$$

$$1 \quad (1)$$

$$2 \quad (3)$$

- ۱۸- فرض کنید X یک متغیر تصادفی از توزیع $N(0, 1)$ باشد. همچنین فرض کنید متغیر تصادفی Z مستقل از X با تابع احتمال $P(Z=0) = P(Z=1) = \frac{1}{2}$ باشد. اگر متغیر تصادفی Y به صورت زیر تعریف شود، کدام مورد درست است؟

$$Y = \begin{cases} X & Z=1 \\ -X & Z=0 \end{cases}$$

$$\text{Corr}(Z, Y) = 1 \quad (2)$$

$$(4) \text{ توزیع } Y \text{ نرمال با میانگین } 0 \text{ و واریانس } 1$$

$$\text{Var}(Y+Z) = 2 \quad (1)$$

$$\text{Corr}(X, Y) = 1 \quad (3)$$

- ۱۹- اگر X, Y, Z متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت روی بازه $(0, 2)$ باشند، مقدار $P(X \geq YZ)$ کدام است؟

$$\frac{1}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3}{8} \quad (4)$$

$$\frac{1}{8} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

- ۲۰- فرض کنید (X, Y) دارای توزیع یکنواخت روی ناحیه زیر باشد. مقدار $E(X|Y=0/2)$ کدام است؟

$$\mathbb{R} = \{(x, y) : x > 0, |y| < 1\}$$

$$0/2 \quad (2)$$

$$0/4 \quad (4)$$

$$0/ \text{صفر} \quad (1)$$

$$0/4 \quad (3)$$

- ۲۱- با فرض $1 = E(Y|X)$ ، کدام مورد درست است؟

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X) \quad (2)$$

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X)\text{Var}(Y) \quad (4)$$

$$\text{Var}(XY) > \text{Var}(X) \quad (1)$$

$$\text{Var}(XY) \leq \text{Var}(X) \quad (3)$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۲- فرض کنید X_1, X_2, X_3 یک نمونه تصادفی از توزیعی با تابع احتمال زیر باشد. تابع مولد گشتاور $W = X_1^3 X_2^3 X_3^3$ کدام است؟

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & x=0 \\ \frac{2}{3} & x=1 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases}$$

$$\frac{1}{27} + \frac{8}{27} e^{-3t} \quad (2)$$

$$\frac{19}{27} + \frac{8}{27} e^{-t} \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-3t} \quad (1)$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-t}\right)^3 \quad (3)$$

- ۲۳- فرض کنید $(X_i \sim N(10, 1 - e^{-2}))$ و $Z = \sum_{i=1}^N X_i$ با تابع احتمال زیر

$$P\left(\sum_{i=1}^N X_i = 0\right) \quad \text{باشد. مقدار } P \text{ کدام است؟}$$

$$P(X_1 = 1) = p, \quad P(X_1 = 0) = q \quad (p + q = 1)$$

$$(e^{-2} - qe^{-2})^{10} \quad (2)$$

$$(e^{-2} - pe^{-2})^{10} \quad (4)$$

$$(q + pe^{-2})^{10} \quad (1)$$

$$(p + e^{-2}q)^{10} \quad (3)$$

- ۲۴- فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال استاندارد باشد. با فرض $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i^2$ ، توزیع حدی

$$Z_n = \sqrt{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{n} Y_n - 1 \right)$$

۲) نرمال استاندارد

۱) نمایی با میانگین ۱

۴) تباہیده در نقطه صفر

۳) کایدو با ۱ درجه آزادی

- ۲۵- فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_n دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی مستقل و با توزیع یکسان نمایی با میانگین $\frac{1}{n}$ باشند و

برای هر $n \in \mathbb{N}$ تعریف کنید $P(Y_n \leq E(Y_n))$. مقدار $Y_n = \min\{k \geq 1 : X_k > n\}$ کدام است؟

$$1 - e^{-1} \quad (4)$$

$$e^{-2} \quad (3)$$

$$1 - e^{-2} \quad (2)$$

$$e^{-1} \quad (1)$$

- ۲۶- فرض کنید Y_1, Y_2, \dots, Y_n یک نمونه تصادفی از توزیع یکنواخت در بازه $(\theta, \theta + 5)$ باشد. اگر مشاهدات ما به صورت زیر باشد،

$$X_i = \begin{cases} Y_i & Y_i \geq 1 \\ 1 & Y_i < 1 \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

برآوردگر گشتاوری (MME) پارامتر θ بر حسب X_i ها، کدام است؟

$$\bar{X} + \sqrt{\bar{X}^2 - 1} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(\bar{X} + \sqrt{\bar{X}^2 - 1}) \quad (1)$$

$$\bar{X} - \sqrt{\bar{X}^2 - 1} \quad (4)$$

$$\frac{1}{2}(\bar{X} - \sqrt{\bar{X}^2 - 1}) \quad (3)$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۷- فرض کنید X یک مشاهده از توزیعی با یکی ازتابع چگالی احتمال‌های زیر باشد.

$$f(x|\theta=2) = \begin{cases} \frac{1}{4}|x|, & |x| < 2 \\ 0, & \text{سایر جاهای} \end{cases} \quad \text{و} \quad f(x|\theta=5) = \begin{cases} \frac{3}{16}x^2, & |x| < 2 \\ 0, & \text{سایر جاهای} \end{cases}$$

برآورده مکزیم درست‌نمایی (MLE)، کدام است؟

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 2 & |X| < \frac{3}{4} \\ 5 & |X| > \frac{3}{4} \end{cases} \quad (۲)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 2 & |X| < \frac{4}{3} \\ 5 & |X| > \frac{4}{3} \end{cases} \quad (۱)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 2 & |X| > \frac{3}{4} \\ 5 & |X| < \frac{3}{4} \end{cases} \quad (۴)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 2 & |X| > \frac{4}{3} \\ 5 & |X| < \frac{4}{3} \end{cases} \quad (۳)$$

- ۲۸- فرض کنید X یک مشاهده از توزیعی با تابع چگالی احتمال زیر باشد.

$$f_{\theta}(x) = \theta e^{-x} + 2(1-\theta) e^{-2x}, \quad x > 0, \quad 0 < \theta < 1$$

برآورد θ به روش مکزیم درست‌نمایی (MLE)، کدام است؟

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1 & x \geq 2 \\ 0 & x < 2 \end{cases} \quad (۲)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1 & x \leq 2 \\ 0 & x > 2 \end{cases} \quad (۱)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1 & x \geq \ln 2 \\ 0 & x < \ln 2 \end{cases} \quad (۴)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1 & x \leq \ln 2 \\ 0 & x > \ln 2 \end{cases} \quad (۳)$$

- ۲۹- فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع $(1, \mu, \sigma^2)$ باشد. اگر $Y_i = \begin{cases} 1 & X_i < 0 \\ 0 & X_i \geq 0 \end{cases}$ باشد، برآورده مکزیم درست‌نمایی $\hat{\mu}$ بر پایه \bar{Y} ، کدام است؟

$$-\Phi^{-1}(2\bar{Y}) \quad (۲)$$

$$-\Phi^{-1}(\bar{Y}) \quad (۱)$$

$$\Phi^{-1}(\bar{Y}) \quad (۴)$$

$$\Phi^{-1}(2\bar{Y}) \quad (۳)$$

- ۳۰- فرض کنید X_1, \dots, X_n متغیرهای تصادفی مستقل با تابع چگالی احتمالی زیر باشند.

$$f_{X_i}(x|\theta) = \begin{cases} e^{x+i\theta} & x+i\theta < 0 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases}$$

کدام مورد، برای θ آماره بسنده نیست؟

$$\min\left(-\frac{X_i}{i}\right) \quad (۲)$$

$$\max\left(\frac{X_i}{i}\right) \quad (۱)$$

$$\left(\frac{X_1}{1}, \frac{X_2}{2}, \dots, \frac{X_n}{n}\right) \quad (۴)$$

$$\max\left(-\frac{X_i}{i}\right) \quad (۳)$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۱ - فرض کنید $\{P_i : \theta \in \Theta_i\}$ که در آن f_θ تابع چگالی احتمال و Θ فضای پارامتر است. اگر T یک آماره و $\Theta_1 \subset \Theta_2$ باشند، کدام مورد درست است؟

(۱) اگر T در P_1 بستنده باشد آنگاه در P_2 نیز بستنده است.

(۲) اگر T در P_2 بستنده کامل باشد آنگاه در P_1 نیز بستنده کامل است.

(۳) اگر خانواده چگالی احتمال در P_1 کامل کراندار باشد، آنگاه کامل است.

(۴) اگر T در P_1 بستنده مینیمال و در P_2 نیز بستنده باشد آنگاه در P_2 نیز بستنده مینیمال است.

- ۳۲ - فرض کنید X دارای توزیعی با تابع احتمال زیر باشد. کدام مورد، درست است؟

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \binom{n}{|x|} \theta^{|x|} (1-\theta)^{n-|x|} & x = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n \\ (1-\theta)^n & x = 0 \end{cases} \quad 0 < \theta < 1$$

(۱) خانواده توزیع‌های $\{f_\theta(x) : \theta \in (0, 1)\}$ کامل است.

(۲) خانواده توزیع‌های $\{f_\theta(x) : \theta \in (0, 1)\}$ کامل نیست.

(۳) خانواده توزیع‌های $\{f_\theta(x) : \theta \in (0, 1)\}$ بستنده کامل است.

(۴) خانواده توزیع‌های $\{f_\theta(x) : \theta \in (0, 1)\}$ بستنده مینیمال است.

- ۳۳ - فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از تابع چگالی احتمال زیر باشد.

$$f_\theta(x) = \theta \left(\frac{1}{x+1} \right)^{\theta+1} \quad x > 0, \theta > 0$$

برآورده ناگریب با کمترین واریانس (UMVUE) پارامتر θ ، کدام است؟

$$\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i + 1} \quad (۲) \qquad \qquad \qquad \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i + 1)} \quad (۱)$$

$$- \ln \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i + 1} \right) \quad (۴) \qquad \qquad \qquad \frac{n-1}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i + 1)} \quad (۳)$$

- ۳۴ - فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع پواسن با پارامتر λ باشد، $UMVUE$ پارامتر λ ، کدام است؟ ($a > 0$ معلوم است).

$$\left(\frac{a}{a+n} \right)^{\sum X_i} \quad (۲) \qquad \qquad \qquad \left(\frac{a+n}{n} \right)^{\sum X_i} \quad (۱)$$

$$\left(\frac{a+n}{a} \right)^{\sum X_i} \quad (۴) \qquad \qquad \qquad \left(\frac{n}{a+n} \right)^{\sum X_i} \quad (۳)$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

(۴۷۲F)

آمار (کد ۲۲۳۲)

- ۳۵ فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیعی باتابع چگالی احتمال زیر باشد.

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta x^{\theta-1}}{(x+1)^{\theta+1}} \quad x > 0, \theta > 0$$

برآوردگر نااریب با کمترین واریانس یکنواخت (UMVUE) برای $\frac{1}{\theta}$ ، کدام است؟

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1+X_i) \quad (2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{X_i}{1+X_i}\right) \quad (1)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n -\ln\left(\frac{X_i}{1+X_i}\right) \quad (4)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1+X_i} \quad (3)$$

- ۳۶ فرض کنید Y_1, Y_2, \dots, Y_n نمونه تصادفی از توزیعی باتابع چگالی احتمال زیر باشد.

$$f(y) = \frac{\theta}{y} e^{-\frac{\theta}{y}}, \quad y > 0, \theta > 0$$

پارامتر θ ، کدام است؟ UMVUE

$$\sum_{i=1}^{n-1} Y_i \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} Y_i^{-1} \quad (1)$$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} Y_i^{-1} \quad (4)$$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} Y_i \quad (3)$$

- ۳۷ فرض کنید T برآوردگر نااریب با کمترین واریانس (UMVUE) برای θ باشد. اگر U یک «برآوردگر نااریب صفر»

و k یک عدد صحیح مثبت باشد، مقدار $\rho_{T^k, U}$ (ضریب همبستگی خطی U, T^k)، کدام است؟

(۲) همیشه مثبت است.

○

(۴) بستگی به مقدار k دارد.

(۳) همیشه منفی است.

- ۳۸ فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع نمایی با میانگین $\frac{1}{\theta}$ و θ دارای توزیع گاما با پارامتر شکل α

و پارامتر مقیاس β باشد. برآوردگر بیز پارامتر θ تحت تابع زیان $L(\theta, \delta) = e^{\theta-\delta} - (\theta-\delta) - 1$ ، کدام است؟

$$\frac{\alpha + \sum_{i=1}^n X_i}{n + \frac{1}{\beta}} \quad (2)$$

$$\frac{\alpha}{\bar{X} + \beta} \quad (1)$$

$$-(n+\alpha) \ln\left(1 - \frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{\beta}}\right) \quad (4)$$

$$\frac{\bar{X} + \beta}{\alpha} \quad (3)$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰

(۴۷۲F)

آمار (کد ۲۲۳۲)

- ۳۹- فرض کنید $X \sim N(\theta, 1)$ و θ دارای توزیع یکنواخت روی مجموعه $\{1, -1\}$ باشد. برآوردگر بیز θ تحت تابع زیان درجه ۲ (SEL) کدام است؟

$$\frac{e^X - e^{-X}}{e^X + e^{-X}} \quad (2)$$

$$\frac{e^X}{e^X + e^{-X}} \quad (4)$$

$$\frac{e^{-X} - e^X}{e^{-X} + e^X} \quad (1)$$

$$\frac{e^{-X}}{e^X + e^{-X}} \quad (3)$$

- ۴۰- فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع گاما با پارامتر شکل α و پارامتر مقیاس β باشد. برآوردگر بیز پارامتر θ تحت تابع زیان $L(\theta, \delta) = \theta(\theta - \delta)^2$ کدام است؟

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i + \frac{2}{\beta}}{n + 2\alpha - 2} \quad (2)$$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{2}{\beta}\right)^2}{(n + 2\alpha - 4)(n + 2\alpha - 2)} \quad (1)$$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{2}{\beta}\right)^2}{(n + 2\alpha - 4)(n + 2\alpha - 6)} \quad (3)$$

- ۴۱- فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع پواسون با پارامتر θ و θ دارای توزیع گاما با پارامتر شکل α و پارامتر مقیاس β باشد. برآوردگر بیز پارامتر θ تحت تابع زیان $L(\theta, \delta) = e^{-\theta}(\theta - \delta)^2$ کدام است؟

$$\frac{\alpha + \sum_{i=1}^n X_i}{n + \frac{1}{\beta}} \quad (2)$$

$$\frac{\alpha + \sum_{i=1}^n X_i}{n + \beta} \quad (4)$$

$$e^{-\bar{X}} \quad (1)$$

$$\frac{\beta(\alpha + \sum_{i=1}^n X_i)}{(n+1)\beta + 1} \quad (3)$$

- ۴۲- فرض کنید X دارای توزیع لجستیک با پارامتر مکان θ با تابع توزیع زیر باشد.

$$F_\theta(x) = \frac{1}{1 + e^{-(x-\theta)}}, -\infty < x < \infty, \theta \in \mathbb{R}$$

- اگر θ دارای توزیع پیشین ناسره $\pi(\theta) = 1$ باشد، برآوردگر بیز تعمیم یافته θ تحت تابع زیان قدر مطلق خطای کدام است؟

$$2X \quad (2)$$

$$X \quad (4)$$

$$\frac{1}{2}X \quad (1)$$

$$|X| \quad (3)$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۳ - فرض کنید X یک تک مشاهده از توزیع برنولی با پارامتر p باشد که در آن $\left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right\} \in p$. چهار برآورد $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$ را به صورت زیر در نظر بگیرید.

$$\delta_1(0) = a_1, \delta_1(1) = a_2, \quad \delta_2(0) = \delta_2(1) = a_1$$

$$\delta_3(0) = \delta_3(1) = a_2, \quad \delta_4(0) = a_2, \delta_4(1) = a_1$$

تحت جدول تابع زیان زیر، کدام برآورد(ها) مینماکس است؟

a	a_1	a_2
$\frac{1}{2}$	۳	۲
$\frac{3}{4}$	۱	۴

(۱) δ_1, δ_4

(۲) δ_2

(۳) δ_3

(۴) δ_3, δ_4

- ۴۴ - فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع $N(\theta, \theta)$ باشد. کدام مورد نادرست است؟

(۱) برای θ سازگار است.

(۲) UMVUE برای θ است.

(۳) تحت تابع درجه دوم، $\overline{X^2}$ برآوردگر پذیرفتی (مجاز، رو) برای θ است.

(۴) تحت تابع زیان درجه دوم، در ردۀ برآوردگرهای $a\overline{X^2}$ ، برآوردگر θ ، دارای کمترین تابع مخاطره است.

- ۴۵ - فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه تصادفی از توزیع $N(\theta, \theta)$ باشد. تحت تابع زیان درجه ۲ (SEL)، در کلاس

برآوردگرهای به فرم $D = \left\{ c\overline{X^2} : c > 0, \overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum X_i^2 \right\}$ برآوردگرها به فرم

$\frac{n}{n+2} \overline{X^2}$ (۱)

$\frac{1}{n+2} \overline{X^2}$ (۲)

$\frac{n}{n+1} \overline{X^2}$ (۳)

