

کد کنترل

392

F

392F



دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)»

علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل  
(کد ۲۴۴۳)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سوال: ۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی - آمار و اندازه‌گیری جنگل و جنگلداری - جنگل کاری و نهالستان‌های جنگلی - جامعه‌شناسی گیاهی - زنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی - حاصلخیزی خاک‌های جنگلی	۷۰	۱	۷۰

این آزمون نمرة منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود

# پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل (کد ۲۴۴۳) ( ۳۹۲F )

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

**مجموعه دروس تخصصی (اکولوژی جنگل و جنگل شناسی - آمار و اندازه گیری جنگل و جنگلداری - جنگل کاری و نهالستان های جنگلی - جامعه شناسی گیاهی - ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی - حاصلخیزی خاک های جنگلی):**

- ۱ سرعت تجزیه لاشبرگ درختان، در کدام گروه بیشتر است؟
- (۱) راش - پلت - داغdagان  
(۲) بلندمازو - توسکا بیلاقی - پلت  
(۳) راش - ممرز - انگلی  
(۴) توسکا بیلاقی - ممرز - ون
- ۲ کدام عامل، موجب تفکیک گونه های یک جنس (درختان جنگلی) از نظر جغرافیایی می شود؟
- (۱) Allopathic (۴) Sympatric (۳) Allelopathy (۲) Amensalism  
کدام گزینه، به عنوان سینوز یا محسوب می شود؟
- (۱) خشکه دار  
(۲) درخت مادری  
(۳) حال گروه  
(۴) میکوریز
- ۴ وجه تشابه اجرای شیوه های پناهی و فمل اشلاک و تک گزینی چیست؟
- (۱) تجدید حیات طبیعی  
(۲) ناهمسالی  
(۳) همسالی  
(۴) تجدید حیات مصنوعی
- ۵ در اکولوژی به چه معنی است؟
- (۱) تناوب نوری  
(۲) گونه های بی تفاوت  
(۳) قلمرو گرایی  
(۴) زندگی تحملی
- ۶ مقاومت و ایستادگی اکوسیستم های جنگلی در برابر هر گونه تغییر و تحول چه نامیده می شود؟
- (۱) Etiolation (۴) Continuum (۳) Feedback (۲) Homeostasis  
کدام عامل، در کاهش استقرار نهال راش تأثیر بیشتری دارد؟
- (۱) ذخیره آب قابل استفاده در خاک  
(۲) دامنه جنوبی  
(۳) خاک کم عمق  
(۴) رقابت گیاهان علفی
- ۷ درختان کدام گروه، مختص جنگل های خزری هستند؟
- (۱) راش - سفید پلت - انگلی  
(۲) بلندمازو - ممرز - راش  
(۳) لیلکی - بلندمازو - ممرز
- ۸ با کدام عملیات پرورشی، می توان جنگل های نیمه مخربه را به جنگل های تولیدی و جنگل های دانه و شاخه زاد را به جنگل دانه زاد با تولید خوب سوق داد؟
- (۱) آزاد کردن و تنک کردن  
(۲) تنک کردن و روشن کردن  
(۳) پاک کردن و تنک کردن
- ۹ تنک کردن از بالا و پایین و تلفیقی، مربوط به کدام روش است؟
- (۱) آلمانی - فرانسوی - سوئیسی  
(۲) فرانسوی - آلمانی - سوئیسی  
(۳) دانمارکی - فرانسوی - سوئیسی

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۳

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل (کد ۲۴۴۳) ( ۳۹۲F )

- ۱۱- سن بذردهی کدام یک از درختان، کمتر می‌باشد؟
- (۱) *Fagus orientalis* (۲) *Abies alba* (۳) *Acer cappadocicum* (۴) *Tilia begonifolia*
- ۱۲- در ناحیه رویشی زاگرس کدام تیپ جنگلی، مساحت بیشتری دارد؟
- (۱) بلوط - خنجرک (۲) بلوط - ارزن (۳) بلوط - زالک (۴) بلوط - کیکم
- ۱۳- مقادیر جدول تاریف کدام است؟
- (۱) حجم یک اصله درخت در طبقات قطری ۱ سانتی‌متری است.  
(۲) حجم یک اصله درخت در طبقات قطری ۵ سانتی‌متری است.  
(۳) حجم توده جنگل در واحد سطح و در طبقات قطری ۵ سانتی‌متری است.  
(۴) حجم توده جنگل در واحد سطح و در طبقات قطری ۱ سانتی‌متری است.
- ۱۴- اگر در اندازه‌گیری ارتفاع درختی با دستگاه بلوم لایس از فاصله ۲۰ متری، اعداد ۲۵ و ۵ در دو طرف صفر در روی زمین با شیب  $14^{\circ}$  درجه ( $\cos 14^{\circ} = 0.9703$ ) باشد، ارتفاع درخت بر حسب متر کدام است؟
- (۱) ۱۸/۸۳ (۲) ۱۹/۴۰ (۳) ۲۷/۴۰ (۴) ۲۹/۱۱
- ۱۵- در جنگل ناهمسالی که درختان آن در دامنه قطری  $14^{\circ}$  -  $15^{\circ}$  سانتی‌متری قرار دارند، به منظور دستیابی به منحنی ارتفاع با دقت مناسب حدوداً نیاز به چند اصله درخت جهت اندازه‌گیری ارتفاع است؟
- (۱)  $8^{\circ}$  (۲)  $10^{\circ}$  (۳)  $25^{\circ}$  (۴)  $40^{\circ}$
- ۱۶- در توده ناهمسالی که دارای ضریب حاصلخیزی  $1/5$  است، اگر در قطر هدف ( $60$  سانتی‌متر)،  $3$  اصله درخت باشد، در طبقه قطری  $40$  (طبقات قطری  $5$  سانتی‌متری) چند اصله درخت در واحد سطح باید موجود باشد؟
- (۱) ۱۵/۱۲ (۲) ۱۵/۱۸ (۳) ۲۲/۷۸ (۴) ۳۴/۱۷
- ۱۷- در جنگلی که حداکثر موجودی  $700$ ، حداقل آن  $100$  و میانگین آن  $400$  سیلو در هکتار است، اگر هدف آن باشد که به گونه‌ای آماربرداری شود که اشتباہ آماربرداری از  $4$  درصد بیشتر نشود، تعداد قطعات نمونه در سطح اطمینان  $99$  درصد کدام است؟ ( $t = 2$ )
- (۱) ۷۹ (۲) ۱۵۷ (۳) ۳۵۲ (۴) ۶۲۵
- ۱۸- قطر درختی با نوار قطرسنج  $31/9$  سانتی‌متر اندازه‌گیری شد، این درخت در قالب طبقات قطری  $2$  سانتی‌متری در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟
- (۱) ۳۰ (۲) ۳۱ (۳) ۳۲ (۴) ۳۴
- ۱۹- برش در جنگل کدام است؟
- (۱) معادل رویش جنگل بوده و در قالب درختان برداشت می‌شود.  
(۲) در توده‌های مسن کمتر از میزان رویش است.  
(۳) در توده‌های جوان بیشتر از میزان رویش است.  
(۴) همیشه به اندازه رویش است.

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۴

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل (کد ۲۴۴۳) ( ۳۹۲F )

- ۲۰ نام دیگر روش حجمی فرانسوی کدام است؟  
۱) تک گزیده ۲) ناحیه زادآوری  
۳) ناحیه آبی ۴) فمل اشلاک
- ۲۱ در طریقه یک دانگی چنانچه  $V$  حجم سرپای دانگ،  $P$  طول پریود و  $t$  نرخ رشد سالیانه باشد، امکان برداشت سالیانه چگونه به دست می‌آید؟
- $$\frac{V}{2P} + 2V \times t \quad (2)$$
- $$\frac{2V}{P} + V \times t \quad (4)$$
- $$\frac{V}{P} + 2V \times t \quad (3)$$
- $$\frac{V}{P} + \frac{1}{2} V \times t \quad (1)$$
- ۲۲ نام کدام فرد در روش دانگ واحد مطرح است؟  
۱) هارتیگ ۲) دوشوفور  
۳) ملار ۴) مایر
- ۲۳ دستیابی به رویش جنگل در روش کنترل سوئیسی (متد قدیمی) در چه سطحی انجام می‌شود؟  
۱) سری ۲) پارسل  
۳) دانگ ۴) قطعات نمونه دائم و ثابت
- ۲۴ قطر درختی در نیمه ارتفاع آن، ۲۲ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۳۳ متر می‌باشد، چنانچه ضریب کاهش قطری  $1/15$  سانتی‌متر باشد، قطر برابر سینه این درخت بر حسب سانتی‌متر کدام است؟  
۱) ۳۹/۵ ۲) ۴۲/۲  
۳) ۵۴/۶ ۴) ۵۸/۵
- ۲۵ در عملیات جنگل کاری، در مناطقی که سرمای دیر رس وجود دارد، کدام یک از جنس‌ها را می‌توان ترجیحاً کاشت نمود؟  
۱) *Abies* ۲) *Fraxinus* ۳) *Fagus* ۴) *Betula*
- ۲۶ برای جنگل کاری در یک منطقه با رطوبت بالا، کدام یک از گونه‌ها ترجیحاً پیشنهاد می‌شود؟  
۱) *Tilia begonifolia* ۲) *Ulmus carpinifolia* ۳) *Fagus orientalis* ۴) *Ulmus glabra*
- ۲۷ در عملیات جنگل کاری، نهال کدام گونه ترجیحاً بهتر است در بهار کاشته شود؟  
۱) بارانک ۲) زیتون ۳) بید ۴) صنوبر
- ۲۸ برای جنگل کاری به منظور اصلاح خاک کدام یک از گونه‌های گیاهی انتخاب می‌شود?  
۱) توسکای نانا، بلوط، نمدار، نارون، لوپن آبی، انواع ماشک  
۲) توسکای سفید، بلوط، نمدار، لیلکی، نارون، لوپیا، انواع ماشک  
۳) توسکای ییلاقی، سنجد تلخ، افاقیا، لوپن زرد، انواع ماشک  
۴) توسکای قشلاقی، بلوط، نمدار، نارون، آقطی، انواع ماشک
- ۲۹ در یک نوار بادشکن سبز، ارتفاع درختان به ۱۵ متر می‌رسد. اگر این بادشکن عمود بر جهت باد غالب منطقه طراحی شده باشد، برای محافظت از کل منطقه در برابر بادهای طوفانی در چه فاصله‌ای باید این نوار را تکرار کرد؟  
۱) ۶۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۱۶۰ ۴) ۲۲۰
- ۳۰ در کدام یک از موارد، کاشت پاییزه نهال‌های ریشه لخت، قابل توصیه است?  
۱) کاشت گونه‌های سوزنی برگ در خاک‌های سنگین و تحول یافته  
۲) کاشت گونه‌های سوزنی برگ در خاک‌های نرم و شنی  
۳) کاشت گونه‌های پهن برگ در خاک‌های نرم و شنی  
۴) کاشت گونه‌های پهن برگ در خاک‌های سنگین و تحول یافته

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل (کد ۲۴۴۳) ( ۳۹۲F )

- ۳۱ کدامیک از بذور، در دسته بذور ماکروبیوتیک قرار می‌گیرد؟  
۱) نارون، کاج رادیاتا  
۲) افاقیا، گل ابریشم  
۳) بلوط، راش  
۴) بید، تبریزی
- ۳۲ برای تولید نهال از بین سوزنی برگان، کدامیک به حمله قارچ، خیلی حساس هستند؟  
*Picea abies* (۲) *Abies concolor* (۱)  
*Picea sitchensis* (۴) *Abies alba* (۳)
- ۳۳ قطر مناسب برای شروع هرس خشک درختان جنگل کاری، از چه قطعی به بعد باید انجام پذیرد؟  
۱) از حدود ۴۰ سانتی‌متر  
۲) از پنج تا ده سانتی‌متر  
۳) از حدود ۱۵ سانتی‌متر
- ۳۴ گونه *Cerasus mahaleb* برای کدامیک از مناطق رویشی، قابلیت جنگل کاری بیشتری دارد؟  
۱) ایران و تورانی  
۲) ارسیارانی  
۳) خلیج عمانی
- ۳۵ تهیه قلمه در صنوبر و نارون، از کدام قسمت شاخه‌های یک‌ساله نتیجه بهتری می‌دهد؟  
۱) برای این دو گونه تفاوتی وجود ندارد.  
۲) از قسمت میانه شاخه‌های یک ساله نتیجه بهتری می‌دهد.  
۳) از قسمت نوک شاخه‌های یک ساله نتیجه بهتری می‌دهد.  
۴) از قسمت بن شاخه‌های یک ساله نتیجه بهتری می‌دهد.
- ۳۶ کدامیک از گونه‌ها قابلیت جستدهی خوبی دارند؟  
۱) ارس (۱) *Arus*  
۲) نراد (۲) *Nardus*  
۳) پیسه‌آ (۳) *Pisum sativum*  
۴) سرخدار (۴) *Serdarius*
- ۳۷ کدام گونه، ترجیحاً در ارتفاعات جنگل‌های شمال کشور جهت جنگل کاری انتخاب می‌شود؟  
*Betula pendula* (۲) *Carpinus betulus* (۱)  
*Fagus orientalis* (۴) *Quercus castaneifolia* (۳)
- ۳۸ در کدام منطقه جامعه ارس با زیتون وحشی همراه است؟  
۱) دامنه‌های هزار و تفتان در شرق  
۲) ارتفاعات سیراچال در دامنه جنوبی البرز  
۳) ارس‌باران در شمال غربی
- ۳۹ ویژگی‌هایی مانند شکل‌های رویشی، اشکوبندی و ارتفاع تاج پوشش، در کدام سیستم رده‌بندی پوشش‌گیاهی بیشتر به کار می‌روند؟  
۱) فلوریستیک  
۲) فیزیونومیک  
۳) جغرافیایی
- ۴۰ در روش براون بلانکه، گونه‌های تشخیصی، کدام موارد هستند؟  
۱) شاخص - متمایزی - همراه پایا  
۲) متمایزی - شاخص - وفادار  
۳) همراه پایا - وفادار - شاخص
- ۴۱ درجه پایایی گونه‌های گیاهی (فرکانس)، براساس میزان ..... یک گونه معین در ..... محاسبه می‌شود.  
۱) حضور - قطعات نمونه  
۲) حضور - جوامع گیاهی  
۳) غلبه - قطعات نمونه

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۶

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل (کد ۲۴۴۳) ( ۳۹۲F )

-۴۲- کدام جامعه را ش روی خاک سیلیسی می روید؟

Rusco - Fagetum (۲)

Tilio - Fagetum (۱)

Arctostaphylo - Fagetum (۴)

Carpino - Fagetum (۳)

-۴۳- گونه های شاخص به سبب کدام مورد، ارزش تشخیصی دارند؟

۲) پراکنش محدود

(۱) پراکنش گسترده

۴) حضور محدود

(۳) حضور گسترده

-۴۴- در طبقه بندی چند خصلتی (Polythetic)، چه معیاری از گونه ها در هنگام آنالیز به کار گرفته می شود؟

۲) فهرست گونه ها

(۱) فهرست گونه ها و حضور و عدم حضور

۴) حضور و عدم حضور

(۳) فراوانی

-۴۵- اصطلاح Choronosequence، در جامعه گیاهی به چه مفهوم است؟

(۱) جامعه گیاهی به معنی ذات، واحد است.

(۲) جامعه گیاهی دارای یک مسیر توالی است.

(۳) جامعه گیاهی دارای چندین مسیر توالی است.

(۴) نشان دهنده جوامع پلی کلیماکس است.

-۴۶- در کدام مکتب جامعه شناسی گیاهی در نام گذاری جوامع به گونه های علفی توجه می شود؟

۲) کایاندر

(۱) زیگماتیسم

۴) آنگلو - آمریکن

(۳) سکاچف و مروزوف

-۴۷- جوامع گیاهی در روش براون بلانکه، براساس کدام موارد طبقه بندی می شوند؟

(۱) شکل رویشی و ریخت شناسی گونه های شاخص

(۲) تحولی و پراکنش تیپ های گیاهی

(۳) ترکیب و جامعه پذیری گونه های شاخص

(۴) ساختار و تکامل تیپ های گیاهی

-۴۸- کدام روش مدیریت حفاظت، بیشترین مطابقت با طبیعت را دارد و از اولویت بالاتری برخوردار است؟

Ex - situ conservation (۲)

In - situ conservation (۱)

In - vivo Conservation (۴)

In - vitro Conservation (۳)

-۴۹- در صورتی که صفات غالب و مغلوب را بشناسیم و ژنتیک والدین مشخص باشد، کدام یک از موارد در نسل نخست

فرزن丹 بدون مطالعات مولکولی امکان پذیر است؟

(۲) فقط فراوانی ژنتیکی

(۱) فراوانی ژنتیکی

(۴) فراوانی ژنتیکی و فراوانی الی

(۳) فراوانی ژنتیکی و فراوانی الی

-۵۰- کدام یک از گونه ها، در اکوسیستم های طبیعی ایران، توانایی هیبریداسیون بین گونه های کمتری دارد؟

Quercus brantii var. persica (۲)

Fagus orientalis (۱)

Pyrus communis (۴)

Crataegus meyeri (۳)

-۵۱- در صورتی که یک رویشگاه، در اثر کاهش تنوع ژنتیکی و درون لقاحی، حاصل از آن دچار جدایی جغرافیایی شده و

قطعه قطعه شود، چه اتفاقی رخ داده است؟

Outbreeding (۲)

Genetic Drift (۱)

Fragmentation (۴)

Inbreeding (۳)

-۵۲- کلون چیست؟

(۱) جمعیتی از افراد دارای ژنتیک یکسان که به کمک تکثیر غیر جنسی پدید آمده اند.

(۲) جمعیتی از افراد دارای ژنتیک یکسان که به کمک تکثیر جنسی پدید آمده اند.

(۳) جمعیتی از افراد دارای ژنتیک یکسان که به کمک تکثیر غیر جنسی پدید آمده اند.

(۴) جمعیتی از افراد دارای ژنتیک یکسان که به کمک تکثیر جنسی پدید آمده اند.

# پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

-۵۳ در یک جامعه درختان جنگلی، در جنگل‌های خزری پس از ۱۰۰ سال مدیریت، فراوانی الی در درختان مادری راش را با زادآوری‌های ۴۰ ساله آن مطالعه کرده‌ایم، نتایج به شرح زیر است:

درختان مادری  $AA = ۳۵$ ,  $Aa = ۵۰$ ,  $aa = ۱۵$

درختان مادری  $AA = ۴۰$ ,  $Aa = ۴۰$ ,  $aa = ۲۰$

درصورتی که اصل هارדי واین برگ در این جمعیت صادق باشد، با استفاده از ضریب درون لقادی (F) تحلیل کنید که آیا جامعه به سمت درون لقادی پیش می‌رود؟

$$F = \frac{[(2pq - H)]}{2pq}$$


(۱)  $F = ۰/۲۵$ ، جامعه به سمت درون لقادی پیش می‌رود.

(۲)  $F = ۰/۲۵$ ، جامعه به سمت برون لقادی پیش می‌رود.

(۳)  $F = ۰/۲$ ، جامعه به سمت درون لقادی پیش می‌رود.

(۴)  $F = ۰/۲$ ، جامعه به سمت برون لقادی پیش می‌رود.

-۵۴ زیموگرام زیر مربوط به سه ژنتیپ متفاوت راش است. اگر تعداد این افراد یکصد درخت بوده، فراوانی آنها به ترتیب زیر باشد:



$$A = ۴۰, B = ۲۰, C = ۴۰$$

ژنتیپ و فراوانی الی آنها را تعیین کرده و درصورتی که ژنتیپ B با C آمیزش کنند، فراوانی الی قابل انتظار ژنتیپ‌های نسل بعد چقدر است؟

(۱) در نسل حاضر  $AA, BB, AB$  و فراوانی الی آنها  $= ۰/۶$  و  $B = ۰/۴$  و در نسل بعد  $= ۰/۷۵$

(۲) در نسل حاضر  $AA, BB, AB$  و فراوانی الی آنها  $= ۰/۴$  و  $B = ۰/۶$  و در نسل بعد  $= ۰/۲۵$  و  $A = ۰/۷۵$

(۳) در نسل حاضر  $AA, aa, Aa$  و فراوانی الی آنها  $= ۰/۴$  و  $a = ۰/۶$  و در نسل بعد  $= ۰/۵$  و  $A = ۰/۵$

(۴) در نسل حاضر  $AA, aa, Aa$  و فراوانی الی آنها  $= ۰/۶$  و  $a = ۰/۴$  و در نسل بعد  $= ۰/۵$  و  $A = ۰/۵$

-۵۵ با وجود آنکه اصل هارדי واین برگ در جمعیت‌هایی صادق است که پدیده‌های جهش ژنی، رانش ژنی، مهاجرت رخندیده، کدام ویژگی یک جمعیت می‌تواند، عدم وجود این شرط در یک اکوسیستم را جبران نموده و تعادل هارדי - واینبرگ را در این جمعیت حاکم کند؟

(۱) بزرگی جمعیت و لقادی تصادفی

(۲) تنوع ژنتیکی و بکر بودن اکوسیستم

(۳) تنوع گونه‌ای و لقادی تصادفی

-۵۶ در آزمایشی از خود لقادی یک راش دارای کرک رشته‌ای (صفت غالب) با ژنتیپ  $Aa$ ، در نسل نخست ۶۵ پایه دارای کرک و ۳۵ پایه فاقد کرک (صفت مغلوب) به دست آمده است. در ضمن در حاشیه این پارسل راش‌های خالص فاقد کرک وجود دارند، که ممکن است گرده آنها نیز در فرایند لقادی اثر گذارد باشد.

مقدار  $X^2$  چقدر است و بررسی کنید در حالی که عدد کای جدول معادل  $X^2 = ۳/۸۴$  است، آیا خودلقادی به درستی انجام شده است؟

$$X^2 = \frac{\sigma(0-e)^2}{e}$$

(۱)  $X^2 = ۱/۳۳$ ، خودلقادی به درستی انجام نشده است.

(۲)  $X^2 = ۵/۳۳$ ، خودلقادی به درستی انجام نشده است.

(۳)  $X^2 = ۱/۳۳$ ، خودلقادی به درستی انجام شده است.

# پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

-۵۷- مولکولی که به DNA چسبیده و مانع از بیان ژن می‌شود، از چه گروهی است و چه نام دارد؟

- (۱) اینترون و از گروه پروتئین‌ها  
(۲) هیستون و از گروه اسیدهای نوکلئیک  
(۳) هیستون و از گروه پروتئین‌ها  
(۴) اینترون و از گروه اسیدهای آمینه

-۵۸- گونه‌هایی مانند سفید پلت که قدرت زیادی در تکثیر غیرجنسی دارند، چگونه سطح تنوع ژنتیکی خود را حفظ می‌کنند؟

- (۱) به کمک تکثیر از طریق جست  
(۲) به کمک جهش‌های سوماتیک  
(۳) به کمک تکثیر از طریق ریشه جوش  
(۴) به کمک زادآوری از طریق بذر در فضاهای خالی

-۵۹- تلاقی کدامیک از والدین منجر به تنوع ژنتیکی بیشتری می‌شود؟

- (۱) تلاقی والدین ناخالص با ناخالص  
(۲) تلاقی والدین خالص غالب و ناخالص  
(۳) تلاقی والدین خالص مغلوب و ناخالص

-۶۰- با حذف تدریجی درختان در یک توده جنگلی چه اتفاقاتی در طول یک مدت متوسط برای عناصر غذایی در خاک قابل پیش‌بینی می‌باشد؟

(۱) در یک دوره متوسط حذف تدریجی درختان در یک توده جنگلی مشکل حادی را در ارتباط با عناصر غذایی در خاک‌ها به وجود نمی‌آورد.

(۲) تأمین عناصر غذایی از طریق لاشبرگ خیلی تغییر نمی‌کند ولی معدنی شدن و از دست رفتن سریع عناصر غذایی پیش می‌آید.

(۳) یکی از منابع اصلی تأمین عناصر غذایی یعنی لاشبرگ‌ها کم شده و همچنین معدنی شدن و از دست رفتن سریع عناصر غذایی پیش نمی‌آید.

(۴) یکی از منابع اصلی تأمین عناصر غذایی یعنی لاشبرگ‌ها کم شده ولی نرخ معدنی شدن و از دست رفتن عناصر غذایی پیش نمی‌آید.

-۶۱- میزان دی‌اسید‌کربن در کدام لایه زیستی جنگل، بیشتر است؟

- (۱) تاج پوشش (۲) خاک (۳) هم‌سطح خاک (۴) تنه درختان

-۶۲- مهم‌ترین مشخصه خاک‌های راندزین، کدام موارد است؟

- (۱) سنگ مادر اسیدی، عمق مناسب خاک (۲) سنگ مادر آهکی، عمق مناسب خاک  
(۳) سنگ مادر اسیدی، عمق کم خاک (۴) سنگ مادر آهکی، عمق کم خاک

-۶۳- آنزیم نیتروژناز، در کدام مرحله از چرخه نیتروژن تأثیر دارد؟

(۱) نیتریفیکاسیون (۲) آمونیفیکاسیون (۳) تشییت نیتروژن (۴) معدنی شدن نیتروژن

-۶۴- لایه آلی کف جنگل، چند برابر وزن خود، آب جذب می‌کند؟

- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

-۶۵- کدام گونه برای اصلاح خاک نهالستان قابل استفاده نیست؟

- (۱) شبدر ترشک (۲) لوپین زرد (۳) لوپیا (۴) ماشک

-۶۶- کدام گونه از کاج، آهک‌گریز است؟

(۱) *Pinus sylvestris* (۲) *Pinus strobus* (۳) *Pinus pinaster*

(۴) همه موارد

-۶۷- لاشبرگ‌های کدام گونه درختی، هوموس مول تولید می‌کند؟

- (۱) راش (۲) ممرز (۳) بلوط (۴) انجیلی

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل (کد ۲۴۴۳) ( ۳۹۲F )

- ۶۸- کدامیک از گیاهان، معرف خاک‌های مرطوب و با زهکشی نامناسب می‌باشد؟
- (۱) گزنه سفید      (۲) چلرک      (۳) دم اسب      (۴) علف هفت‌بند
- ۶۹- برای کاشت گونه در خاک‌های رسی و سنگین، کدام گونه اولویت دارد؟
- (۱) *Picea excelsa*      (۲) *Quercus castaneifolia*      (۳) *Gleditschia caspica*      (۴) *Carpinus betulus*
- ۷۰- در سطح یک پارسل از جنگل‌های شمال، تغییر کدام عامل در تغییر خصوصیات خاک مهم‌تر است؟
- (۱) پوشش‌های درختی      (۲) سنگ مادر      (۳) آب و هوای      (۴) سطح آب زیرزمینی





