



۱۱۲

۱۱۲

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تم مرکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی تربیت بدنی – آسیب‌شناسی ورزشی (کد ۲۱۱۷)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره نا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی – حرکات اصلاحی پیشرفته – آسیب‌شناسی ورزشی پیشرفته)	۸۰	۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

استقدامه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقرزات زنگار می‌شود.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز)

صفحه ۲

112F

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنسport

- ۱- در یک گروه از ورزشکاران که میانگین قد آن‌ها 171 متر و انحراف معیار 34 سانتی‌متر است، ضریب پراکندگی کدام است؟
- (۱) 0.2 (۲) 2 (۳) 200 (۴) 20
- ۲- نمره T برای یک دونده 100 متر با رکورد 12 ثانیه، در صورتی که میانگین رکوردهای مسابقه 11.5 ثانیه و انحراف استاندارد یک باشد، چقدر است؟
- (۱) 45 (۲) 55 (۳) 65 (۴) 100
- ۳- اگر رکورد فردی در دوی سرعت 15 باشد؛ در صورتی که میانگین و واریانس به ترتیب 13 و 14 باشد، نمره T او چقدر است؟
- (۱) 40 (۲) 45 (۳) 55 (۴) 60
- ۴- در کدام روش آماری جهت بررسی ضریب اعتماد (پایابی) آزمون، واریانس نمره‌ها اندازه‌گیری می‌شود؟
- (۱) روش «باز آزمایی» (۲) روش «الفای کرونباخ» (۳) روش «دو نیمه کردن آزمون» (۴) روش «استفاده از آزمون‌های همتا»
- ۵- هنگامی که افراد یک گروه در دو یا چند موقعیت آزمون می‌شوند؛ روش آماری مناسب کدام است؟
- (۱) آزمون t همبسته (۲) تحلیل واریانس دوراهه (۳) تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری (۴) احتمال رد فرضیه صفر در کدام آزمون کمتر است؟
- (۱) در آزمون دو سویه (دو دامنه) و با سطح معنی‌داری 0.01 (۲) در آزمون دو سویه (دو دامنه) با سطح معنی‌داری 0.005 (۳) در آزمون تک سویه (تک دامنه) با سطح معنی‌داری 0.01 (۴) در آزمون تک سویه (تک دامنه) با سطح معنی‌داری 0.005
- ۶- تصور کنید پس از یک دور تمرینی به دو روش فیزیکی و مشاهده‌ای، رکوردهای زیر در آزمون پاس پنجه به دست آمده است. کدام روش تمرینی ضریب تغییر کمتری داشته است؟
- | n | \bar{x} | SD | گروه |
|----|-----------|-----|--------|
| ۲۵ | ۵۳/۱ | ۶/۲ | مشاهده |
| ۲۵ | ۵۳/۷ | ۹/۴ | فیزیکی |
- (۱) فیزیکی (۲) مشاهده (۳) مشاهده و فیزیکی (۴) احتیاج به اطلاعات دیگر می‌باشد.
- ۷- میانگین توزیعی 25 و انحراف معیار آن 2 است. چنانچه تمام نمرات این توزیع در عدد 3 ضرب شوند، واریانس توزیع جدید چه عددی خواهد بود؟
- (۱) 4 (۲) 6 (۳) 9 (۴) 36

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۹- اگر در ارزیابی معلمان جدید تربیت‌بدنی، به‌طور همزمان بخواهیم به یک گروه از ورزشکارانی که در حال تمرین پنجه والبیال هستند نمره بدهنده و نمره آن‌ها را با نمره یک مربی با تجربه والبیال مقایسه کنیم، کدام ویژگی آزمون را بررسی نموده‌ایم؟
- (۱) اعتبار پایابی (reliability)
(۲) ضریب تمیز
(۳) روابی (validity)
(۴) عینیت
- ۱۰- در یک امتحان سنجش و اندازه‌گیری در صورتی که ۱۵ نفر از ۳۰ دانشجوی زرنگ کلاس به سؤال (۴) پاسخ صحیح داده باشند و ۲۰ نفر از ۳۰ نفر دانشجوی ضعیف هم به همان سؤال پاسخ صحیح داده باشند، کدام مورد در رابطه با وضعیت سؤال (۴) درست است؟
- (۱) دارای ضریب دشواری خوب و ضریب تمیز نامناسب می‌باشد.
(۲) دارای ضریب دشواری ضعیف و ضریب تمیز نامناسب می‌باشد.
(۳) دارای ضریب دشواری و ضریب تمیز خوب می‌باشد.
(۴) دارای ضریب دشواری و ضریب تمیز نامناسب می‌باشد.
- ۱۱- اگر رکورد مسابقات دو و میدانی المپیک ریو دارای میانگین ۹,۹۸ باشد، در صورتی که یکی از دوندگان جامائیکایی دارای رکورد ۱۵/۱ باشد، رتبه درصدی این دوندگان در بین سایر دوندگان چقدر است؟
- (۱) بالاتر از ۵۰ درصد
(۲) پایین‌تر از ۵۰ درصد
(۳) احتیاج به اطلاعات دیگر از جمله انحراف استاندارد داده‌ها می‌باشد.
(۴) احتیاج به اطلاعات دیگر از جمله انحراف متوسط داده‌ها می‌باشد.
- ۱۲- اگر ضریب همبستگی هوش و تعادل ۹/۰ + هوش و هماهنگی ۸/۰ باشد، کدام تفسیر تحلیلی درست‌تر است؟
- (۱) همبستگی هوش و تعادل ۱/۰ بزرگ‌تر از هوش و هماهنگی است.
(۲) همبستگی هوش و تعادل قوی‌تر از همبستگی هوش و هماهنگی است.
(۳) همبستگی هوش و تعادل در مقایسه با هوش و هماهنگی معنادارتر است.
(۴) واریانس همبستگی هوش و تعادل ۱۷ درصد بیشتر از هوش و هماهنگی است.
- ۱۳- کدام روش آماری برای برآورد رابطه بین دو متغیر اسمی، مناسب است؟
- (۱) ویل کاکسون
(۲) مجدور کای پیرسون
(۳) کروسکال والیس
(۴) همبستگی اسپیرمن
- ۱۴- اگر نتایج مقایسه تفاوت رتبه‌های چهار گروه نمونه آماری معنادار باشد، برای تعیین منشا تفاوت درون گروه‌ها، کدام آمون تعقیبی مناسب‌تر است؟
- (۱) توکی
(۲) تی مستقل
(۳) یوی‌مان ویتنی
(۴) ویلکاکسون
- ۱۵- کدام مورد، بهترین ضریب دشواری و ضریب تمیز یک سؤال را نشان می‌دهد؟
- (۱) ضریب دشواری ۵/۰ و ضریب تمیز ۱/۰
(۲) ضریب دشواری ۱ و ضریب تمیز ۵/۰
(۳) ضریب دشواری ۱ و ضریب تمیز ۵/۰

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تممرکز)

صفحه ۴

112F

- ۱۶- هنگامی که برای تعیین روایی یک آزمون جدید با استفاده از روش همبستگی پیرسون، نتایج به دست آمده از یک گروه با نتایج همان گروه در یک آزمون استاندارد را مقایسه می‌کنیم، کدام نوع روایی را سنجیده‌ایم؟
- (۱) روایی پیش‌بین
(۲) روایی صوری
(۳) روایی همزمان
(۴) روایی سازه
- ۱۷- کدام یک از روش‌های تعیین پایایی آزمون، برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری و پرسشنامه به کار می‌رود؟
- (۱) آلفای کرونباخ
(۲) بازآزمایی
(۳) فرم‌های همارز
(۴) کوادر - ریچاردسون
- ۱۸- اگر در درس حرکتشناسی $\bar{x} = 14$ و اختلاف بین نمرات $Z(-1,+1) = 3$ باشد، نمره خام فردی که رتبه درصدی وی حدود ۸۴ می‌باشد، چقدر است؟
- (۱) ۱۸
(۲) ۱۷
(۳) ۱۶
(۴) ۱۵/۵
- ۱۹- اگر مجموع رکورد قدرت گریپ دست ۴۲ نفر برابر ۱۰۵۰ باشد و واریانس نمره‌ها برابر ۴ باشد، فردی که نمره خام ۲۹ گرفته است از حدود چند درصد افراد کلاس نمره بهتری گرفته است؟
- (۱) ٪۸۴
(۲) ٪۹۸
(۳) ٪۷۵
(۴) ٪۶۸
- ۲۰- اگر نمره T فرد در آزمون قدرت پایین‌تنه ۸۰ باشد و میانگین نمرات و انحراف استاندارد به ترتیب ۷۰ و ۱۵ باشد، نمره خام فرد چقدر است؟
- (۱) ۸۵
(۲) ۱۵۰
(۳) ۱۰۰
(۴) ۲۰۰
- حرکات اصلاحی پیشرفتی:
- ۲۱- در سندروم لایه‌ای (Layer syndrome)، الگوی کوتاهی و ضعف‌های عضلانی به کدام شکل است؟
- (۱) عضلات ارکتور اسپاین سینه‌ای، تراپیزیوس بالایی و لواتوراسکاپولا دچار کوتاهی و عضلات ارکتور اسپاین گردنی، رومبوئید و تراپیزیوس میانی و تحتانی دچار ضعف می‌شوند.
(۲) عضلات ارکتور اسپاین گردنی، رومبوئیدها و تراپیزیوس فوقانی دچار کوتاهی و عضلات لواتوراسکاپولا، تراپیزیوس میانی و تحتانی و ارکتور اسپاین سینه‌ای دچار ضعف می‌شوند.
(۳) عضلات ارکتور اسپاین گردنی، لواتوراسکاپولا و بخش فوقانی تراپیزیوس دچار ضعف و عضلات رومبوئید، تراپیزیوس میانی و تحتانی و ارکتور اسپاین سینه‌ای دچار کوتاهی می‌شوند.
(۴) عضلات ارکتور اسپاین گردنی، لواتوراسکاپولا و بخش فوقانی تراپیزیوس دچار کوتاهی و عضلات رومبوئید، تراپیزیوس میانی و تحتانی و ارکتور اسپاین سینه‌ای دچار ضعف می‌شوند.
- ۲۲- هایپربرونیشن پا موجب ایجاد کدام وضعیت است؟
- (۱) افزایش تیلت خلفی لگن
(۲) افزایش تیلت قدامی لگن
(۳) چرخش خارجی ران
(۴) چرخش ساق پا

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۳- تغییرات جبرانی ناشی از ریتروزرن (Retroversion) استخوان ران، در اندام تحتانی به کدام شکل است؟

- (۱) افزایش چرخش خارجی ران + تورشن داخلی تبیبا + سوپینیشن پا
- (۲) افزایش چرخش خارجی ران + تورشن خارجی تبیبا + پرونیشن پا
- (۳) افزایش چرخش داخلی ران + تورشن داخلی تبیبا + سوپینیشن پا
- (۴) افزایش چرخش داخلی ران + تورشن خارجی تبیبا + پرونیشن پا

- ۲۴- عوارض زیر مربوط به کدام ناهنجاری پاسجرال است؟

«استخوان ران به سمت جلو تیلت پیدا می‌کند درنتیجه یک فشردگی در ناحیه قدامی استخوان ران و درشت نی ایجاد می‌شود و یک نقص در عملکرد راه رفتن فرد به وجود می‌آید. بیماران با این پاسجر از حد نرمال آهسته‌تر راه می‌روند و میزان گشتاور اکستنسورهای زانو در این بیماران از افراد با پاسجر نرمال زانو، بالاتر است.»

- (۱) ژنو فلکسوم
- (۲) ژنو واروم
- (۳) ژنو رکورواتوم
- (۴) ژنو والگوم

- ۲۵- هنگامی که به دلیل بروز ضعف در عضله سرینی بزرگ، عضله همسترینگ نقش اصلی حرکت اکستنسن مفصل ران را به عهده می‌گیرد، حرکت غیرطبیعی صورت گرفته در خلال حرکت مذکور کدام است؟

- (۱) لغزش به بیرون سر استخوان ران
- (۲) لغزش به طرفین سر استخوان ران
- (۳) لغزش خلفی سر استخوان ران
- (۴) لغزش قدامی سر استخوان ران

- ۲۶- گود شدن کمر و بالا آمدن شانه‌ها هنگام ارزیابی حرکت پرس با دمبل، نشان‌دهنده ضعف و مهار کدام گروه از عضلات است؟

- (۱) پشتی بزرگ، پایدارکننده‌های عمقی تن، ذوزنقه میانی، ذوزنقه فوقانی
- (۲) پشتی بزرگ، پایدارکننده‌های عمقی تن، ذوزنقه میانی، ذوزنقه تحتانی
- (۳) سرینی بزرگ، پایدارکننده‌های عمقی تن، ذوزنقه میانی، ذوزنقه تحتانی
- (۴) سرینی بزرگ، پایدارکننده‌های عمقی تن، روپیتور کاف، ذوزنقه فوقانی

- ۲۷- مفهوم انعطاف‌پذیری نسبی جبرانی (compensatory relative flexibility) که اولین بار توسط سهرمن ارائه شد، کدام است؟

(۱) ضعف عضلاتی ایجاد شده در عضلات ناشی از باقی‌ماندن آن‌ها در طول طویل برای مدت طولانی
(۲) کوتاهی در یک عضله یا گروهی از عضلات باعث ایجاد حرکت در مفاصل پروگزیمال این عضله می‌شود.
(۳) حرکتی که یک بیمار دارای ضعف عضلانی شدید یا فلچ عضلانی برای جبران حرکت اصلی که در آن ناتوان است، انجام می‌دهد.

(۴) افزایش سفتی در یک عضله یا گروهی از عضلات باعث ایجاد حرکت در مفاصلی می‌شود که بافت‌های اطرافشان سفتی کمتری دارند.

- ۲۸- کدام مورد، در خصوص کایفوز شوئمن درست است؟

- (۱) میزان شیوع کایفوز شوئمن در هر دو جنس یکسان است.
- (۲) در کایفوز شوئمن قوز پشتی از نوع قوسی و C شکل است.
- (۳) در کایفوز شوئمن ناحیه کمری نسبت به ناحیه پشتی بیشتر در گیر می‌شود.
- (۴) در کایفوز شوئمن با خم شدن رو به جلو میزان کایفوز بیشتر و با باز شدن میزان انحنای پشتی کاهش می‌یابد.

- ۲۹- کدام مورد، از ویژگی‌های افراد دچار سندروم متقاطع فوقانی است؟
- (۱) شانه‌های گرد و سر به جلو
 - (۲) سر به جلو و کمر گود
 - (۳) عضلات کوتاه شده سینه‌ای بزرگ
 - (۴) عضله متوازی‌الاضلاع که به صورت عملکردی کوتاه شده است.
- ۳۰- در فردی که دارای زاویه افزایش یافته آنتی‌ورزن ران است، راه رفتن به چه صورت است؟
- (۱) swing دارد
 - (۲) Toe-in
 - (۳) Toe-out
 - (۴) تغییر نمی‌کند چون جبران می‌شود.
- ۳۱- کدام مورد، علت ایجاد کتف بالدار نوع اولیه (primary winging) است؟
- (۱) وجود پاتولوژی در مفصل گلنوهومرال
 - (۲) نقص مادرزادی در شکل‌گیری استخوان کتف
 - (۳) ضعف یک یا گروهی از عضلات ثبات‌دهنده کتف
 - (۴) فلچ یا آسیب عصب سینه‌ای طویل (long thoracic nerve injury)
- ۳۲- وضعیت قوس گردنی در ناهنجاری سر به جلو، در یک دوم فوقانی و یک دوم تحتانی به ترتیب کدام است؟
- (۱) افزایش قوس - کاهش قوس
 - (۲) طبیعی - افزایش قوس
 - (۳) کاهش قوس - افزایش قوس
 - (۴) طبیعی - کاهش قوس
- ۳۳- با توجه به تقسیم‌بندی عارضه اسکولیوز براساس موضع درگیری، کدام مورد درخصوص «اسکولیوز سینه‌ای - کمری» درست است؟
- (۱) منطقه گرفتار شده شامل مهره‌های سینه‌ای و کمری است.
 - (۲) بر جسته‌ترین نقطه (رأس) قوی در قسمت سینه‌ای و یا کمری است.
 - (۳) منطقه گرفتار شده در حدفاصل آخرین مهره سینه‌ای و اولین مهره کمری است.
 - (۴) بر جسته‌ترین نقطه (راس) قوی بین آخرین مهره سینه‌ای و اولین مهره کمری است.
- ۳۴- در عارضه زانوی ضربیدری، جهت تقویت عضله دو سر رانی، از کدام تمرين اختصاصی می‌توان استفاده کرد؟
- (۱) خم کردن زانو در حالت خوابیده به شکم با چرخش پنجه‌ها به داخل
 - (۲) خم کردن زانو در حالت خوابیده به شکم با چرخش پنجه‌ها به خارج
 - (۳) خم کردن زانو در حالت خوابیده به شکم و چرخش لگن به جلو
 - (۴) خم کردن زانو در حالت خوابیده به شکم و چرخش لگن به عقب
- ۳۵- کدام مورد، جزء خصوصیات عضلات لوکال تونیک است؟
- (۱) تولید نیروی کم
 - (۲) سرعت انقباض بالا
 - (۳) فعالیت موقت
 - (۴) کنترل حرکات ارادی
- ۳۶- تمرينات چهاردست و پا برای اصلاح کدام ناهنجاری به کار می‌رود؟
- (۱) اسکولیوز
 - (۲) شانه‌های نابرابر
 - (۳) لوردوز
 - (۴) کایيفوز

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۷- وجود نقص در عملکرد زیرسیستم جانبی (LS)، اندام تحتانی می‌تواند منجر به بروز کدام اختلال در حین فعالیت‌های عملکردی شود؟
- (۱) چرخش خارجی استخوان درشت نی
 - (۲) دور شدن و چرخش خارجی استخوان ران
 - (۳) نزدیک شدن و چرخش داخلی استخوان ران
 - (۴) پرونیشن مفصل تحت قاپی و چرخش خارجی استخوان درشت نی
- ۳۸- برای اندازه‌گیری تقارن کتف‌ها به روش حرکت جانبی اسکاپولا (LSST)، به کدام صورت عمل می‌شود؟
- (۱) اندازه‌گیری فاصله بین ریشه خارکتف با نزدیک‌ترین زایده خاری مهره مجاور
 - (۲) اندازه‌گیری فاصله بین زاویه تھتانی کتف‌ها با نزدیک‌ترین زایده خاری مهره مجاور
 - (۳) اندازه‌گیری فاصله بین زاویه فوقانی کتف‌ها با نزدیک‌ترین زایده خاری مهره مجاور
 - (۴) اندازه‌گیری فاصله بین قسمت خلفی خارجی زایده آکرومیون با نزدیک‌ترین زایده خاری مهره مجاور
- ۳۹- عضلات مایل داخلی و خارجی، مجموعه نزدیک‌کننده‌ها، چرخش دهنده‌های خارجی ران، کدام زیرسیستم را تشکیل می‌دهند؟
- (۱) جانبی
 - (۲) طولی عمقی
 - (۳) مایل خلفی
 - (۴) مایل قدامی
- ۴۰- در انجام حرکت اسکات بالای سر، زمانی که حرکات جبرانی در اسکات بالای سر با جدا شدن پاشنه‌ها از زمین همراه باشد، به ترتیب بیانگر کوتاهی و ضعف کدام عضلات است؟
- (۱) دوقلوی داخلی و خارجی
 - (۲) نعلی - ساقی قدامی
 - (۳) رکبی - ساقی خلفی
 - (۴) عضلات نازکنئی و نیام کف پایی
- ۴۱- در عارضه کف پای صاف، کدام عضلات را باید تحت کشش قرار داد؟
- (۱) ابداقتورهای قسمت قدامی پا
 - (۲) اورتورها و دورسی فلکسورهای مج پا
 - (۳) اینورتورها و پلاتارفلکسورهای مج پا
- ۴۲- کدام تمرين برای اصلاح وضعیت «فانکشنال والگوس» در زانو مناسب است؟
- (۱) تقویت چرخاننده‌های خارجی ران
 - (۲) تقویت چرخاننده‌های داخلی ران
 - (۳) تقویت عضلات داخلی زانو و ران
 - (۴) کشش عضلات خارجی زانو و ران
- ۴۳- انقباض هماهنگ کدام عضلات باعث فشار داخلی شکم و ثبات وضعیتی ستون مهره‌ها می‌شوند؟
- (۱) مولتی‌فیدوس، دیافراگم و عضلات کف لگنی
 - (۲) عرضی شکمی، دیافراگم و عضلات کف لگنی
 - (۳) عرضی شکمی، مولتی‌فیدوس و عضلات کف لگنی
 - (۴) عرضی شکمی، دیافراگم و مولتی‌فیدوس
- ۴۴- تقویت عضله سرینی بزرگ و کشش عضله ایلیوپسواس در یک الگوی مهار متقابل جهت اصلاح کدام ناهنجاری قائمی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) ناهنجاری پشت تابدار
 - (۲) ناهنجاری هیپرکیفوسیس
 - (۳) ناهنجاری پشت صاف (هیپولوردوزیس)
- ۴۵- برای شروع اجرای تمرينات اصلاحی جهت عارضه پوسچرال، کدام مورد درست است؟
- (۱) تمرينات کششی - مهار
 - (۲) تمرينات کششی - تمرینات قدرتی
 - (۳) مهار - تمرینات قدرتی
 - (۴) مهار - تمرینات کششی
- ۴۶- کشش همزمان عضلات خلفی ستون فقرات و تقویت همسترینگ‌ها برای اصلاح کدام ناهنجاری تجویز می‌شود؟
- (۱) اسکولیوزیس
 - (۲) هایپرکايفوزیس
 - (۳) هایپولوردوزیس
 - (۴) هایپرلوردوزیس

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۷- اندازه‌گیری وضعیت سر به جلو (Forward head) به روش محاسبه زاویه کرانیوورتبرال به کدام شکل است؟

- (۱) اندازه‌گیری زاویه خط گذرنده از زایده خاری مهره هفتم گردنی و تراگوس گوش با خط افق
- (۲) اندازه‌گیری زاویه خط گذرنده از زایده خاری مهره هفتم گردنی و زایده پستانی با خط افق
- (۳) اندازه‌گیری زاویه خط گذرنده از زایده خاری مهره هفتم گردنی و تراگوس گوش با خط عمود
- (۴) اندازه‌گیری زاویه خط گذرنده از زایده خاری مهره هفتم گردنی و زایده پستانی با خط عمود

- ۴۸- در کدام قسمت از مرحله سکون، مرکز ثقل بدن در پایین‌ترین ارتفاع خود قرار می‌گیرد؟

- (۱) مرحله سکون میانی
- (۲) مرحله تماس کف پا با زمین یا مرحله تحمل وزن
- (۳) مرحله ضربه پاشنه به زمین یا آغاز تماس پا با زمین
- (۴) مرحله بلند شدن پاشنه از زمین، جدا شدن پنجه از زمین

- ۴۹- کدام مورد بیانگر نحوه اندازه‌گیری شاخص استاهلی در بررسی وضعیت قوس کف پا است؟

- (۱) باریک‌ترین قسمت قوس تقسیم بر پهن‌ترین قسمت پاشنه در اثر کف پا
- (۲) پهن‌ترین قسمت پاشنه تقسیم بر باریک‌ترین قسمت قوس در اثر کف پا
- (۳) باریک‌ترین قسمت قوس تقسیم بر پهن‌ترین قسمت کل کف پا در اثر کف پا
- (۴) پهن‌ترین قسمت کل کف پا تقسیم بر باریک‌ترین قسمت قوس در اثر کف پا

- ۵۰- روش ارزیابی REBA به کدام منظور به کار می‌رود؟

- (۱) روشنی است برای ارزیابی اعضای بالاتنه
- (۲) بهمنظور ارزیابی طول عضلات همسترینگ استفاده می‌شود.
- (۳) شبوهای است بهمنظور اندازه‌گیری زوایای بین مقاطع تن به ویژه پاسجر کمر
- (۴) روشنی است برای ارزیابی پوسچر در فعالیت‌هایی که با وضعیت بدنی متنوع همراه باشد.

آسیب‌شناسی ورزشی پیشرفته:

- ۵۱- کدام مورد، جزء فرضیه‌های مطرح شده در خصوص علت اصلی آسیب «شکستگی بر اثر فشار» بهشمار می‌رود؟

- (۱) بار اضافی و خستگی
- (۲) خستگی و فشار ناگهانی
- (۳) عدم حمایت استخوانی به‌وسیله عضلات
- (۴) خمیدگی استخوان به‌وسیله گروههای خاص عضلانی

- ۵۲- سه عامل مهمی که در پیشگیری از آسیب، اتفاق آسیب و بازگرداندن بازیکن آسیبدیده به ورزش نقش مهم ایفاده می‌کنند، کدامند؟

- (۱) قدرت عضلانی - چاپکی - مهارت
- (۲) استقامت عضلانی - دامنه حرکتی - حسی عمقی
- (۳) چاپکی - مهارت - استقامت عضلانی
- (۴) قدرت عضلانی - انعطاف‌پذیری - تعادل

- ۵۳- هنگام افتادن روی دست‌های کشیده به بیرون (Foosh) و باز شدن بیش از حد آرنج، ترتیب رخ دادن آسیب‌های آرنج کدام است؟

- (۱) پارگی کپسول قدامی - پارگی لیگامنت خارجی - پارگی لیگامنت داخلی
- (۲) پارگی لیگامنت خارجی - پارگی لیگامنت داخلی - پارگی کپسول قدامی
- (۳) پارگی لیگامنت داخلی - پارگی کپسول قدامی - پارگی لیگامنت خارجی
- (۴) پارگی لیگامنت داخلی - پارگی لیگامنت خارجی - پارگی کپسول قدامی

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۵۴- به هنگام **Take off** در دویدن یا پریدن، احتمال بروز کدام آسیب وجود دارد؟
- (۱) کمپارتمان خارجی
 - (۲) کمپارتمان عمقی خلفی
 - (۳) کمپارتمان قدامی
 - (۴) التهاب غلاف تاندون عضله درشت نئی قدامی
- ۵۵- درد تیز (**sharp pain**) در خط مفصلی داخلی زانو در حین فلکشن کامل به همراه قفل کردن زانو در طی حرکت، نشانه آسیب کدام بخش زانو است؟
- (۱) رباط صلیبی قدامی (ACL)
 - (۲) منیسک خارجی
 - (۳) منیسک داخلی
 - (۴) رباط جانب داخلی زانو (MCL)
- ۵۶- «دوندهای بعد از استارت زدن سریع پس از چند قدم، احساس درد شدید در ناحیه ران می‌کند و از مسابقه کنار می‌کشد. پس از چند روز وی کماکان در حین فلکشن مقاومتی زانو احساس درد شدید دارد.» به احتمال زیاد کدام عضله در وی چار پارگی شده است؟
- (۱) اداکتور لانگوس
 - (۲) باسیپس فموریس
 - (۳) رکتوس فموریس
 - (۴) گلوتونوس مدیوس
- ۵۷- «والیبالیستی هنگامی که دست خود را از ناحیه شانه و به صورت اکتیو از پهلو بالا می‌آورد احساس درد می‌کند، ولی در هنگام همین حرکت به صورت پسیو اصلاً دردی احساس نمی‌کند. در هنگام تست حرکات ایزومتریک، ابداقشن مقاومتی شانه باعث درد نمی‌شود ولی تست امپتی کن (**Empty Can**) در وی مثبت است.» به احتمال زیاد کدام بخش ناحیه شانه آسیب دیده است؟
- (۱) آسیب عضله فوق خاری
 - (۲) بورسیت ساب آکرومیال
 - (۳) پارگی عضله تحت کتفی
 - (۴) پارگی عضله دلتوئید
- ۵۸- ترشح زیاد کدام هورمون، در پارگی لیگامنت‌ها مخصوصاً لیگامنت **ACL** نقش دارد؟
- (۱) لوتینی
 - (۲) پروژسترون
 - (۳) استروژن
 - (۴) فولیکولی
- ۵۹- بانداز شکل 8 (**figure of eight**) در درمان کدام آسیب شانه کاربرد دارد؟
- (۱) دررفتگی شانه
 - (۲) شکستگی ترقه
 - (۳) شکستگی سر استخوان بازو
 - (۴) شکستگی استخوان کتف (اسکاپولا)
- ۶۰- برای درمان پارگی عضلاتی، به ترتیب کدام تمرینات ورزشی توصیه می‌شود؟
- (۱) ایستا - پویا - کششی - هماهنگی - ویژه رشته ورزشی
 - (۲) ایستا - کششی - پویا - هماهنگی - ویژه رشته ورزشی
 - (۳) ایستا - کششی - هماهنگی - پویا - ویژه رشته ورزشی
 - (۴) ایستا - هماهنگی - پویا - کششی - ویژه رشته ورزشی
- ۶۱- درد در حالت کشش غیرفعال (پاسیو)، عضلات خلفی ساق پا ناشی از ضربه دیدگی، نشانه کدام مورد است؟
- (۱) التهاب بافت‌ها در منطقه افزايش فشار در بافت‌ها
 - (۲) عدم خونرسانی کافی به بافت‌ها
 - (۳) عدم کلارایی اعصاب و عضلات
 - (۴) افزايش فشار در بافت‌ها
- ۶۲- پارگی لیگامنت جانبی زند زیرین در کدام فعالیت ورزشی متدالو تر است؟
- (۱) اسکواش
 - (۲) فوتbal
 - (۳) اسکی
 - (۴) تنیس روی میز
- ۶۳- آزمون تسالی (**Thessaly**) جهت تشخیص آسیب کدام بخش از زانو کاربرد دارد؟
- (۱) کپسول مفصلی خلفی زانو
 - (۲) لیگامنت جانب داخلی و خارجی
 - (۳) لیگامنت صلیبی قدامی و خلفی
 - (۴) منیسک داخلی و خارجی

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۶۴- برنامه پیشگیری ۱۱+ برای پیشگیری از آسیب‌های کدام ورزش طراحی شده است؟
- (۱) بسکتبال (۲) فوتبال (۳) والیبال (۴) هندبال
- ۶۵- در بین ریسک فاکتورهای مختلف آسیب لیگامنت‌های خارجی مج پا، مهم‌ترین کدام است؟
- (۱) سابقه آسیب قبلی لیگامنت‌های خارجی (۲) قدرت عضلات ساق و مج پا
(۳) نوسان وضعیتی (۴) ضعف پایی غالب
- ۶۶- در کدام وضعیت احتمال پارگی لیگامنت صلیبی قدامی (ACL) بیشتر است؟
- (۱) واروس زانو + چرخش داخلی درشت نی + خم شدن خیلی کم زانو
(۲) والگوس زانو + چرخش خارجی درشت نی + خم شدن خیلی کم زانو
(۳) واروس زانو + چرخش داخلی درشت نی + خم شدن زیاد زانو
(۴) والگوس زانو + چرخش خارجی درشت نی + خم شدن زیاد زانو
- ۶۷- منظور از «سه‌گانه وحشتناک» (terrible triad) در آسیب‌های ورزشی ناحیه زانو، کدام است؟
- (۱) آسیب لیگامنت صلیبی قدامی (ACL) + آسیب لیگامنت جانب داخلی (MCL) + آسیب منیسک خارجی
(۲) آسیب لیگامنت صلیبی خلفی (PCL) + آسیب لیگامنت جانب خارجی (LCL) + آسیب منیسک خارجی
(۳) آسیب لیگامنت صلیبی قدامی (ACL) + آسیب لیگامنت جانب داخلی (MCL) + آسیب منیسک داخلی
(۴) آسیب لیگامنت صلیبی خلفی (ACL) + آسیب لیگامنت جانب خارجی (LCL) + آسیب منیسک داخلی
- ۶۸- براساس مدل پیشگیری از آسیب «ون میشنل»، مرحله اول پیشگیری از آسیب‌های ورزشی کدام است؟
- (۱) شناسایی ریسک فاکتورهای آسیب
(۲) بررسی میزان شیوع و شدت آسیب
(۳) شناسایی اتیولوژی (سبب‌شناسی) آسیب
(۴) انتخاب و به‌کارگیری ابزار مناسب برای پیشگیری از آسیب
- ۶۹- احساس درد در زاویه دور شدن (Add) مفصل شانه از ۸۰ تا ۱۲۰ درجه و سقوط یکباره آن در حالت پایین آوردن شانه (Add)، نشانه کدام آسیب است؟
- (۱) پارگی کامل دلتوئید میانی
(۲) پارگی کامل سر دراز عضله دو سر بازویی
(۳) پارگی کامل عضله سوپرا اسپیناتوس (فوق خارجی)
(۴) پارگی کامل عضله تحت خاری (اینفرا اسپیناتوس)
- ۷۰- در چه مرحله‌ای از منحنی فشار - کشش، با افزایش نیرو، بافت تعییر شکل می‌یابد و با قطع نیرو، بافت به شکل اولیه خود برنمی‌گردد؟
- (۱) در نقطه تسلیم
(۲) در تعییر شکل الاستیکی
(۳) در نقطه بین تعییر شکل الاستیکی و پلاستیکی
- ۷۱- مدل پژوهشی پیشگیری از آسیب‌های ورزشی مربوط به چه کسی است؟
- (۱) ون میشنل (۲) گریفین
(۳) میوویس (۴) هادون
- ۷۲- آسیب «Turf toe» بیشتر در بازیکنان کدام رشته ورزشی رخ می‌دهد؟
- (۱) بسکتبال (۲) فوتبال (۳) والیبال (۴) هندبال

- ۷۳- در کدام حالت، پیچیدگی متدالو مج پا (خارجی) بیشتر اتفاق می‌افتد؟
- (۱) دورسی فلکشن - اورزن
 - (۲) دورسی فلکشن - اینورزن
 - (۳) پلاتنار فلکشن - اورزن
 - (۴) پلاتنار فلکشن - اینورزن
- ۷۴- در آسیب اسپوندیلویزیس حرکت کدام مهره ملاک تعیین جهت سُرخورد مهره است؟
- (۱) حرکت مهره بالایی نسبت به مهره پایینی
 - (۲) حرکت مهره پایینی نسبت به مهره بالایی
 - (۳) حرکت مهره بالایی نسبت به صفحه افقی (هوریزنتال)
 - (۴) حرکت مهره پایینی نسبت به صفحه ساجیتال (سهمی)
- ۷۵- به طور کلی پس از برداشتن گج در شکستگی‌های استخوانی، مدت زمان دوره توانبخشی باید چه مدت باشد؟
- (۱) دست کم برابر با زمان نگهداشتن عضو در گج
 - (۲) بیشتر از زمان نگهداشتن عضو در گج
 - (۳) کمتر از زمان نگهداشتن عضو در گج
 - (۴) برابر با زمان نگهداشتن عضو در گج
- ۷۶- کدام مورد مکانیسم غالب در آسیب‌دیدگی دیسک‌های بین مهره‌ای است؟
- (۱) چرخش به طرفین
 - (۲) خم کردن جانبی تنہ
 - (۳) خم شدن و چرخش به طرفین
 - (۴) بازشدن به عقب و چرخش به طرفین
- ۷۷- در عارضه «سندروم فشار داخلی درشت نی» معمولاً محل درد کدام قسمت است؟
- (۱) سر ثابت عضله خم‌کننده طویل انگشتان
 - (۲) قسمت خارجی عضله درشت نئی خلفی
 - (۳) لبه خلفی میانی عضله دوقلو
 - (۴) عضله نعلی
- ۷۸- بنکارت لیزن (Bankart lesion) کدام آسیب ورزشی شایع شانه است؟
- (۱) پارگی قسمت فوقانی گلنوتیید لاپروم
 - (۲) پارگی قسمت خلفی تحتانی گلنوتیید لاپروم
 - (۳) پارگی قسمت تحتانی گلنوتیید لاپروم
 - (۴) پارگی بخش قدامی تحتانی گلنوتیید لاپروم
- ۷۹- کدام تمرين در پیشگیری از استرین عضلات همسرتینگ مؤثر است؟
- (۱) پلانک (plank)
 - (۲) تاک جامپ (Tuck jump)
 - (۳) لانچ (Lunge)
 - (۴) نوردیک (Nordik)
- ۸۰- شایع‌ترین تاندون درگیر در عارضه تنیس البو (Tennis elbow) کدام است؟
- (۱) اکستنسور دیجیتروم
 - (۲) اکستنسور کاربی اولناریس
 - (۳) اکستنسور کاربی رادیالیس برویس
 - (۴) اکستنسور کاربی رادیالیس لانگوس

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

112F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌عتمدگز)