



256

F

: نام

: نام خانوادگی

: محل امضا

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تمکن‌گز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی زیست‌شناسی – فیزیولوژی گیاهی (کد ۲۲۲۰)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی
۱	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی گیاهی - سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ربخت‌شناسی - تشریح - ریخت‌زایی و اندام‌زایی) - جذب و انتقال در گیاهان - متابولیسم گیاهی - فتوسنتز)

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسقندمه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با تنفلیلین بابر مقررات رفتار می‌شود.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

256F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتمرکز)

فیزیولوژی گیاهی:

- ۱ گیاهان متعلق به کدام تیره گیاهی اباحت‌گشته‌گشته گوگرد هستند؟
۱) گندمیان ۲) شب‌بویان ۳) گلسرخیان ۴) پروانه آسائیان
- ۲ غشای پلاسمائی متشكل از دو لایه فسفولیپید خالص نسبت به کدام‌یک از مواد کاملاً نفوذ‌پذیر است؟
۱) اتانول ۲) K^+ ۳) گلوکز ۴) HPO_4^{2-}
- ۳ کدام عنصر در واکنش‌های اکسید و احیا و عملکرد کربوکسیک آنهیدراز دخالت دارد؟
۱) مس (Cu) ۲) نیکل (Ni) ۳) مولیبدن (Mo) ۴) روی (Zn)
- ۴ پمپ پروتونی ($H^+ - ATPase$) غشای پلاسمائی:
۱) با اتصال فوزیکوکسین به انتهای آمینی خود فعال می‌گردد.
۲) دارای شباهت ساختاری به پمپ پروتون تونوپلاستی است.
۳) با فسفریلاسیون فعال و با رفسفریلاسیون غیرفعال می‌شود.
۴) دارای ناحیه بازدارندگی در انتهای کربوکسیلی خود می‌باشد.
- ۵ انتقال آنتوکسیانین از عرض تونوپلاست توسط ناقلین ABC با صرف انرژی به شکل در اتصال با صورت می‌گیرد.
- ۶ کدام اسید آمینه در فعال‌سازی آنزیم رویسکو دخیل است؟
۱) لیزین ۲) سرین ۳) سیستئین ۴) آسپارتیک اسید
- ۷ ساختار فتوسیستمی سیانوباکترها مشابه ساختار فتوسیستمی کدام‌یک از موجودات فتوسنتزی زیر است؟
۱) گیاهان عالی ۲) باکتری‌های گوگردی سبز ۳) باکتری‌های غیر‌گوگردی ارغوانی ۴) باکتری‌های گوگردی ارغوانی
- ۸ در کدام واکنش، فسفریلاسیون اکسایشی در سطح گهرمایه رخ می‌دهد؟
۱) تبدیل مالات به اگزالواستات ۲) تبدیل ایزوسیترات به ۲-اگزوگلوتارات
۳) تبدیل سوکسینیل CoA به سوکسینات ۴) تبدیل پیرویک اسید به استیل
- ۹ کدام‌یک از هورمون‌های گیاهی به ترتیب در بسته شدن روزنه‌ها و در ریشه‌زانی دخالت می‌کنند؟
۱) سیتوکینین و اتیلن ۲) آبسیزیک اسید و اکسین ۳) زیبرلین و سیتوکینین ۴) ژاسمونات و اتیلن
- ۱۰ کدام‌یک از هورمون‌ها در تشکیل آثارنشیم در گیاهان تحت شرایط غرقابی دخالت دارد؟
۱) ژیبرلین ۲) اکسین ۳) اتیلن ۴) ژاسمونیک اسید

سیستماتیک گیاهی:

- ۱۱ میوه با دو - مریکارپ در کدام سرده (جنس) دیده می‌شود؟
Artemisia (۴) Anchusa (۳) Anthemis (۲) Anethum (۱)
- ۱۲ ویزگی‌های آپومورفیک (اشتقاقی) جگر واش‌ها (Liverworts) کدامند؟
۱) وجود روزنه و اجسام روغنی ۲) وجود ستونک (Columella) و التر ۳) وجود التر و اجسام روغنی (Oil bodies) مشخص
۴) وجود سرپوش (Operculum) و دندانه‌های پریستوم (Peristome teeth)

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۱۳- در کدام زوج سرده (جنس)‌های زیر تخدمان فوقانی است؟
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| Allium - Ruscus (۲) | Lilium - Iris (۱) |
| Galanthus - Narcissus (۴) | Ixiolirion - Ophrys (۳) |
- ۱۴- گیاه علفی آبزی با نهنج پهنه شده با برچه‌های منفرد فرو رفته در رأس و میوه فندقه و بیزگی کدام تیره گیاهی است؟
- | | |
|-------------------|------------------|
| Cabombaceae (۲) | Araliaceae (۱) |
| Nelumbonaceae (۴) | Nymphaeaceae (۳) |
- ۱۵- نوع گرده‌افشانی در تیره *Typhaceae* چگونه است؟
- | | |
|---------------|----------------|
| (۱) آنموفیلی | (۲) آتنموفیلی |
| (۳) هیدروفیلی | (۴) زوئیدوفیلی |
- ۱۶- کدام مورد نشانه‌ای از الگوی پراکنش باقیمانده (*relict*) در ایران محسوب می‌شود؟
- | | |
|---|--|
| (۱) افرای شبه چناری (<i>Pinus eldarica</i>) | (۲) کاج الدار (<i>Acer pseudoplatanus</i>) |
| (۳) درخت انگلی (<i>Olea europaea</i>) | (۴) زیتون (<i>Parrotica persica</i>) |
- ۱۷- کدام یک از آرایه‌های زیر، از عناصر اصلی و ثابت پوشش گیاهی بخش مرکزی ایران است؟
- | | | | |
|-------------|---------------|----------|------------|
| Quercus (۴) | Artemisia (۳) | Ilex (۲) | Acacia (۱) |
|-------------|---------------|----------|------------|
- ۱۸- کدام گروه از گیاهان آوندی کنونی ابتدایی‌تر است و گروه خواهری برای سایر گیاهان آوندی محسوب می‌شود؟
- | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Pteridophyta (۴) | Sphenophyta (۳) | Lycophyta (۲) | Psilophyta (۱) |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
- ۱۹- ابتدایی ترین سرده (جنس) گیاهی تک‌لپه‌ای کدام است؟
- | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Hydrocharis (۴) | Butomus (۳) | Alisma (۲) | Acorus (۱) |
|-----------------|-------------|------------|------------|
- ۲۰- کدام سرده از گلسرخیان (*Rosaceae*)، علفی هستند؟
- | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| Fragaria (۴) | Cotoneaster (۳) | Mespilus (۲) | Rubus (۱) |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|

تکوین گیاهی شامل (ریخت‌شناسی - تشریح - ریخت‌زایی و اندام‌زایی):

- ۲۱- مجاري ترشحی صمغ در کاج به چه صورت تشکیل می‌شوند؟
- | | | |
|------------|------------|----------------|
| (۱) اندوزن | (۲) لیزیزن | (۳) شیزولیزیزن |
| (۴) شیزوژن | | |
- ۲۲- در فرایند **Somatic embryogenesis** چه ساختارهایی تشکیل می‌شوند؟
- | | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| (۱) اندوسپرم | (۲) شبه رویان | (۳) سوسپانسور |
| (۴) رویان‌های تخمی | | |
- ۲۳- در مریستم‌های کناری، تقسیمات بیشتر از چه نوعی می‌باشد؟
- | | | |
|------------------|-----------|-----------|
| (۱) عرضی | (۲) شعاعی | (۳) مماسی |
| (۴) در تمام جهات | | |
- ۲۴- پدیده سیتوولوژیک آندوپلی پلوئیدی در کدام گروه گیاهی رایج است؟
- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| (۱) نهان‌زادانگان | (۲) سرخس‌ها | (۳) بازدانگان |
| (۴) نهان‌زادان آوندی | | |
- ۲۵- سلول‌های تشکیل دهنده کدام یک از لایه‌های بساک از نظر شکل، عملکرد و تعداد هسته تنوع را نشان می‌دهند؟
- | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Transitional layer (۴) | Endothecium (۳) | Epidermis (۲) | Tapetum (۱) |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|
- ۲۶- پایه کریستال‌های سیستولیت و دروس به ترتیب در قرار دارند.
- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| (۱) دیواره و دیواره | (۲) واکوئل و دیواره | (۳) دیواره و واکوئول |
| (۴) واکوئل و واکوئل | | |
- ۲۷- تانی‌ها در کدام یک از ساختارهای زیر ممکن است تجمع یابند؟
- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| (۱) دیواره و پلاست | (۲) واکوئل و دیواره | (۳) دیواره و سیتوزول |
| (۴) واکوئل و پلاست | | |

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۸- ژن‌های کد کننده زیر واحدهای کوچک و بزرگ آنزیم روبیسکو به ترتیب در کدام اندامک (اندامک‌ها) قرار دارند؟
- (۱) هسته - هسته
(۲) کلروپلاست - هسته
(۳) کلروپلاست - کلروپلاست
(۴) هسته - کلروپلاست
- ۲۹- کدام‌یک، از ویژگی‌های کلاتشیم است؟
- (۱) دیواره ثانویه - بافت مرکب - فقدان باززایی
(۲) دیواره اولیه - بافت ساده - قابلیت باززایی
(۳) دیواره ثانویه - بافت مرکب - قابلیت باززایی
(۴) دیواره اولیه - بافت ساده - فقدان باززایی
- ۳۰- در لیگنین بازدانگان، کدام مونومر با درصد بالای وجود دارد؟
- (۱) سیناپیک اسید
(۲) سیناپیل الکل
(۳) کونیفریل الکل
(۴) پاراکوماریل الکل

جذب و انتقال در گیاهان:

- ۳۱- در شرایطی که مقدار پتابسیم محیطی کم باشد، جذب آن از خلال غشاء پلاسمایی سلول‌های ریشه توسط کدام ناقل انجام می‌شود؟
- (۱) با یک کانال پتابسیم با گشودگی وابسته به ولتاژ
(۲) با یک پادیر پروتون / پتابسیم با میل ترکیبی پایین
(۳) با یک هم بر پروتون / پتابسیم، با میل ترکیبی بالا
(۴) با یک کانال پتابسیم با گشودگی وابسته به ADP ریبوز حلقی
- ۳۲- کدام‌یک در انتقال نیتروی کشنی به کانال‌های MS (حساس به تحریکات مکانیکی) مشارکت دارد؟
- (۱) پمپ پروتون
(۲) کانال‌های کلسیم
(۳) کانال گیرنده GABA
(۴) پروتئین‌های اینتگرین و فیبرونکتین
- ۳۳- سامانه انتقال با میل ترکیبی زیاد (High affinity transport system) برای جذب نیترات در کدام شرایط کار می‌کند و K_m آن در چه حدودی است؟
- (۱) غلظت زیاد نیترات ($> 1 \text{ mM}$) - آن در حد میکرومولار است.
(۲) غلظت کم نیترات ($< 1 \text{ mM}$) - آن در حد میکرومولار است.
(۳) غلظت کم نیترات ($< 1 \text{ mM}$) - آن در حد میلی‌مولار است.
(۴) غلظت زیاد نیترات ($> 1 \text{ mM}$) - آن در حد میلی‌مولار است.
- ۳۴- کدام گزینه در مورد کانال‌های درون بر پتابسیم (K_{in}) صحیح است؟
- (۱) با دیپلاریزاسیون غشایی باز می‌شوند.
(۲) دارای ۶ ناحیه تراغشاپی می‌باشند که به صورت تک پار (مونومر) عمل می‌کنند.
(۳) برخلاف کانال‌های برون بر (خارج کننده پتابسیم از سلول) قادر حسگر ولتاژ می‌باشند.
(۴) در حلقه مابین نواحی تراغشاپی S_5 و S_6 دارای فیلتر انتخاب می‌باشند.
- ۳۵- استوکیومتری عملکرد (هزینه پروتونی) کدام‌یک از پمپ‌های زیر از بقیه بیشتر است؟
- (۱) پمپ‌های نوع ABC
(۲) پمپ پروتونی کلاس V
(۳) پمپ پروتونی کلاس F
(۴) پمپ پروتونی کلاس P
- ۳۶- کدام آمینو اسید در محل تاخورده‌گی ساختار پلی‌پیتیدی کانال آکواپورین و دیگر تراپرها غشائی قرار دارد؟
- (۱) آسپارژین
(۲) پرولین
(۳) آلانین
(۴) هیستیدین

- ۳۷- کدام گزینه ترتیب صحیح قابلیت نفوذپذیری آپوپلاست را نسبت به کاتیون‌های قلیایی نشان می‌دهد؟
- $\text{Cs}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Li}^+$ (۲) $\text{Cs}^+ > \text{K}^+ > \text{Na}^+ > \text{Li}^+$ (۱)
 $\text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Cs}^+ > \text{Li}^+$ (۴) $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Cs}^+$ (۳)
- ۳۸- کدام یک از ناقل‌های پتانسیمی به عنوان همبر K^+ / H^+ عمل می‌کند؟
- HAK (۴) CPA (۳) HKT (۲) KUP (۱)
- ۳۹- در ساختار کدام یک از تراپرهای غشائی زیر ۶ مارپیچ تراغشائی وجود دارد؟
- (۱) آکواپورین پلاسمالمانی (۲) $\text{H}^+ - \text{ATPase}$ پلاسمالمانی
 (۳) تونوپلاستی (۴) کانال پتانسیمی نوع TPK
- ۴۰- کدام ترکیب راحت‌تر از بقیه ترکیبات از غشای لیپیدی عبور می‌کند؟
- (۱) اوره (۲) گلیسرول (۳) دی‌متیل اوره (۴) تری‌متیل سیترات
- ۴۱- نسبت کوپلینگ بین تراپری H^+ و هیدروولیز ATP در پمپ‌های پروتون نوع V با کاهش pH واکوئیل:
- (۱) افزایش می‌یابد. (۲) کاهش می‌یابد. (۳) ثابت می‌ماند. (۴) به یک نزدیک می‌شود.
- ۴۲- فعالیت هیدروولیز ATP حساس به نیترات و مقاوم به وانادات و آزید مربوط به کدام پمپ پروتون است؟
- (۱) پیروفسفاتاز (۲) نوع F (۳) نوع P (۴) نوع V
- ۴۳- کنترل پس ترجمه‌ای ناقل نوع AMT آمونیوم چگونه صورت می‌گیرد؟
- (۱) از طریق بیان ایزوفرم‌های مختلف (۲) با استفاده از مدل پس‌گرد تنظیمی
 (۳) از طریق کربوکسیلاسیون / دکربوکسیلاسیون (۴) از طریق فسفریلاسیون / دفسفریلاسیون
- ۴۴- استوکیومتری عمومی برای ناقلان نوع ABC ATP به ازای هر ملکول سوبسترانی (گهرمایه) انتقال یافته است؟
- (۱) متناسب با نوع گهرمایه متغیر است. (۲) متناسب با سطح انرژی سلول متغیر است.
 (۳) دو ملکول ATP به ازای هر ملکول گهرمایه (۴) چهار ملکول ATP به ازای هر ملکول گهرمایه
- ۴۵- نمودار سینتیک جذب ساکاراز توسط پروتوبلاست لپه‌های سویا در غلظت 10 mM اشباع می‌شود و در غلظت‌های بالاتر خطی است. در صورت استفاده از سموم متابولیکی چه اتفاقی می‌افتد؟
- (۱) بخش خطی نمودار متوقف شده ولی بخش قابل اشباع واکنشی نشان نمی‌دهد.
 (۲) بخش قابل اشباع نمودار متوقف شده ولی بخش خطی واکنشی نشان نمی‌دهد.
 (۳) هردو بخش نمودار متوقف می‌شوند.
 (۴) هیچ‌یک از دو بخش نمودار واکنش نشان نمی‌دهند.
- ۴۶- کدام پدیده یا مکانیسم، ترکیب متفاوت شیره عنصر آبکشی را از بافت‌های پیرامون آوند آبکش در گیاهانی با بارگیری سیمپلasmی توجیه می‌کند؟
- (۱) عملکرد آنزیم اینورتاز
 (۲) نقش مکانیسم به دام اندازی پلیمرها
 (۳) نقش انتخاب‌پذیری اختصاصی ناقل همبرساکاروز - پروتون
 (۴) مصرف و متابولیسم متفاوت قندها در عنصر آبکشی و سلول‌های اطراف

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۷- در بافت فرآوردهای کربنی توسط باکتروئید از گیاه میزان در محل غشاء سیمبیوزوم به چه شکلی و از طریق چه انتقال دهندهای انجام می‌شود؟
- (۱) به شکل اسید آلی از طریق ناقل کربوکسیلات‌ها
 - (۲) به شکل ساکاروز و از طریق همیر ساکاروز / پروتون
 - (۳) به شکل ترکیبات قندی بزرگ و از طریق تلمبه‌های ABC
 - (۴) به شکل گلوکز -۶- فسفات و از طریق همیر هگزوز / پروتون
- ۴۸- کدام گزینه در مورد انتقال دهنده‌های NH₄ و SOS1 به ترتیب صادق است؟
- (۱) پادر واکوئلی سدیم و پادر غشاء پلاسمائی سدیم
 - (۲) پادرهای کاتیونی غشاء پلاسمائی و پادر واکوئلی سدیم
 - (۳) کانال‌های انتخابگر ضعیف پتانسیم در تونوپلاست و هم بر سدیم غشاء پلاسمائی
 - (۴) تبادل کننده‌های سدیم / پتانسیم غشاء پلاسمائی و ناقل مؤثر در انباستگی سدیم در واکوئل و تحمل شوری
- ۴۹- ناقل Pi/G-6-P در غشاء کدام پلاستیدها و در چه کارکردی نقش دارد؟
- (۱) در پلاستیدهای سلول‌های دانه گندمیان و در سنتز نشاسته
 - (۲) در پلاستیدهای سلول‌های ذخیره‌ای دو لپهایها و در سنتز نشاسته
 - (۳) در پلاستیدهای سلول‌های غلاف آوندی گیاهان C₄ و برای تداوم چرخه احیائی
 - (۴) در پلاستیدهای سلول‌های مزووفیل گیاهان C₄ و برای تداوم چرخه احیائی
- ۵۰- جریان‌های یونی FV و SV به ترتیب در کدام بخش از سلول وجود داشته و چه ویژگی‌هایی دارند؟
- (۱) در جریان‌های آنیونی به ترتیب سریع و کند در غشاء پلاسمائی و نقش آن‌ها به ترتیب وارد کردن به سلول و خروج از آن است.
 - (۲) در جریان‌های یونی تونوپلاستی و غشای پلاسمائی که بی‌تفاوت نسبت به کاتیون‌ها و آنیون‌ها بوده و هم در خروج و هم ورود نقش دارند.
 - (۳) در جریان‌های کاتیونی به ترتیب سریع و کند در تونوپلاست و نقش آن‌ها به ترتیب وارد کردن به واکوئل و خروج از آن است.
 - (۴) در جریان‌های غیر انتخابگر یونی برای کاتیون‌ها در تونوپلاست و نقش آن‌ها در خارج کردن از واکوئل و ورود به آن است.
- ۵۱- شکل غالب انتقال آهن در آوند چوب و آبکش در گیاهان استراتژی I به ترتیب:
- (۱) آهن III - فیتوسیدروفور - آهن II - نیکوتیانامین (۲) آهن II - سیترات - آهن III - نیکوتیانامین
 - (۳) آهن III - نیکوتیانامین - آهن II - فیتوسیدروفور (۴) آهن III - سیترات - آهن II - نیکوتیانامین
- ۵۲- کانال‌های SKOR و SPIK به ترتیب چه نوع کانال‌هایی هستند؟
- (۱) کانال‌های شیکر واردکننده پتانسیم و کانال‌های شیکر خارجکننده پتانسیم
 - (۲) کانال‌های واردکننده کلسیم به سیتوسل و کانال‌های خارجکننده پتانسیم از سیتوسل
 - (۳) کانال‌های فعال‌شونده با دی‌پلاربیزاسیون و کانال‌های غیرانتخابگر وابسته به ولتاژ
 - (۴) کانال‌های غیرانتخابگر وابسته به ولتاژ و کانال‌های فعال‌شونده با دی‌پلاربیزاسیون
- ۵۳- انباستگی نیترات در واکوئل سلول‌های ریشه به هنگام عرضه مازاد این یون توسط چه انتقال دهنده‌ای انجام می‌شود؟
- NRT2 (۲)
- NRT1 (۱)
- R-type (۴)
- CLCa (۳)

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

۵۴- ورود بور (B) به سلول‌ها و خروج آن از سلول‌ها به چه شکل و با چه انتقال‌دهنده‌هایی انجام می‌شود؟

- (۱) ورود به شکل $\bar{B(OH)}$ توسط $NIP_{5,1}$ و خروج به شکل $H_7BO_3^-$ از طریق BOR_1
- (۲) ورود به شکل $H_7BO_3^-$ توسط BOR_1 و خروج به شکل $\bar{B(OH)}$ از طریق $NIP_{5,1}$
- (۳) ورود به شکل $\bar{B(OH)}$ توسط BOR_1 و خروج به شکل $H_7BO_3^-$ از طریق $NIP_{5,1}$
- (۴) ورود به شکل $\bar{B(OH)}$ توسط $NIP_{5,1}$ و خروج به شکل $H_7BO_3^-$ از طریق BOR_1

متابولیسم گیاهی:

۵۵- در رابطه با سرعت واکنش‌های آنزیمی کدام جمله صحیح است؟

- (۱) سرعت اولیه یک واکنش آنزیمی وابسته به غلظت آنزیم است.
- (۲) در دماهای بالا، سرعت واکنش آنزیمی از قانون آربیوس پیروی می‌کند.
- (۳) آنزیم‌های محدود‌کننده میزان در غلظت‌های بسیار کم سرعت واکنش را تغییر می‌دهند.
- (۴) سرعت ماکزیمم یک واکنش آنزیمی در حضور بازدارنده‌های نارقاوی ثابت می‌ماند.

۵۶- کدام گزینه ویژگی‌های یک آنزیم آلوستریک اولیگومری را نشان می‌دهد؟

- (۱) در شرایط $\frac{1}{V_{max}}$ ، تغییرات ساختاری پروتومرها مستقل از هم است.
- (۲) در شرایط $[S] \gg K_m$ ، سرعت واکنش آنزیمی به صورت نمایی افزایش می‌یابد.
- (۳) اثرکننده‌های مثبت سیگموئیدی بودن منحنی سرعت را در $[S]$ بالاتر تشیدید می‌کند.
- (۴) با اتصال اثرکننده منفی به یک زیر واحد، ثابت اتصال S به زیر واحدهای دیگر به‌طور پی‌درپی تغییر می‌کند.

۵۷- در محدوده فیزیولوژیکی pH، شکل پروتون دار شده کدام آمینو اسید در سازوکار کاتالیز بازی آنزیم‌ها مشارکت دارد؟

- (۱) آمونیوم در لیزین
- (۲) فلن در تیروزین
- (۳) تیول در سیستئین
- (۴) ایمیدازول در هیستیدین

۵۸- کدام یک از ترکیبات زیر از طریق مهار فعالیت پیروات دهیدروژناز، گردش مواد را به سمت چرخه سیتریک اسید تنظیم می‌کند؟



۵۹- فعالیت ایزوزیم کلروپلاستی گلوتامین سنتتاز به چه کوفاکتور فلزی وابسته است و سطح بیان ژن آن تحت تأثیر چه عاملی است؟

- (۱) Cu^{2+} ، نور
- (۲) Zn^{2+} ، کربوهیدرات‌ها
- (۳) Mn^{2+} ، نور
- (۴) Ni^{2+} ، کربوهیدرات‌ها

۶۰- آنزیم کلیدی در مسیر بیوستز نشاسته چه نام دارد و فعالیت آن چگونه تنظیم می‌شود؟

- (۱) UDP - گلوکز پیروفسفیریلاز، در آمیلوبلاست دانه‌ها در سطح رونوشت برداری تنظیم می‌شود.
- (۲) ADP - گلوکز پیروفسفیریلاز، در کلروپلاست توسعه تراز P_i تنظیم می‌شود.
- (۳) UDP - گلوکز پیروفسفیریلاز، در کلروپلاست سلول‌های مزوپلیل توسعه تراز $PGA-3$ به P_i تنظیم آلوستریک می‌شود.

(۴) ADP - گلوکز پیروفسفیریلاز، در سیتوسل سلول ریشه و به سطح $PGA-3$ سیتوسلی وابسته است.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۶۱- کدام عبارت در رابطه با نحوه تنظیم فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز صحیح است؟
- (۱) یک فلاوپروتئین است که در نور فعالیت آن توسط پروتئین فسفاتازها مهار می‌شود.
 - (۲) یک پروتئین هترودیمری است که فعالیت آن محدود به پلاستها در سلول‌های ریشه است.
 - (۳) یک مولبیدوفلاوپروتئین است که فعالیت آن در سطح رونوشت برداری توسط محتوای کربوهیدراتی سلول تنظیم می‌شود.
 - (۴) یک مولبیدوفلاوپروتئین است که فعالیت آن در نتیجه فسفریلاسیون در نور توسط یک کیناز وابسته به کلسیم افزایش می‌باشد.
- ۶۲- احیای سولفات در APS توسط چه آنزیمی و با کمک چه ترکیبی به عنوان عامل احیاکننده انجام می‌شود؟
- (۱) PAPS - ردوکتاز، گلوتاتیون احیا شده
 - (۲) APS - ردوکتاز، گلوتاتیون احیا شده
 - (۳) PAPS - ردوکتاز، فردوسکین احیا شده
 - (۴) APS - ردوکتاز، فردوسکین احیا شده
- ۶۳- تشکیل سولفات فعال (APS) در گیاهان توسط چه آنزیمی کاتالیز می‌شود و در چه کده سلولی فعالیت دارد؟
- (۱) ATP - سولفوترانسفراز - سیتوسل
 - (۲) APS - سولفوترانسفراز - سیتوسل
 - (۳) ATP - سولفوریلаз - پلاستیدها
 - (۴) APS - سولفوترانسفراز - کلروپلاستها
- ۶۴- کمپلکس کلسیم - کالmodولین به عنوان زیرواحد تنظیمی بسیاری از پروتئین‌ها از طریق کدام یک از روش‌های زیر سبب فعال شدن آن‌ها می‌شود؟
- (۱) رفع خودمهاری در جایگاه فعال آنزیم
 - (۲) تسهیل فسفریلاسیون باقیمانده‌های آمینواسیدی در جایگاه فعال آنزیم
 - (۳) تغییر پیکربندی آنزیم و تسهیل اتصال اثر کننده به جایگاه آلوستریک
 - (۴) تسهیل بر هم کنش زیرواحدها و افزایش میل ترکیبی آن‌ها برای اتصال به گهرمايه
- ۶۵- در سازوکار کاتالیز کووالان، کدام گزینه معرف تشکیل مولله حدواتست گذار است؟
- (۱) کاهش تغییرپذیری گهرمايه برای اتصال به آنزیم یا کوآنزیم
 - (۲) اتصال کووالان کوآنزیم و گهرمايه در جایگاه فعال
 - (۳) پروتئولیز اختصاصی و تغییر پیکربندی آنزیم برای اتصال به گهرمايه
 - (۴) اتصال کووالان یک گروه هسته خواه یا الکترون خواه به کوآنزیم
- ۶۶- گهرمايه آنزیم استارج سنتاز چیست و این آنزیم آن را به چه بخشی از پیش‌ساز گلوکانی متصل می‌کند؟
- (۱) ADP - گلوکز - انتهای غیراحیاء کننده
 - (۲) UDP - گلوکز - انتهای غیراحیاء کننده
 - (۳) ADP - گلوکز - انتهای احیاء کننده
 - (۴) UDP - گلوکز - انتهای احیاء کننده
- ۶۷- فروکتوز ۲ و ۶ - بیس فسفات فعال کننده کدام آنزیم می‌باشد؟
- (۱) ساکاروزفسفات سنتاز
 - (۲) فسفوفروکتوکیناز وابسته به ATP
 - (۳) فروکتوز ۱ و ۶ - بیس فسفاتاز پلاستیدی
 - (۴) فسفوفروکتوکیناز وابسته به پیروفسفات
- ۶۸- کدام یک از ناقلين زیر در آزادسازی کلسیم از شبکه آندوبلاسمی به درون سیتوسل در پاسخ به محرك نقش دارد؟
- (۱) کانال‌های دروازه‌ای با ADP ریبوز حلقوي
 - (۲) Ca^{2+} -ATPases
 - (۳) کانال‌های دروازه‌ای با نوکلوتوتیدهای حلقوي
 - (۴) پمپ‌های ACA
- ۶۹- در مسیر پاسخ تحمل به تنش شوری در گیاهان کدام یک از پروتئین‌های زیر به عنوان یک پروتئین مشابه کلسی‌نورین B و حسگر کلسیم نقش دارد؟
- (۱) CAX1
 - (۲) SOS2
 - (۳) SOS3
 - (۴) CaM

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۷۰ - نیتریک اکساید (NO) به عنوان یک مولکول علامتی از طریق کدام یک از مسیرهای زیر در تنظیم متابولیسم و پاسخ سلولی به محركها نقش دارد؟
- (۱) نیتراسیون عوامل رونویسی که یک فرایند پس ترجمه‌ای قابل برگشت است.
(۲) S - نیتروزیلاسیون پروتئین‌ها که یک فرایند پس ترجمه‌ای قابل برگشت است.
(۳) S - نیتروزیلاسیون پروتئین‌ها که یک فرایند پس ترجمه‌ای غیرقابل برگشت است.
(۴) الزاماً از طریق افزایش تولید ROS ها و بهویژه H_2O_2 و $ONOO^-$ (رادیکال پراکسی نیتریت)
- ۷۱ - کدام جمله زیر در رابطه با کوآنزیم‌ها صحیح است؟
- (۱) معمولاً مولکول‌های آلی بزرگی هستند که محکم به بخش هلوآنژیم متصل می‌شوند.
(۲) معمولاً مولکول‌های غیرآلی کوچکی هستند که محکم به بخش آپوآنژیم متصل می‌شوند.
(۳) معمولاً مولکول‌های آلی بزرگی هستند که به صورت سست به بخش هلوآنژیم متصل می‌شوند.
(۴) معمولاً مولکول‌های غیرآلی کوچکی هستند که به صورت سست به بخش هلوآنژیم متصل می‌شوند.
- ۷۲ - فعالیت آنزیم‌های آمیلاز و L - آمینواسیداکسیدازها به ترتیب کدام یک از ویژگی‌های اختصاصی آنزیم‌ها را نشان می‌دهد؟
- (۱) ویژگی پیوند - ویژگی ایزومری (نوری) (۲) ویژگی پیوند - ویژگی فضایی
(۳) ویژگی سوبسترا (گهرمايه) - ویژگی ایزومری (نوری) (۴) ویژگی سوبسترا (گهرمايه) - ویژگی فضایی
- ۷۳ - در کدام شرایط شکل منحنی اشباع گهرمايه ای یک آنزیم آلوستریک هذلولی می‌شود؟
- (۱) اثرکننده یک مهار کننده باشد (آلوستریسم ناجورگرا)
(۲) بین زیر واحدهای آن تعاظنیت وجود نداشته باشد.
(۳) اثرکننده همان گهرمايه باشد (آلوستریسم جورگرا)
(۴) اثرکننده شرایط را برای تبدیل حالت R آنزیم به حالت T آن فراهم کند.
- ۷۴ - کدام یک از ترکیبات زیر در نتیجه فعالیت آنزیم ترانس آلدولاز طی مسیر پنتوزفسفات اکسیداتیو به وجود می‌آید؟
- (۱) ریبوز ۵ - فسفات (۲) فروکتوز ۶ - فسفات
(۳) گلیسرآلدئید ۳ - فسفات (۴) سدوهپتولوز ۷ - فسفات
- ۷۵ - کدام عامل می‌تواند سبب مهار آسپاراژین سنتیتاز گردد؟
- (۱) کاهش ذخیره کربوهیدرات (۲) تاریکی
(۳) مقداری سمی آمونیاک (۴) نور
- ۷۶ - کدام یک از سازوکارهای تنظیمی زیر در چرخه کالوین وابسته به نور نمی‌باشد؟
- (۱) احیای پیوند دی‌سولفید در آنزیم ۳ - فسفوگلیسرات کیناز از طریق سیستم تیبوردوکسین
(۲) تحریک تشکیل اجتماع آنزیمی بین فسفروریبوکیناز و گلیسر آلدئید فسفات دهیدروزناز
(۳) فسفریلاسیون آنزیم روپیسکواکتیواز
(۴) رفع مهار فعالیت روپیسکو توسط RUBP و کاربامیلاسیون آن

فتوصیت:

- ۷۷ - کدام لیپید در غشاء‌های کلروپلاستی بیشتر یافت می‌شود؟

- (۱) اسفنگولیپیدها
(۲) فسفاتیدیل کولین
(۳) فسفاتیدیل اتانول آمین
(۴) گالاکتوزیل دی‌آسیل گلیسرول‌ها

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۷۸- در رابطه با مکانیسم عمل پاراکوآت کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) با تسريع شکست آب موجب تشکیل اکسیژن فعال می‌شود.
 - (۲) انتقال الکترون بین Q_A و Q_B را در PSII مسدود می‌کند.
 - (۳) با دریافت الکترون از PSI موجب تشکیل سوبراکسید می‌شود.
 - (۴) از طریق رقابت برای اتصال به پلاستوکوئینون جریان الکترونی را متوقف می‌کند.
- ۷۹- کدام یک از عبارات زیر در مورد فتوسنتر در باکتری‌های ارغوانی گوگردی صدق می‌کند؟
- (۱) پلی‌پپتیدهای L و M مرکز واکنش، همولوگ D_1 و D_2 هستند.
 - (۲) تحریک نوری باکتریبوردوپسین منجر به ورود پروتون و سنتز ATP می‌گردد.
 - (۳) جذب نور توسط باکتریبوردوپسین باعث شارش الکترونی می‌گردد.
 - (۴) تابش پرتوهای نور قرمز به غشاء باکتری با تغییر قابل برگشت pH محیط همراه است.
- ۸۰- کدام یک از واکنش‌های زیر یک مرحله کلیدی در مسیر بیوسنتر کاروتونوئیدها است؟
- (۱) تولید کاروتون‌ها از ترانس - لیکوپین از طریق لیکوپین سیکلازها
 - (۲) غیراشبع‌سازی فیتوئن به زتا - کاروتون توسط فیتوئن دسچوراز
 - (۳) غیراشبع‌سازی زتا - کاروتون به سیس - لیکوپین از طریق زتا - کاروتون دسچوراز
 - (۴) ایزومریزاسیون نوری سیس - لیکوپین به ترانس - لیکوپین توسط کاروتونوئید ایزومراز
- ۸۱- سنتز ۵-آمینولولوئینیک اسید در تاریکی چگونه تنظیم می‌شود؟
- (۱) از طریق اثر مهاری هم به عنوان بازدارنده آلوستراتیک آنزیم گلوتامیل - tRNA ردوکتاز
 - (۲) از طریق برهم‌کنش فراورده زن‌های FLU با آنزیم Mg - کلاتاز
 - (۳) از طریق برهم‌کنش فراورده زن‌های FLU با آنزیم گلوتامیل - tRNA ردوکتاز
 - (۴) از طریق انباست پروتوکلروفیلید در نتیجه کاهش فعالیت پروتوکلروفیلید اکسیدوردوکتاز
- ۸۲- محل سنتز درون سلولی پروتوبورفیرین IX و کلروفیل a به ترتیب کدامند؟
- (۱) بستره - غشاء‌های تیلاکوئیدی
 - (۲) هر دو در غشاء‌های تیلاکوئیدی
 - (۳) بستره - غشاء پوش کلروپلاستی
 - (۴) هر دو در غشاء پوش کلروپلاستی
- ۸۳- آنزیم اوروپورفیرینوزن کوستنار کدام یک از واکنش‌های زیر را در مسیر بیوسنتر کلروفیل‌ها کاتالیز می‌کند؟
- (۱) چرخش حلقه چهارم تترابیرون
 - (۲) دامیناسیون پورفوبیلینوزن‌ها
 - (۳) بهم‌پیوستگی منظم سر به دم PBG
 - (۴) دکربوکسیلاسیون باقیمانده‌های پروپیونیل در حلقه‌های پیرولی
- ۸۴- در کدام یک از شرایط زیر محصول کوآنتموئی فتوسنتر گیاهان C₄ بیش از گیاهان C₃ است و به چه دلیل؟
- (۱) در دماهای بالا و یا غلظت‌های کم CO₂ به دلیل افزایش واکنش کربوکسیلازی رو بیسکو
 - (۲) در دماهای بالا و یا غلظت‌های کم CO₂ به دلیل کاهش واکنش‌های تنفس نوری
 - (۳) در دماهای بالا و یا غلظت‌های زیاد CO₂ به دلیل کاهش واکنش اکسیژن‌نازی رو بیسکو
 - (۴) در شدت‌های بالای نور و یا غلظت‌های زیاد CO₂ به دلیل افزایش واکنش کربوکسیلازی رو بیسکو

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۸۵ - گیاهان C_4 برای تثبیت یک مولکول CO_2 چند مولکول ATP و چند مولکول NADPH, H^+ نیاز دارند؟
(۱) ۳ مولکول ATP و ۲ مولکول NADPH, H^+ (۲) ۵ مولکول ATP و ۱۲ مولکول NADPH, H^+
(۳) ۵ مولکول ATP و ۲ مولکول NADPH, H^+ (۴) ۶ مولکول ATP و ۱۲ مولکول NADPH, H^+
- ۸۶ - کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با ویژگی‌های کلروپلاست سلول‌های مزوپلیل گیاهان C_4 صدق می‌کند؟
(۱) فعالیت کم PSII و تعداد زیاد دانه‌های نشاسته
(۲) تعداد کم تیلاکوئیدهای گرانومی و عدم وجود رو بیسکو
(۳) فعالیت زیاد PSII و عدم وجود دانه‌های نشاسته
(۴) غلظت زیاد رو بیسکو و ساختارهای تیلاکوئید گرانومی توسعه یافته
- ۸۷ - کدام گزینه در رابطه با نقش Cytb₅₅₉ در فتوسنتز صحیح است؟
(۱) دخالت در بازدارندگی نوری تحت نور شدید (۲) تسريع حرکت الکترون در اطراف PSI
(۳) مشارکت در انتقال الکترون در طرف احیا کننده PSII (۴) دخالت در فسفوریلاسیون و جابه‌جایی LHCIIb
- ۸۸ - کدام جمله در مورد Cytb_f صحیح است؟
(۱) انتقال الکترون به Cytb HP در سطح روزنی صورت می‌گیرد.
(۲) زیروحد IV در این کمپلکس یک پلی‌پپتید تراغشاپی فاقد عمل ردوكس است.
(۳) دیمرهای Cytb_f فقط در تیلاکوئیدهای گرانومی وجود دارند.
(۴) باقیمانده هیستیدین Cytf در سطح روزنی موجب تسهیل انتقال الکترون به PC می‌شوند.
- ۸۹ - NADP - مالات دهیدروژناز در گیاهان C_4 چگونه تنظیم می‌شود؟
(۱) غیرفعال شدن از طریق دفسفریلاسیون توسط یک فسفاتاز در شب
(۲) فعال شدن از طریق فسفریلاسیون توسط یک کیناز در روز
(۳) غیرفعال شدن از طریق احیا توسط سیستم تیوردوکسین در شب
(۴) فعال شدن از طریق احیا توسط سیستم تیوردوکسین در روز
- ۹۰ - در زیرگروه PEP - کربوکسی‌کینازها در گیاهان C_4 CO₂ لازم برای تثبیت در چرخه کالوین در نتیجه کربوکسیلاسیون چه اسید آلی حاصل می‌شود و محل دکربوکسیلاسیون در چه کده سلولی است؟
(۱) آسپارتات - میتوکندری سلول غلاف آوندی (۲) اکسالواتات - سیتوسل سلول غلاف آوندی
(۳) آسپارتات - سیتوسل سلول غلاف آوندی (۴) اکسالواتات - کلروپلاست سلول غلاف آوندی
- ۹۱ - تنظیم فعالیت آنزیم PEP - کربوکسیلاز در گیاهان CAM چگونه انجام می‌شود؟
(۱) دفسفریلاسیون توسط یک فسفاتاز در شب و غیرحساس شدن به مالات
(۲) دفسفریلاسیون توسط یک فسفاتاز در شب و افزایش حساسیت آن به اثر مهاری گلوکز - ۶ - فسفات
(۳) دفسفریلاسیون توسط یک فسفاتاز در روز و افزایش حساسیت آن به اثر مهاری گلوکز - ۶ - فسفات
(۴) دفسفریلاسیون توسط یک کیناز در شب و افزایش حساسیت آن به اثر فعال کنندگی گلوکز - ۶ - فسفات
- ۹۲ - کدام یک از پروتئین‌های زیر توسط ژنوم هسته‌ای رمزگذاری شده و دارای خوش Fe^{2+} - S^{2-} و بار سطحی منفی است?
(۱) FdA (۲) فردوسکین (۳) رینسک (۴) PSaA

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

256F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام‌کن)

۹۳- در رابطه با ساختار و عملکرد آنزیم رو بیسکو کدام گزینه صحیح است؟

(۱) یون‌های Mg باعث پایداری واکنش کاربامیلی شدن آنزیم می‌شود.

(۲) زیروحد بزرگ دارای اینترون‌های متعدد و متنوع است.

(۳) زیروحد بزرگ دارای جایگاه کاتالیزوری در ناحیه C - ترمینال با ساختار شبکه‌ای است.

(۴) CO₂ گهرمایه‌ای از طریق اتصال به گروه آمینوی اپسیلون لیزین باعث فعال شدن آنزیم می‌گردد.

۹۴- چرا در نور شدید واکنش مهله افزایش می‌یابد؟

(۱) با تخریب پروتئین D₁, منبع پروتون برای کاهیدگی NADP⁺ از بین می‌رود.

(۲) P680 برانگیخته با اکسیژن مولکولی واکنش نموده و رادیکال سوپراکسید تولید می‌کند.

(۳) P700⁺ با قدرت اکسیدکنندگی بالاتر، تولید اکسیژن یکتاپی برانگیخته را تحریک می‌کند.

(۴) با کاهش نسبت NADPH, H⁺ به اکسیژن مولکولی، رادیکال سوپراکسید تولید می‌شود.

۹۵- کدام یک از ترکیبات زیر به عنوان شناساگر واکنش مهله عمل می‌کنند؟

(۱) PMS (۲) پیوسیانین (۳) FMN (۴) ویولوزن

۹۶- برای همگام‌سازی مراکز آزادسازی اکسیژن در فتوسیستم II به حالت S₁ چه باید کرد؟

(۱) سازش کلروپلاست‌ها به یک دوره کوتاه‌مدت تاریکی

(۲) تابش رخش‌های شدید نور به مدت ۱۰^{-۵} ثانیه

(۳) کاربرد شناساگرهای NH₃OH در غلظت پایین

(۴) تابش رخش‌های اشباع شده نور به مدت طولانی

۹۷- در هنگام تابش نور شدید، برای توزیع مناسب انرژی بین دو فتوسیستم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

(۱) تخریب پلی‌پتید D₁ و کاهش بارهای منفی سطحی در LHCII

(۲) فعال شدن یک فسفاتاز برای تسهیل جایه‌جایی آتن‌های بیرونی PSII

(۳) تخریب مولکول‌های مرکز واکنش PSII برای کاهش ترافرستی انرژی به PSI

(۴) فعال شدن یک سرین - ترئونین کیناز برای فسفوریل‌اسیون انتهای آمینوی LHCII

۹۸- کدام زیروحد از آنزیم ATP سنتاز توسط ژنوم هسته رمزسازی می‌شود؟

(۱) α (۲) β (۳) ε (۴) δ

۹۹- تنظیم عملکرد ATP سنتاز کلروپلاستی توسط نور به واسطه تیوردوکسین روى کدام زیروحد اعمال می‌گردد؟

(۱) زیروحد α (۲) زیروحد β (۳) زیروحد γ (۴) زیروحد δ

۱۰۰- در شدت‌های نوری بالا کدام یک از فرایندهای زیرنقش عمدی را در حفاظت کلروپلاست‌ها در برابر صدمات نوری

ایفا می‌کند؟

(۱) اپوکسیداسیون ویولاگرانتین به زاگزانتین در نتیجه اسیدی شدن لومن و خاموش‌سازی انرژی برانگیختگی

(۲) جلوگیری از تولید اکسیژن یکتاپی برانگیخته با مصرف O₂ در استروما از طریق اپوکسیداسیون زاگزانتین

(۳) اپوکسیداسیون زاگزانتین به ویولاگرانتین در نتیجه قلیابی شدن استروم و خاموش‌سازی انرژی برانگیختگی کلروفیل

(۴) جلوگیری از تولید اکسیژن یکتاپی برانگیخته با مصرف O₂ در لومن از طریق اپوکسیداسیون ویولاگرانتین