

258

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



258F

صبح جمعه  
۱۳۹۵/۱۲/۶  
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی  
دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی زیست‌شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی  
(کد ۲۲۲۲)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی گیاهی - سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت‌شناسی - تشریح - ریخت‌زایی و اندام‌زایی) - تشریح گیاهان آوندی - یاخته‌شناسی و بافت‌شناسی گیاهی مقایسه‌ای - زیست‌شناسی تکوینی گیاهی)	تعداد سوال	از شماره تا شماره
۱	۱	۱۰۰	۱۰۰	

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حلقی و حلقوی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر عقوبات رفتار می‌شود.

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

## فیزیولوژی گیاهی:

- ۱ گیاهان متعلق به کدام تیره گیاهی اباحت کننده گوگرد هستند؟  
۱) گندمیان ۲) شببویان ۳) گلسرخیان ۴) پروانه آسائیان
- ۲ غشای پلاسمائی مت Shankل از دو لایه فسفولیپید خالص نسبت به کدامیک از مواد کاملاً نفوذپذیر است؟  
۱) اتانول ۲)  $K^+$  ۳) گلوکز ۴)  $HPO_4^{2-}$
- ۳ کدام عنصر در واکنش‌های اکسید و احیا و عملکرد کربونیک آنهیدراز دخالت دارد؟  
۱) مس (Cu) ۲) نیکل (Ni) ۳) مولیبدن (Mo) ۴) روی (Zn)
- ۴ پمپ پروتونی ( $H^+ - ATPase$ ) غشای پلاسمائی:  
۱) با اتصال فوزیکوکسین به انتهای آمینی خود فعال می‌گردد.  
۲) دارای شباهت ساختاری به پمپ پروتون تونوپلاستی است.  
۳) با فسفریلاسیون فعال و با رفسفریلاسیون غیرفعال می‌شود.  
۴) دارای ناحیه بازدارندگی در انتهای کربوکسیلی خود می‌باشد.
- ۵ انتقال آنتوکسیانین از عرض تونوپلاست توسط ناقلین ABC با صرف انرژی به شکل ..... در اتصال با ..... صورت می‌گیرد.
- ۶ کدام اسید آمینه در فعال‌سازی آنزیم رویسکو دخیل است؟  
۱) لیزین ۲) سرین ۳) سیستئین ۴) آسپارتیک اسید
- ۷ ساختار فتوسیستمی سیانوباکترها مشابه ساختار فتوسیستمی کدامیک از موجودات فتوسنتزی زیر است؟  
۱) گیاهان عالی ۲) باکتری‌های گوگردی سبز ۳) باکتری‌های گوگردی ارغوانی ۴) باکتری‌های غیر گوگردی ارغوانی
- ۸ در کدام واکنش، فسفریلاسیون اکسایشی در سطح گهرمایه رخ می‌دهد؟  
۱) تبدیل مالات به اگزالواستات ۲) تبدیل ایزوسیترات به ۲-اگزوگلوتارات  
۳) تبدیل سوکسینیل CoA به سوکسینات ۴) تبدیل پیرویک اسید به استیل
- ۹ کدامیک از هورمون‌های گیاهی به ترتیب در بسته شدن روزنه‌ها و در ریشه‌زانی دخالت می‌کنند؟  
۱) سیتوکینین و اتیلن ۲) آبسیزیک اسید و اکسین ۳) زیبرلین و سیتوکینین ۴) زامونات و اتیلن
- ۱۰ کدامیک از هورمون‌ها در تشکیل آثارنشیم در گیاهان تحت شرایط غرقابی دخالت دارد؟  
۱) زیبرلین ۲) اکسین ۳) اتیلن ۴) زامونیک اسید

## سیستماتیک گیاهی:

- ۱۱ میوه با دو - مریکارپ در کدام سرده (جنس) دیده می‌شود؟  
Artemisia (۴) Anchusa (۳) Anthemis (۲) Anethum (۱)
- ۱۲ ویزگی‌های آپومورفیک (اشتقاقی) جگر واش‌ها (Liverworts) کدامند؟  
۱) وجود روزنه و اجسام روغنی ۲) وجود ستونک (Columella) و التر ۳) وجود التر و اجسام روغنی (Oil bodies) مشخص  
۴) وجود سرپوش (Operculum) و دندانه‌های پریستوم (Peristome teeth)

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۱۳- در کدام زوج سرده (جنس)‌های زیر تخدمان فوقانی است؟
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Allium - Ruscus (۲)       | Lilium - Iris (۱)       |
| Galanthus - Narcissus (۴) | Ixiolirion - Ophrys (۳) |
- ۱۴- گیاه علفی آبزی با نهنج پهنه شده با برچه‌های منفرد فرو رفته در رأس و میوه فندقه و بیزگی کدام تیره گیاهی است؟
- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cabombaceae (۲)   | Araliaceae (۱)   |
| Nelumbonaceae (۴) | Nymphaeaceae (۳) |
- ۱۵- نوع گرده‌افشانی در تیره *Typhaceae* چگونه است؟
- |               |                |
|---------------|----------------|
| (۱) آنموفیلی  | (۲) آتنوموفیلی |
| (۳) هیدروفیلی | (۴) زوئیدوفیلی |
- ۱۶- کدام مورد نشانه‌ای از الگوی پراکنش باقیمانده (*relict*) در ایران محسوب می‌شود؟
- |   |  |
|---|--|
| (۱) افرای شبه چناری ( <i>Pinus eldarica</i> ) | (۲) کاج الدار ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) |
| (۳) درخت انگلی ( <i>Olea europaea</i> )       | (۴) زیتون ( <i>Parrotica persica</i> )       |
- ۱۷- کدام یک از آرایه‌های زیر، از عناصر اصلی و ثابت پوشش گیاهی بخش مرکزی ایران است؟
- |             |               |          |            |
|-------------|---------------|----------|------------|
| Quercus (۴) | Artemisia (۳) | Ilex (۲) | Acacia (۱) |
|-------------|---------------|----------|------------|
- ۱۸- کدام گروه از گیاهان آوندی کنونی ابتدایی‌تر است و گروه خواهری برای سایر گیاهان آوندی محسوب می‌شود؟
- |                  |                 |               |                |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Pteridophyta (۴) | Sphenophyta (۳) | Lycophyta (۲) | Psilophyta (۱) |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
- ۱۹- ابتدایی ترین سرده (جنس) گیاهی تک‌لپه‌ای کدام است؟
- |                 |             |            |            |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Hydrocharis (۴) | Butomus (۳) | Alisma (۲) | Acorus (۱) |
|-----------------|-------------|------------|------------|
- ۲۰- کدام سرده از گلسرخیان (*Rosaceae*)، علفی هستند؟
- |              |                 |              |           |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| Fragaria (۴) | Cotoneaster (۳) | Mespilus (۲) | Rubus (۱) |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|

## تکوین گیاهی شامل (ریخت‌شناسی - تشریح - ریخت‌زایی و اندام‌زایی):

- ۲۱- مجاري ترشحی صمغ در کاج به چه صورت تشکیل می‌شوند؟
- |            |            |                |
|------------|------------|----------------|
| (۱) اندوزن | (۲) لیزیزن | (۳) شیزولیزیزن |
| (۴) شیزوژن |            |                |
- ۲۲- در فرایند **Somatic embryogenesis** چه ساختارهایی تشکیل می‌شوند؟
- |                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| (۱) اندوسپیرم      | (۲) شبه رویان | (۳) سوسپانسور |
| (۴) رویان‌های تخمی |               |               |
- ۲۳- در مریستم‌های کناری، تقسیمات بیشتر از چه نوعی می‌باشد؟
- |                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| (۱) عرضی         | (۲) شعاعی | (۳) مماسی |
| (۴) در تمام جهات |           |           |
- ۲۴- پدیده سیتوولوژیک آندوپلی پلوئیدی در کدام گروه گیاهی رایج است؟
- |                      |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|
| (۱) نهان‌زادانگان    | (۲) سرخس‌ها | (۳) بازدانگان |
| (۴) نهان‌زادان آوندی |             |               |
- ۲۵- سلول‌های تشکیل دهنده کدام یک از لایه‌های بساک از نظر شکل، عملکرد و تعداد هسته تنوع را نشان می‌دهند؟
- |                        |                 |               |             |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Transitional layer (۴) | Endothecium (۳) | Epidermis (۲) | Tapetum (۱) |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|
- ۲۶- پایه کریستال‌های سیستولیت و دروس به ترتیب در ..... قرار دارند.
- |                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| (۱) دیواره و دیواره | (۲) واکوئل و دیواره | (۳) دیواره و واکوئول |
| (۴) واکوئل و واکوئل |                     |                      |
- ۲۷- تانه‌ها در کدام یک از ساختارهای زیر ممکن است تجمع یابند؟
- |                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| (۱) دیواره و پلاست | (۲) واکوئل و دیواره | (۳) دیواره و سیتوزول |
| (۴) واکوئل و پلاست |                     |                      |

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۸- ژن‌های کد کننده زیر واحدهای کوچک و بزرگ آنزیم روبیسکو به ترتیب در کدام اندامک (اندامک‌ها) قرار دارند؟
- (۱) هسته - هسته  
(۲) کلروپلاست - هسته  
(۳) کلروپلاست - کلروپلاست  
(۴) هسته - کلروپلاست
- ۲۹- کدام‌یک، از ویژگی‌های کلاتشیم است؟
- (۱) دیواره ثانویه - بافت مرکب - فقدان باززایی  
(۲) دیواره اولیه - بافت ساده - قابلیت باززایی  
(۳) دیواره ثانویه - بافت مرکب - قابلیت باززایی  
(۴) دیواره اولیه - بافت ساده - فقدان باززایی
- ۳۰- در لیگنین بازدانگان، کدام مونومر با درصد بالایی وجود دارد؟
- (۱) سیناپیک اسید  
(۲) سیناپیل الکل  
(۳) کونیفریل الکل  
(۴) پاراکوماریل الکل

## تشریح گیاهان آوندی:

- ۳۱- خاستگاه ریشه‌های جانبی در ریشه اصلی Tetrarch از چه بخشی است؟
- (۱) سلول‌های آندودرم مستقر در جلوی آوند آبکش  
(۲) سلول‌های آندودرم مستقر در قطب پروتوگزیلم  
(۳) سلول‌های پریسیکل مستقر در جلوی آوند آبکش  
(۴) سلول‌های پریسیکل مستقر در قطب پروتوگزیلم
- ۳۲- کدام مورد زیر سبب embolism در آوندهای چوبی می‌شود؟
- (۱) خشکی و رطوبت  
(۲) بخزدگی و رطوبت  
(۳) بخزدگی و خشکی  
(۴) بخزدگی و گرما
- ۳۳- ترتیب تجمع ترکیبات زیر در بخش‌های مختلف گیاه از بیش ترین به کمترین میزان کدام است؟
- (۱) اگزالات کلسیم، سیلیس، کربنات کلسیم  
(۲) اگزالات کلسیم، کربنات کلسیم، سیلیس  
(۳) کربنات کلسیم، اگزالات کلسیم، سیلیس  
(۴) کربنات کلسیم، سیلیس، اگزالات کلسیم
- ۳۴- تعداد ردیفهای پارانشیم شعاعی (اشعه آوندی) در چه نوع برشی (برش‌هایی) قابل مشاهده است؟
- (۱) طولی شعاعی - طولی مماسی  
(۲) عرضی - طولی مماسی  
(۳) عرضی - طولی شعاعی - طولی مماسی
- ۳۵- کدام‌یک در ارتباط با عملکرد کربستال‌های اگزالات کلسیم صحیح می‌باشد؟
- (۱) افزایش کلسیم سیتوزولی، افزایش وزن گیاه و کاهش قدرت مکانیکی  
(۲) کاهش کلسیم سیتوزولی، افزایش وزن گیاه و افزایش قدرت مکانیکی  
(۳) کاهش کلسیم سیتوزولی، کاهش وزن گیاه و افزایش قدرت مکانیکی  
(۴) افزایش کلسیم سیتوزولی، کاهش وزن گیاه و کاهش قدرت مکانیکی
- ۳۶- سلول‌های VELAMEN که در اپی‌فیت‌ها وجود دارند، در کدام بخش هستند؟
- (۱) زیر آندودرم  
(۲) زیر اپیدرم  
(۳) سمت بیرونی کورنکس
- ۳۷- کدام مورد در رابطه با ساختار برگ گیاهان آبزی صحیح است؟
- (۱) افزایش بافت‌های محافظ  
(۲) کاهش بافت آوند چوبی  
(۳) کوتیکول و دیواره سلولی ضخیم  
(۴) وجود بافت هیدرانشیم

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۸- تفاوت بین ساختار آندودرم در ریشه جوان یک گیاه دو لپهای چوبی و یک گیاه تک لپهای از کجا ناشی می‌شود؟
- (۱) شکل سلول‌ها  
(۲) تعداد ردیف‌های سلولی  
(۳) سلول‌های سفر و ساختار دیواره  
(۴) وجود یا نبود نوار کاسپاری
- ۳۹- در ساقه مو (*Vitis vinifera*), اولین فلوزن در آبکش اولیه تشکیل می‌شود. در پایان سال اول، پوسته بیرونی شامل چه بخش‌هایی خواهد بود؟
- (۱) آپیدرم و کورتکس  
(۲) آوند آبکش اولیه و آبکش پسین  
(۳) کورتکس و آوند آبکش اولیه  
(۴) چوب پنبه
- ۴۰- کدام گیاه دارای روزنۀ فروافتۀ سلول‌های نگهبان و سلول‌های ضمیمه‌ای با دیواره‌های آغشته به لیگنین می‌باشد؟
- Equisetum arvense* (۴)      *Nerium oleander* (۳)      *Zea mays* (۲)      *Pinus sp.* (۱)
- ۴۱- کدام نوع اسکلرید در پوست دانه‌ها مشاهده می‌شود؟
- Filiform sclereid (۲)      Astrosclereid (۱)  
Macrosclelereid – Trichosclereid (۴)      Macrosclereid - Osteosclereid (۳)
- ۴۲- فیبر‌لاتینی (Gelatinous fiber) در کجا یافت می‌شود؟
- (۱) آبکش اولیه  
(۲) آبکش پسین  
(۳) چوب واکنشی (Reaction wood) در بازدانگان      (۴) چوب واکنشی (Reaction wood) در نهاندانگان
- ۴۳- چنانچه بین آخرین عناصر مربوط به metaxylem و اولین عناصر آوند چوبی پسین تردید وجود داشته باشد، معیار تشخیص این دو از یکدیگر کدام است؟
- (۱) طول عناصر آوندی      (۲) قطر عناصر آوندی      (۳) میزان لیگنین دیواره      (۴) نوع ترتیبات دیواره
- ۴۴- در مخروط داران اشعه آبکش معمولاً ..... است و ..... دارد.
- (۱) یک ردیفی - فقط سلول پارانشیم  
(۲) یک ردیفی - سلول پارانشیم گاهی به صورت سلول آلومنوتیدی  
(۳) چند ردیفی - فقط سلول پارانشیم  
(۴) چند ردیفی - سلول پارانشیم گاهی به صورت سلول آلومنوتیدی
- ۴۵- ترکیب غالب دیواره ثانویه کدام است؟
- (۱) سلولز  
(۲) سوبرین  
(۳) لیگنین
- ۴۶- کدام ترکیب رنگ کننده اختصاصی لیگنین است؟
- (۱) سودان III  
(۲) قرمز روتینیوم  
(۳) فلورو گلوبینول  
(۴) فاست بلو B
- ۴۷- اتفاق پیت کوچک، کانال پیت، دریچه درونی، به‌طور معمول در کدام نوع پیت دیده می‌شوند؟
- (۱) در پیت ساده ضخیم  
(۲) در پیت ساده ضخیم  
(۳) در پیت لبه‌دار (هلالی) ضخیم
- ۴۸- رشد ثانویه غیر معمول در کدام گیاه یافت می‌شود؟
- Dracaena* (۲)      *Cucurbita* (۱)  
*Triticum* (۴)      *Helianthus* (۳)

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۹- کدام گزینه تفاوت Libriform fiber و Fiber tracheid را بهتر بیان می‌کند؟

- (۱) طول فیبرهای لیبریفورم کمتر از فیبر تراکتید است.
- (۲) زندگانی فیبرهای لیبریفورم نسبت به فیبر تراکتید طولانی‌تر است.
- (۳) ضخامت دیواره در فیبرهای لیبریفورم کمتر از فیبر تراکتید است.
- (۴) نوع پیت در فیبرهای لیبریفورم از نوع ساده و در فیبر تراکتید از نوع لبه‌دار است.

- ۵۰- دستجات آوندی در ساقه یک گیاه دولپه با کدام الگو توصیف می‌شود؟

Closed – Collateral – Endarch phloem (۲)      Closed – Collateral – Exarch phloem (۱)

Open – Collateral – Exarch xylem (۴)      Open – Collateral – Endarch xylem (۳)

## یاخته‌شناسی و بافت‌شناسی گیاهی مقایسه‌ای:

- ۵۱- سلول‌های مریستمی که از جوانه رأسی جدا شده و با محور برگی همبسته هستند، چه نامیده می‌شوند؟

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Primary meristem (۲)   | Detached meristem (۱) |
| Secondary meristem (۴) | Rib- meristem (۳)     |

- ۵۲- لیگنین تشکیل دهنده دیواره سلولی کدام گروه گیاهی، پلیمری از هر سه مونومر guaiacyl – syringyl – P-hydroxyphenyl است؟

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| ۱) بازدانگان       | ۲) سرخس‌ها |
| ۴) نهاندانگان چوبی | ۳) گندمیان |

- ۵۳- بخش اصلی پکتین‌ها را کدام ترکیبات تشکیل می‌دهد؟

- |   |   |
|---|---|
| ۱) پلی‌گالاکتورونیک اسید و رامنوگالاکتوران‌ها | ۲) پلی‌گالاکتورونیک اسید و رامنوگالاکتوران‌ها |
| ۳) پلی‌گلوکورونیک اسید و رامنوگالاکتوکوران‌ها | ۴) پلی‌گلوکورونیک اسید و رامنوگالوکوران‌ها    |

- ۵۴- کدام مورد، مراحل تدریجی رشد و تمایزیابی فیبر آوند آبکش را از چپ به راست نشان می‌دهد؟

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Coordinated - Intrusive (۲) | Coordinated - Coordinated (۱) |
| Intrusive - Intrusive (۴)   | Intrusive - Coordinated (۳)   |

- ۵۵- آوندهای آمفی کریبرال (Amphicribral) چه ویژگی دارند و در کدام گروه از گیاهان وجود دارد؟

- |   |   |
|---|---|
| ۱) آبکش دور چوب است - نهانزادان آوندی           | ۲) آبکش خارج چوب قرار می‌گیرد - تکلپهای ها                |
| ۳) آبکش درون و بیرون چوب قرار دارد - دولپهای ها | ۴) آبکش از سه طرف توسط چوب احاطه می‌شود - نهانزادان آوندی |

- ۵۶- در تکلپهایی چون Dracaena که آوند چوب دور آوند آبکش قرار می‌گیرد، کدام نوع دسته آوندی وجود دارد؟

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| Amphivasal (۲) | Amphicribral (۱) |
| Collateral (۴) | Bicollateral (۳) |

- ۵۷- بیان پایین کدام ژن در بنیان‌گذاری برگ (leaf initiation) دخالت می‌کند؟

- |          |         |         |          |
|----------|---------|---------|----------|
| STM1 (۴) | WUS (۳) | KN1 (۲) | CLV2 (۱) |
|----------|---------|---------|----------|

- ۵۸- در تمایز عناصر تراکتیدی، کدام مورد نقش مؤثرتری دارد؟

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ۱) شبکه آندوپلاسمی     | ۲) لیزوژوم‌ها        |
| ۴) واکونل‌های ذخیره‌ای | ۳) واکونل‌های لایتیک |

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۵۹- در تمایز یک سلول کلاتشیمی، Expression Phase کدام است؟
- (۱) نمایان شدن دیواره پکتوسلولری ضخیم  
(۲) نمایان شدن دیفن دیواره لیگنینی ضخیم  
(۳) فعلیت آنزیم‌های مؤثر در بیوسترنز لیگنین  
(۴) سنتز آنزیم‌های مؤثر در تشکیل ترکیبات دیواره‌ای
- ۶۰- در کدام نوع از استوانه‌های آوندی، دولایه آبکش داخلی و خارجی وجود دارد؟
- (۱) اکتیواستل  
(۲) اکتیواستل  
(۳) اکتوفلوریک سیفونواستل  
(۴) آمفی فلوریک سیفونواستل
- ۶۱- بروتین‌های Extensin و Expansin به ترتیب نقش ..... و ..... را به عهده دارند.
- (۱) ساختاری - ساختاری  
(۲) ساختاری - شل‌کنندگی دیواره  
(۳) شل‌کنندگی دیواره - ساختاری  
(۴) شل‌کنندگی - شل‌کنندگی دیواره
- ۶۲- تایلوز (Tylose) که در عنصر وسل رشد می‌کند توسط دیواره‌ای به نام ..... احاطه می‌شود و جنس این دیواره از ..... می‌باشد.
- (۱) Protective layer - سوبرین  
(۲) Separation layer - سوبرین  
(۳) Separation layer - سلولز کم و پکتین زیاد  
(۴) Protective layer - سلولز کم و پکتین زیاد
- ۶۳- کدام مورد نمایانگر ترکیب شیمیابی و فراساختار دیواره سلولی در بافت چوب پنبه (Phellem) می‌باشد؟
- (۱) سوبرین - ساختار شبکه‌ای نامنظم  
(۲) سوبرین - لایه‌های موازی تیره و روشن  
(۳) لیگنین و سوبرین - لایه‌های موازی یکنواخت  
(۴) لیگنین و سوبرین - لایه‌های موازی تیره و روشن
- ۶۴- خاستگاه ریشه‌های فرعی در کدام گروه از گیاهان برون‌زاد (Exogenous) می‌باشد؟
- (۱) تک‌لپه‌ای‌ها  
(۲) دولپه‌ای‌ها  
(۳) دم‌اسبیان  
(۴) مخروطیان
- ۶۵- در آوند چوبی پسین یک گیاه گلدار، ارتباط بین عناصر وسل و پارانشیم شعاعی از چه طریق برقرار می‌شود؟
- Simple pit pair (۲) Bordered pit pair (۱)  
Bordered pit pair with torus (۴) Half bordered pit pair (۳)
- ۶۶- با در نظر گرفتن یافته‌های فیلوزنیک در مورد دستگاه روزنای (Stomatal complex) گیاهان تک‌لپه‌ای، کدام مورد از نظر تکاملی ابتدایی‌تر است؟
- (۱) Mesogenous - چهار سلول ضمیمه‌ای  
(۲) Mesogenous - دو سلول ضمیمه‌ای  
(۳) Perigenous - چهار سلول ضمیمه‌ای  
(۴) Perigenous - دو سلول ضمیمه‌ای
- ۶۷- دستگاه روزنای (Stomatal complex) در گیاهی به صورت Diacytic و Perigenous subsidiary cell و Stomatal Complex توصیف شده است. خاستگاه سلول‌های نگهبان و ضمیمه‌ای و همچنین موقعیت سلول‌های ضمیمه‌ای در این گیاه به ترتیب به چه صورت است؟
- (۱) مشترک - به موازات روزن  
(۲) مشترک - به موازات روزن  
(۳) مشترک - عمود بر روزن

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۶۸- تقسیم کدام یک در ارتباط با عملکرد پروتئین‌های FtsZ می‌باشد؟  
(۱) پلاست  
(۲) سیتوپلاسم  
(۳) میتوکندری  
(۴) هسته
- ۶۹- کدام ساختار، پیتیدهای انتقالی (Transit Proteins) بیشتری برای ورود پروتئین به درون خود لازم دارد؟  
(۱) پلاست  
(۲) تیلاکوئید  
(۳) میتوکندری  
(۴) وزیکول‌های گلزی
- ۷۰- پروتئین‌های TIP- $\alpha$  روی غشاء کدام یک قرار دارند؟  
(۱) اتیوبلاست‌ها  
(۲) کروموبلاست‌ها  
(۳) واکوئل‌های ذخیره‌ای  
(۴) واکوئل‌های لایتیک
- ۷۱- مرکز سازمان‌دهنده میکرو‌توبولی (Microtubular organizing center) ثانویه در کجا قرار دارد؟  
(۱) استوای سلول  
(۲) غشای سلول  
(۳) غشای هسته  
(۴) در حلقه پیش‌پروفازی
- ۷۲- Stromules در اتصال و ارتباط کدام جزء دخالت دارد؟  
(۱) پلاست‌ها  
(۲) دانه‌های گرده  
(۳) واکوئل‌ها  
(۴) شبکه آندوبلاسمی صاف و دانه‌دار
- ۷۳- فراورده‌های حاصل از کدام ترکیبات دیواره‌ای، ویژگی‌های شبه هورمونی نشان می‌دهند؟  
(۱) ترکیبات پکتیکی  
(۲) سلولز  
(۳) همی‌سلولز  
(۴) کالووز
- ۷۴- افزایش (CL) Cross linking ترکیبات پکتیکی با کلسیم، چه اثری بر دیواره دارد؟  
(۱) رشد دیواره افزایش می‌یابد.  
(۲) رشد دیواره کاهش می‌یابد.  
(۳) میزان بور (B) دیواره افزایش می‌یابد.  
(۴) میزان بور (B) دیواره کاهش می‌یابد.
- ۷۵- کدام مورد ترتیب رسوب لیگنین در بخش‌های مختلف دیواره را نشان می‌دهد؟  
(۱) دیواره اولیه، دیواره ثانویه، تیغه میانی، فضای بین‌سلولی  
(۲) دیواره ثانویه، دیواره اولیه، تیغه میانی، فضای بین‌سلولی  
(۳) تیغه میانی، فضای بین‌سلولی، دیواره اولیه، دیواره ثانویه  
(۴) فضای بین‌سلولی، تیغه میانی، دیواره اولیه، دیواره ثانویه
- ۷۶- کدام یک سبب الحاق وزیکول‌ها و لوله‌های تشکیل دهنده صفحه سلولی می‌شود؟  
(۱) پروتئین اکسنتسین  
(۲) پروتئین اکسپانسین  
(۳) پروتئین فرآگموپلاستین  
(۴) فرآگموپلاست
- ۷۷- همه پروتئین‌های زیر، بخش ساختاری دیواره را تشکیل می‌دهند، بهجز انواع غنی از:  
(۱) سرین  
(۲) پرولین  
(۳) هیدروکسی پرولین  
(۴) گلیسین
- ۷۸- استقرار سوبرین و لیگنین در دیواره به ترتیب به کدام روش انجام می‌شود؟  
Intussusception (۱)  
Apposition (۲)  
Intussusception و Apposition (۳)  
Apposition و Intussusception (۴)

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۷۹- کدام یک در آرایش میکروفیبریل‌های دیواره، نقش ضروری دارد؟
- (۱) FtsZ protein  
(۲) Filamentous actin (F-actin)  
(۳) Microtubular organizing center (MTOC)  
(۴) Preprophase band proteins
- ۸۰- سلول‌های ترشح کننده موسیلاز در کدام گروه گیاهی رایج است و ماده ترشحی در چه بخشی وارد می‌شود؟
- (۱) تکلیفهای ها - واکوئل  
(۲) دولیفهای ها - واکوئل  
(۳) تکلیفهای ها - بین پروتوپلاست و دیواره سلولزی  
(۴) دولیفهای ها - بین پروتوپلاست و دیواره سلولزی
- زیست‌شناسی تکوینی گیاهی:
- ۸۱- پس از قرار گرفتن در تیمار القائی مناسب، کدام ژن از برانگیختگی و تعیین هویت مریستم زایشی ممانعت می‌کند؟
- (۱) APETALA (۲) AGAMOUS  
(۳) (EMF) EMBRYONIC FLOWER (۴) (LFY) LEAFY
- ۸۲- در درختان، معمولاً طول دوره پلاستوکرونی و فیلوکرونی با یکدیگر تطابق ندارند. این تفاوت از فاصله زمانی بین کدام دو مرحله تکوینی برگ ناشی می‌شود؟
- (۱) آشکار شدن (Emergence) - بلوغ (Maturation)  
(۲) آشکار شدن (Expansion) - گسترش سطح (Expansion)  
(۳) بنیان‌گذاری (Initiation) - آشکار شدن (Initiation)  
(۴) بنیان‌گذاری (Initiation) - گسترش سطح (Expansion)
- ۸۳- کدام فرایند باعث عبور مریستم انتهایی ساقه از فاز کمینه (Minimal) به فاز بیشینه (Maximal) می‌شود؟
- (۱) تقسیمات آنتی‌کلین حلقه بنیادی و رشد عرضی  
(۲) تقسیمات آنتی‌کلین مریستم منتظر و رشد طولی  
(۳) تقسیمات پری‌کلین حلقه بنیادی و رشد عرضی  
(۴) تقسیمات پری‌کلین مریستم منتظر و رشد طولی
- ۸۴- کدام مورد در خصوص محل بیان ژن‌های گروه knox (knox-1) صحیح است؟
- (۱) در پریموردیوم برگی بیان می‌شود و در مریستم بیان نمی‌شود.  
(۲) در مریستم بیان می‌شود و در پریموردیوم برگی بیان نمی‌شود.  
(۳) در پریموردیوم برگی و مریستم هر دو بیان می‌شود.  
(۴) در پریموردیوم برگی و مریستم هیچ‌کدام بیان نمی‌شود.
- ۸۵- در همه گیاهان مریستم انتهایی ساقه دارای سلول (سلول‌های) بنیادی واضح و مشخص است، به جز:
- (۱) Pinus (۲) Ginkgo  
(۳) Lycopodium (۴) Equisetum

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۸۶- بروز قطبیت (Polarity) در یک گیاه گلدار از چه مرحله‌ای آغاز می‌شود؟  
(۱) تخم لفاح یافته  
(۲) رویان کروی  
(۳) رویان قلبی شکل  
(۴) سلول تخمزا
- ۸۷- در برگ‌های ابلق لایه L<sub>2</sub> پرموردیوم برگی قادر به ساخت کلروفیل نیست، اما این نقص در مراحل بعدی تکوین برگ جبران می‌شود. این پدیده نشانه کدام است؟  
(۱) ترمیم اپی‌زننیکی  
(۲) جایگزینی لایه معیوب توسط L<sub>1</sub>  
(۳) جایگزینی لایه معیوب توسط سلول‌های بنیادی  
(۴) نقش مؤثر رنگیزه‌های کمکی در فتوسنترز
- ۸۸- کدام ژن در مراحل پایانی رویان زایی *Arabidopsis* بیان می‌شود؟  
(۱) CLV  
(۲) KNOX  
(۳) STM  
(۴) WUS
- ۸۹- کدام ویژگی در سلول‌های در حال تمایز دیده می‌شود؟  
(۱) اندوپلی پلوئیدی  
(۲) پلی‌تنی  
(۳) اندوپلی پلوئیدی، پلی‌تنی، سیتومیکسی  
(۴) در همه سلول‌های زیر پس از تقسیم، رشد سلولی مشاهده می‌شود، به جز:
- ۹۰- (۱) رویانی  
(۲) کالوسی  
(۳) مریستم‌های راسی  
(۴) کدام دو پدیده اثر یکسانی در تسريع گل‌دهی دارند؟
- ۹۱- (۱) دوره سرمازی - افزایش بیان FLC  
(۲) دوره سرمازی - جهش در ژن FLC  
(۳) شرایط روز کوتاه - افزایش بیان CO
- ۹۲- جهش در ژن **PHANTASTICA** موجب ایجاد برگ‌هایی سوزنی در *Arabidopsis* می‌شود. این ژن مسئول ایجاد کدام است؟  
(۱) تقارن radial  
(۲) dorsi-ventral  
(۳) عدم تقارن centrolateral  
(۴) adaxial-abaxial
- ۹۳- در مرحله القاء گل‌دهی کدام ژن نقش تحریکی دارد؟  
(۱) FLC و AP1  
(۲) TLF و FT  
(۳) FLC و CONSTANS
- ۹۴- در مریستم انتهائی ریشه گیاهان گلدار، سلول‌های بنیادی مربوط به کدام بخش در تشکیل مرکز آرام شرکت نکرده و همواره فعال می‌باشند؟  
(۱) آندودرم  
(۲) استوانه آوندی  
(۳) کلاتکس
- ۹۵- در مراحل رویان‌زایی گیاه *Arabidopsis*، بیان ژن **WUS** (WUSCHEL) از مرحله آغاز شده و تا مرحله ..... آغاز شده و ..... ادامه می‌یابد.  
(۱) رویان قلبی شکل - تشکیل دانه رست  
(۲) ۱۶ سلولی - تشکیل دانه رست  
(۳) رویان کروی - رویان ازدر مانند

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۹۶- مریستم انتهائی ساقه گیاهان گلدار با ترکیبی از دو نظریه توئیکا - کورپوس (اشمیت) و حلقه بنیادی - مریستم منتظر (بووا) توصیف می‌شود. در این صورت، مریستم منتظر کدام است؟
- (۱) کورپوس و مریستم مغزی      (۲) قسمت میانی توئیکا و تمام کورپوس  
(۳) قسمت میانی توئیکا و بخشی از کورپوس      (۴) قسمت کناری توئیکا و بخشی از کورپوس
- ۹۷- کدام مورد سازمان یابی مریستم انتهائی ریشه در بازدانگان را توصیف می‌کند؟
- (۱) closed type - یک سلول بنیادی      (۲) closed type - یک گروه بنیادی  
(۳) open type - یک سلول بنیادی      (۴) open type - یک گروه بنیادی
- ۹۸- در گیاه *Arabidopsis thaliana*، رویان‌زانی از نوع شب بو یا *Cruciferad* است. نقش سلول قاعده‌ای حاصل از تقسیم عرضی سلول تخم (zygote) کدام است؟
- (۱) ایجاد آوبز و سلول hypophysis      (۲) ایجاد پروتودرم و ریشه‌چه  
(۳) تولید فقط سوسپانسور      (۴) تشکیل ریشه چه و بخشی از محور زیر لپه
- ۹۹- مرحله نهایی در نمو دیواره دانه گرد، کدام مورد است؟
- (۱) تشکیل اینتین      (۲) تشکیل نگزین  
(۳) تولید فقط سوسپانسور      (۴) ناپدید شدن دیواره کالوزی
- ۱۰۰- پدیده چند رویانی (polyembryony) در مخربوطیان ..... اتفاق می‌افتد و ناشی از اتفاقات از لقاح می‌باشد.
- (۱) گاهی - قبل و بعد      (۲) گاهی - بعد  
(۳) همیشه - قبل و بعد      (۴) همیشه - قبل

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

258F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیرگز)