



309F

309

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تم مرکز) داخل – سال ۱۳۹۶

روش امتحانی مهندسی هوافضا – جلوبرندگی (کد ۲۳۳۲)

مدت یاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی – دینامیک گازهای پیشرفتی – سوخت و احتراق پیشرفتی)	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حلیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

ریاضیات مهندسی:

$$-\pi < x < \pi \quad , \quad |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2} \quad , \quad -\pi < x < \pi \quad , \quad x = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \quad -1$$

آنگاه سری فوریه مثلثاتی تابع $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi \\ 0, & -\pi < x \leq 0 \end{cases}$ کدام است؟

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (1)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (2)$$


$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (4)$$

برای تابع نشان داده شده در شکل، چنانچه نمایش انتگرال فوریه آن را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x] d\omega$$

آنگاه حاصل انتگرال $\int_0^\infty [A(\omega)]^2 d\omega$ کدام است؟



۱ (۱)

$\frac{2}{3\pi}$ (۲)

$\frac{2}{3}$ (۳)

$\frac{2\pi}{3}$ (۴)

$$I = \int_0^\infty f(x) \sin^2 x dx \quad \text{آنگاه } f(x) = \int_0^\infty \frac{x\omega}{1+\omega^2} \sin \omega x d\omega \quad \text{اگر} \quad -3$$

$\frac{3\pi}{10}$ (۱)

$\frac{3\pi}{5}$ (۲)

$\frac{5\pi}{12}$ (۳)

$\frac{8\pi}{25}$ (۴)

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

-۴ معادله دیفرانسیل با مشتقهای جزئی $u_{xx} + u_{yy} + u_y - u = 0$ در داخل مستطیل $a < x < b$ و $0 < y < 1$ به همراه شرایط مرزی $u(x, 0) = 0$ و $u(a, y) = u(b, y) = 0$ داده شده است. اگر برای این مستعله

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k u_k(x, y) \quad \text{کدام است؟}$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b+a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^2)}}{2} \quad (1)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{2+\alpha_k^2}}{2} \quad (2)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b+x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^2)}}{2} \quad (3)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^2)}}{2} \quad (4)$$

-۵ برای حل مستعله مقدار مرزی غیرهمگن داده شده با شرایط اولیه و مرزی همگن به صورت زیر:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (1-x)\sin t = \frac{\partial u}{\partial t}, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = u(x, 0) = 0, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \end{cases}$$

می‌توان از بسط فوریه به صورت زیر استفاده نمود.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(t) \sin(n\pi x), \quad F(x, t) = (1-x)\sin t = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin(n\pi x)$$

کدام‌یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

$$U'_n(t) - n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{2}{n\pi} \sin t \quad (1)$$

$$U'_n(t) - n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{2 \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (2)$$

$$U'_n(t) + n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{2 \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{2}{n\pi} \sin t \quad (3)$$

$$U'_n(t) + n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

-۶ مسئله مقدار اولیه $y(x, 0) = e^{-|x|}$ ، $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0$ با شرایط اولیه $t > 0$ ، $-\infty < x < \infty$ ، $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = e^t \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ با

فرض آن که پاسخ مسئله به شکل $y(x, t) = \int_0^\infty [a(\omega) \cos(\omega x) + b(\omega) \sin(\omega x)] \cdot \cos(\omega t) d\omega$ باشد، آنگاه $a(\omega)$ و $b(\omega)$ کدام است؟

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)} , a(\omega) = 0 \quad (1)$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)} , b(\omega) = 0 \quad (2)$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)} , b(\omega) = 0 \quad (3)$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)} , a(\omega) = 0 \quad (4)$$

-۷ به ازای کدام ثابت‌های γ ، معادله دیفرانسیل با مشتق‌ات جزئی $\gamma w + \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 0$ دارای جواب کراندار غیر صفر

به صورت $w(x, y) = F(x)G(y)$ در تمام ربع اول صفحه xy می‌باشد؟

$$\gamma < 0 \quad (1)$$

$$\gamma > 0 \quad (2)$$

$$\forall \gamma \in \mathbb{R} \quad (3)$$

$$(4) \text{ مسئله جواب ندارد}$$

-۸ اگر $z = x + iy$ عدد مختلط باشد، آنگاه $\operatorname{Im}(\frac{z}{\pi} \cdot \cosh z)$ (قسمت موهومی) کدام است؟

$$\frac{x}{\pi} \cosh x \cos y - \frac{y}{\pi} \sinh x \sin y \quad (1)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (2)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \cos y + \frac{y}{\pi} \cosh x \sin y \quad (3)$$

$$-\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

-۹ اگر $\text{Im}(\text{Log} \frac{z-1}{z+1}) = c$ (قسمت موهومی) و c ثابت و مخالف صفر باشد، آنگاه بیان این معادله بر حسب x و y کدام است؟

$$x^r + (y - \cot c)^r = 1 \quad (1)$$

$$x^r + (y - \tan c)^r = \frac{1}{\cos^r c} \quad (2)$$

$$x^r + (y - \cot c)^r = \frac{1}{\sin^r c} \quad (3)$$

$$x^r + (y - \tan c)^r = \tan^r c \quad (4)$$

-۱۰ حداقل مقدار $|e^{rz-i}|$ در ناحیه $|z| \leq \frac{1}{2}$ ، کدام است؟

$1 \quad (1)$


$e \quad (2)$

$e^r \quad (3)$

$\frac{1}{e^r} \quad (4)$


دینامیک گازهای پیشرفته:

-۱۱ یک جت سیال زیر صوت مطابق شکل به یک جریان اصلی تزریق می‌گردد. چنانچه دمای سکون جت ثابت نگه داشته شود اما فشار سکون آن (P_∞) به گونه‌ای تغییر کند که همواره عدد ماخ خروجی جهت (M_j) ثابت بماند. برخورد یک شوک مایل به دیواره در بالا دست جت چه اثری خواهد داشت؟



- (۱) سرعت خروج جت ثابت می‌ماند ولی دبی تزریق شده زیاد می‌شود.
- (۲) سرعت خروج جت زیاد شده و دبی تزریق شده نیز زیاد می‌گردد.
- (۳) سرعت خروج جت کم شده و دبی تزریق شده نیز کم می‌گردد.
- (۴) سرعت خروج جت زیاد شد ولی دبی تزریق شده ثابت می‌ماند.

- ۱۲- اگر W_s سرعت شوک برخورده متحرک در گاز استاتیک به انتهای سیلندر و W_R سرعت موج برگشتی باشد کدام عبارت صحیح است؟




$$\frac{P_{o1}}{P_{o2}} < 1 \text{ و } \frac{T_r}{T_{o1}} < 1 \text{ و } \frac{T_{o2}}{T_r} < 1 , W_R > W_s \quad (1)$$

$$\frac{P_{o1}}{P_{o2}} < 1 \text{ و } \frac{T_r}{T_{o1}} > 1 \text{ و } \frac{T_{o2}}{T_r} > 1 , W_R < W_s \quad (2)$$

$$\frac{P_{o1}}{P_{o2}} < 1 \text{ و } \frac{T_r}{T_{o1}} > 1 \text{ و } \frac{T_{o2}}{T_r} > 1 , W_R > W_s \quad (3)$$

$$\frac{P_{o1}}{P_{o2}} > 1 \text{ و } \frac{T_r}{T_{o1}} > 1 \text{ و } \frac{T_{o2}}{T_r} > 1 , W_R < W_s \quad (4)$$

- ۱۳- اگر لوله شوک (shock tube) زیر با ابعاد ثابت بخواهد برای کاربرد به عنوان مطالعات تونل باد استفاده شود برای افزایش مدت زمان آزمایش می‌توان:



- ۱) در بخش پرفشار گاز سنگین و دمای پایین و در بخش کم‌فارشار گاز سبک و دمای بالا استفاده نمود.
- ۲) در بخش پرفشار گاز سنگین و دمای بالا در بخش کم‌فارشار گاز سبک و دمای پایین استفاده کرد.
- ۳) در بخش پرفشار گاز سبک و دمای کم و در بخش کم‌فارشار گاز سنگین و دمای بالا استفاده نمود.
- ۴) در بخش پرفشار گاز سبک (جرم مولکولی کوچک) و دمای بالا و در بخش کم‌فارشار گاز سنگین و دمای پایین استفاده کرد.


پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۷

309F


آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام‌کن)

- ۱۴- یک دسته موج انبساطی چپ رو مطابق شکل زیر درنظر بگیرید، در عبور از سمت Head به Tail در عرض این موج صحیح است؟



- (۱) قدر مطلق سرعت به صورت غیر خطی افزایش می‌باید ولی فشار و چگالی و دما به صورت غیر خطی کاهش می‌باید و نرخ تغییرات سمت Head بیشتر است.
- (۲) قدر مطلق سرعت به صورت خطی افزایش می‌باید ولی فشار و چگالی و دما به صورت غیر خطی کاهش می‌باید و نرخ تغییرات سمت Head بیشتر است.
- (۳) قدر مطلق سرعت به صورت خطی کاهش می‌باید ولی فشار و چگالی و دما به صورت غیر خطی کاهش می‌باید و نرخ تغییرات سمت Head کمتر است.
- (۴) قدر مطلق سرعت به صورت خطی افزایش می‌باید ولی فشار و چگالی و دما به صورت غیر خطی افزایش می‌باید و نرخ تغییرات سمت Tail کمتر است.


- ۱۵- ایروفویل نازک متقارن زیر در عدد ماخ $M = 2,5$ و $\alpha = 8^\circ$ قرار گرفته است در نواحی ۳ و ۶ کدام گزینه صحیح‌تر است؟



- (۱) از آنجا که نیروی برآی ایروفویل مثبت است لازم است برای تعادل نیروی جریان بعد از ایروفویل down wash داشته باشد.
- (۲) فشار و دمای استاتیک این دو ناحیه یکسان است.
- (۳) جریان بعد از ایروفویل نسبت به جریان آزاد up wash پیدا می‌کند (به سمت بالا می‌چرخد).
- (۴) جریان بعد از صفحه موازی جریان آزاد است.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۱۶- ایرفویل مثلثی نازک زیر در جریان مافوق صوت با زاویه حمله α قرار گرفته است، به کمک تئوری جریان خطی مقدار ضریب نیروی عمودی C_n کدام است؟




$$C_n = \frac{4\alpha}{\sqrt{M_\infty^2 - 1}} \quad (1)$$

$$C_n = \frac{2\alpha}{\sqrt{M_\infty^2 - 1}} \left(\frac{2\alpha}{\epsilon_1} + \frac{2\alpha}{\epsilon_2} \right) \quad (2)$$

$$C_n = \frac{2t}{C\sqrt{M_\infty^2 - 1}} \left(\frac{2\alpha - \epsilon_1}{\epsilon_1} + \frac{2\alpha + \epsilon_2}{\epsilon_2} \right) \quad (3)$$

$$C_n = \frac{2t}{C\sqrt{M_\infty^2 - 1}} \left(\frac{2\alpha + \epsilon_1}{\epsilon_1} + \frac{2\alpha - \epsilon_2}{\epsilon_2} \right) \quad (4)$$

- ۱۷- در شکل زیر یک موج ضربه‌ای متحرک (moving normal shock) با سرعت W نسبت به آزمایشگاه داخل یک جریان با سرعت $100 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در جهت مخالف حرکت می‌کند کدام مورد صحیح است؟




$$M_2 < 1 \quad \text{یا} \quad M_2 > 1, \quad \frac{P_{\infty 2}}{P_{\infty 1}} > 1, \quad \frac{T_{\infty 2}}{T_{\infty 1}} > 1 \quad (1)$$

$$M_2 < 1, \quad \frac{P_{\infty 2}}{P_{\infty 1}} < 1, \quad \frac{T_{\infty 2}}{T_{\infty 1}} = 1 \quad (2)$$

$$M_2 < 1, \quad \frac{P_{\infty 2}}{P_{\infty 1}} > 1, \quad \frac{T_{\infty 2}}{T_{\infty 1}} = 1 \quad (3)$$

$$M_2 < 1, \quad \frac{P_{\infty 2}}{P_{\infty 1}} < 1, \quad \frac{T_{\infty 2}}{T_{\infty 1}} > 1 \quad (4)$$

- ۱۸- در شکل زیر پیستون با سرعت ثابت به سمت راست حرکت می‌کند. اگر سرعت گاز داخل سیلندر قبل از حرکت پیستون صفر باشد کدام عبارت صحیح است؟



- (۱) اگر انتهای پیستون باز باشد مقدار W_S ثابت می‌ماند ولی اگر بسته باشد افزایش می‌یابد.
- (۲) سرعت حرکت شوک W_S ، مستقل از اینکه انتهای پیستون بسته باز باشد ثابت است.
- (۳) با گذشت زمان برای سیلندر با انتهای باز مقدار W_S کاهش می‌یابد.
- (۴) با گذشت زمان برای سیلندر با انتهای بسته مقدار W_S افزایش می‌یابد.


پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

309F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام‌کن)

- ۱۹- جریان ایدئال $M_{\infty} > 1$ و زاویه حمله صفر از ناحیه پائینی سطح مقابل با معادله $y = -\varepsilon x^2 - b$ و $\sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} << 1$ درنظر بگیرید. مقدار ضریب فشار روی دیواره C_{P_w} حاصل از تئوری خطی کدام است؟




$$C_{P_w} = \begin{cases} \frac{-2\varepsilon^2 x}{U_{\infty}} & |x| < \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \\ 0 & |x| = \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \end{cases} \quad (1)$$

$$C_{P_w} = \begin{cases} \frac{\gamma x \varepsilon}{b(M_{\infty}^{\gamma} - 1)} & |x| \leq \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \\ 0 & |x| > \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \end{cases} \quad (2)$$

$$C_{P_w} = \begin{cases} \frac{-4\varepsilon x}{\sqrt{M_{\infty}^{\gamma} - 1}} & |x| \leq \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \\ 0 & |x| > \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \end{cases} \quad (3)$$

$$C_{P_w} = \begin{cases} \frac{8x\varepsilon}{\sqrt[4]{M_{\infty}^{\gamma} - 1}} & |x| < \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \\ 0 & |x| = \sqrt{\frac{b}{\varepsilon}} \end{cases} \quad (4)$$

- ۲۰- اگر در نازل زیر، دمای سکون و فشار سکون بالا دست ۴ برابر گردید، دبی جرمی چند است؟








پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰



309F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام‌کن)

- ۲۱ نمودار فشار انحراف برای یک سیستم امواج شوک برخورده و منعکس شده به صورت زیر است. با توجه به زوایا و شماره‌های ارائه شده در این نمودار، سیستم مربوطه متناظر با کدام گزینه است؟



- ۲۲- ایرفویل نازکی به شکل زیر با سطح فوقانی با رابطه $y = -\frac{4hx^2}{c^2} + \frac{4hx}{c}$ در ماخ ۳ و زاویه حمله ۳ درجه قرار دارد. توزیع فشار بالایی (C_{P_u}) و پایینی (C_{P_l}) کدامیک از گزینه‌های زیر است؟



- ۲۳- برای معادله $u_x + u_y = 0$ با شرایط اولیه $u(x,0) = x + 10$ مقدار سرعت در نقطه $(5,10)$ با استفاده از روش مشخصه‌ها برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

(۱) 5 (۲) 15 (۳) $Ln10$ (۴) e^{10}

- ۲۴- چنانچه جریان مادون صوت در یک لوله با سطح مقطع ثابت و بدون اصطکاک را گرم کنیم، درجه حرارت سیال چگونه تغییر می‌کند؟ (توجه: منظور درجه حرارت استاتیک است)

(۱) کاهش می‌یابد.
 (۲) زیاد می‌شود.
 (۳) ثابت می‌ماند.
 (۴) ممکن است کم یا زیاد شود.

- ۲۵- در جریان دائم غیرلزج متقاضن محوری حول مخروط مستقیم با شوک متصل کدام گزینه نادرست است؟

(۱) در پشت شوک گرادیان آنتروپی وجود دارد.
 (۲) در پشت شوک جریان غیرچرخشی است.
 (۳) در پشت شوک گرادیان آنتالپی وجود ندارد.
 (۴) خواص جریان در امتداد هر یک از شعاع‌های متصاعد از رأس مخروط ثابت است.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۶- در انتهای سمت چپ یک سیلندر محدود، پیستونی قرار گرفته است. این پیستون به صورت ناگهانی با سرعت آنی و ثابت نسبت به سیلندر شروع به حرکت به سمت راست سیلندر می‌نماید. با فرض باز بودن انتهای سمت راست سیلندر کدام گزینه صحیح است؟

۱) یک موج شوک تراکمی راسترو در مقابل پیستون شکل گرفته و پس از رسیدن به انتهای باز سیلندر یک دسته امواج انبساطی چپ‌رو شکل می‌گیرد.


۲) یک موج شوک تراکمی راسترو در مقابل پیستون شکل گرفته و پس از رسیدن به انتهای باز سیلندر یک موج تراکمی چپ‌رو منعکس می‌گردد.

۳) یک دسته امواج انبساطی راسترو در مقابل پیستون شکل گرفته و پس از رسیدن به انتهای باز سیلندر یک دسته امواج انبساطی چپ‌رو شکل می‌گیرد.

۴) یک موج شوک تراکمی راسترو در مقابل پیستون شکل گرفته و پس از رسیدن به انتهای باز سیلندر بدون انعکاس به محیط خارج سیلندر وارد می‌شود.

سوخت و احتراق پیشرفتی:

- ۲۷- در یک لوله یک سربسته، مخلوط سوخت - هوا استوکیومتریک پر شده است. اگر یکبار از محل موقعیت ۱ و بار دیگر از موقعیت ۲ جرقه زده شود به ترتیب جبهه شعله با چه سرعتی منتشر می‌شود؟



۱) مافق صوت، مادون صوت

۲) مافق صوت، مافق صوت

۳) مادون صوت، مافق صوت

۴) مادون صوت، مادون صوت

- ۲۸- یک مخلوط حاوی مواد اولیه و محصولات احتراقی مطابق واکنش زیر در حالت تعادلی قرار دارند.



در صورتی که دمای مخلوط ثابت باشد اما فشار را افزایش دهید، ترکیب مخلوط:

۱) تغییر می‌کند اگر $(c+d) > (\alpha+\beta)$ ۲) تغییر می‌کند اگر $(c+d) < (\alpha+\beta)$

۳) همواره تغییر نمی‌کند. ۴) تغییر می‌کند اگر $(c+d) = (\alpha+\beta)$.

- ۲۹- در یک موتور احتراق داخلی بنزینی، با افزایش نسبت تراکم توان لازم برای جرقه:

۱) تغییر نمی‌کند. ۲) کاهش می‌باید.


۳) افزایش می‌باید. ۴) روند افزایشی - کاهشی دارد.

- ۳۰- سرعت شعله مخلوط متان - هوا با افزایش فشار و کاهش نسبت همارزی به ترتیب چگونه تغییر می‌کنند؟

۱) افزایش، کاهش ۲) افزایش، افزایش

۳) کاهش، افزایش ۴) کاهش، کاهش

- ۳۱- در احتراق سوخت‌های هیدروکربنی کدام واکنش شیمیایی، عامل اصلی تولید حرارت است؟



- ۳۲- کدام‌یک از جملات زیر در هر مقطع از شعله دیفیوژن بیش تهییه شده (overventilate) ناشی از احتراق یک هیدروکربن گازی در هوای نادرست است؟

- (۱) غلظت سوخت در محل شعله تقریباً صفر است.
- (۲) غلظت اکسیژن در محل شعله تقریباً صفر است.
- (۳) غلظت محصولات احتراق در ناحیه درون شعله (ناحیه تاریک) به حد اکثر می‌رسد.
- (۴) غلظت نیتروژن درون شعله کمتر از غلظت نیتروژن موجود در هوای است.

- ۳۳- در گازهای خروجی یک محفظه احتراق ۵۰٪ حجمی اکسیژن اضافی مشاهده شده است. اگر سوخت مورد استفاده در این محفظه متان باشد، نسبت هم ارزی کلی محفظه چقدر است؟ (اکسیژن را O₂ فرض نمایید)

- (۱) ۰/۲
- (۲) ۰/۴
- (۳) ۰/۵
- (۴) ۰/۶

- ۳۴- اگر X_i, Y_i, W_i و W به ترتیب کسر مولی، کسر جرمی، وزن ملکولی جزء A-ام در یک مخلوط گازی بوده و W وزن ملکولی مخلوط باشد، کدام‌یک از روابط نادرست است؟

$$Y_i = \frac{X_i}{\sum_j \frac{W_j}{W_i} X_j} \quad (۲)$$

$$X_i = \frac{Y_i}{\sum_j \frac{W_i}{W_j} Y_j} \quad (۱)$$


$$W = \sum_i Y_i W_i \quad (۴)$$

$$W = \frac{1}{\sum_i \frac{Y_i}{W_i}} \quad (۳)$$

- ۳۵- ارتباط مرتبه واکنش‌های تک ملکولی، با فشار چگونه است؟

- (۱) در تمامی فشارها از مرتبه اول هستند.
- (۲) در تمامی فشارها از مرتبه دوم هستند.
- (۳) در فشارهای پایین از مرتبه دوم و در فشارهای بالا از مرتبه اول هستند.
- (۴) در فشارهای بالا از مرتبه دوم و در فشارهای پایین از مرتبه اول هستند.

- ۳۶- سرعت شعله S_L در چراغ بانسن شکل زیر چقدر است؟



$$S_L = \frac{\sqrt{2}(\dot{m}_f + \dot{m}_{Air})}{\rho \pi D^2} \quad (۱)$$

$$S_L = \frac{(\dot{m}_f + \dot{m}_{Air})}{2\rho \pi D^2} \quad (۲)$$

$$S_L = \frac{2(\dot{m}_f + \dot{m}_{Air})}{\rho \pi D^2} \quad (۳)$$

$$S_L = \frac{4(\dot{m}_f + \dot{m}_{Air})}{\rho \pi D^2} \quad (۴)$$

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۷- در جمله «در وضعیت تعادل یک واکنش، در شرایط و ثابت باید برقرار باشد» کدام‌یک از گزینه‌های زیر به ترتیب در جاهای خالی قرار گیرد تا جمله نادرست شود؟

$$dG = \circ, T, P \quad (2)$$

$$dH = \circ, T, V \quad (1)$$

$$dU = \circ, V, S \quad (4)$$

$$dS = \circ, H, P \quad (3)$$

- ۳۸- زمان نیمه عمر τ (زمان نیمه عمر، زمان رسیدن غلظت واکنش دهنده‌ها به نصف مقدار اولیه می‌باشد) واکنش مقدماتی $A_2 \xrightarrow{k_f} 2A$ ، کدام‌یک از موارد زیر است؟ غلظت اولیه جزء A_2 برابر C_{A_2} می‌باشد.

$$\tau = \frac{1}{2k_f} \quad (1)$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{k_f} \quad (2)$$

$$\tau = \frac{1}{\gamma k_f C_{A_2}} \quad (3)$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{k_f C_{A_2}} \quad (4)$$

- ۳۹- عدد لویس (Le) معرف چیست؟

(۱) نسبت مقیاس زمانی احتراق به مقیاس زمانی جریان (۲) نسبت تبدیل انرژی جنبشی متوسط به انرژی حرارتی

(۳) معرف توربولنس کم در جریان احتراقی (۴) نسبت دیفیوژن حرارت به دیفیوژن جرم

- ۴۰- رابطه قانون آرنیوس برای ثابت نرخ واکنش مقدماتی به صورت $k = BT^\alpha \exp(-\frac{E_a}{R_u T})$ است. کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟

(۱) α و B تابع دما است.

(۲) E_a تابع غلظت و دما نیست.

(۳) BT^α تناوب برخورد ملکول‌ها با یکدیگر است.

(۴) $\exp(-\frac{E_a}{R_u T})$ کسری از برخوردهای ملکولی است که انرژی بیشتر از انرژی فعال سازی دارند.

- ۴۱- در آزمایشی، مخلوطی از ۱۰٪ حجمی متان و ۹۰٪ حجمی اکسیژن با یک گاز بی‌اثر (هليوم یا نيتروژن یا آرغون) به نسبت ۲۱٪ اکسیژن و ۷۹٪ گاز بی‌اثر در یک مشعل بانسن آزمایشگاهی می‌سوزد و سرعت‌های شعله ۳۸، ۹۵ و ۱۳۲ سانتی‌متر بر ثانیه برای وقتی که هر یک از گازهای بی‌اثر فوق اضافه شوند، اندازه‌گیری شده است.

کدام‌یک از گزاره‌های زیر برای سرعت‌های شعله (S_L) وقتی که یکی از گازهای بی‌اثر اضافه شده $\frac{cm}{s}$ ، صحیح است؟

$$(S_L)_{Ar} = ۳۸, (S_L)_{He} = ۱۳۲, (S_L)_{N_2} = ۹۵ \quad (1)$$

$$(S_L)_{Ar} = ۹۵, (S_L)_{He} = ۱۳۲, (S_L)_{N_2} = ۳۸ \quad (2)$$

$$(S_L)_{Ar} = ۱۳۲, (S_L)_{He} = ۹۵, (S_L)_{N_2} = ۳۸ \quad (3)$$

$$(S_L)_{Ar} = ۱۳۲, (S_L)_{He} = ۳۸, (S_L)_{N_2} = ۹۵ \quad (4)$$



پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۵


309F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام‌کن)


- ۴۲- انتشار شعله آرام با سرعت جبهه شعله V_f (نسبت به ناظر در آزمایشگاه) در یک گاز پیش مخلوط که گازهای نسخته دارای پروفیل سرعت V_g شکل زیر هستند، را در نظر بگیرید. چنانچه سرعت شعله آرام S_L در سرتاسر شعله ثابت باشد، شکل شعله منتشر شده کدامیک از موارد زیر است؟ ($V_f > V_{g_{\max}}$)



- ۴۳- در یک لوله واقعی که مخلوط سوخت و هوای مناسب در آن ایجاد شده است در اثر جرقه، جبهه شعله در طول لوله شروع به حرکت می‌نماید. توزیع دما در جبهه شعله به ضخامت δ به چه صورت است؟



S_L : سرعت شعله
 ϕ : نسبت هم ارزی
 δ : ضخامت شعله



- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۴- سوخت به داخل یک محفظه احتراق اسپری می‌شود. اگر فشار محفظه دو برابر شود و فشار پاشش نیز به نحوی افزایش یابد که قطر قطرات تزریقی نصف شود، زمان تبخیر قطرات نسبت به شرایط قبل از تغییرات تقریباً چگونه تغییر می‌نماید؟ (دهمای محفظه احتراق را تقریباً ثابت فرض نمایید)

- | | | |
|---------------|----|-------|
| $\frac{1}{2}$ | ۲) | ۱ (۱) |
| $\frac{1}{8}$ | ۴) | ۱ (۳) |

- ۴۵- در یک مشعل غیر پیش مخلوط متناوب محوری آزمایشگاهی از جت متنان استفاده می‌شود. پیشنهاد شده است ضمن ثابت نگهداشتن توان حرارتی مشعل، جهت تنظیم طول شعله از نازلی با دو برابر قطر نازل استفاده شده در تست اولیه، استفاده گردد. طول شعله چقدر تغییر می‌کند؟ (فرض تماییم رژیم جریان آرام باشد)

- | | | |
|-------------------|----|-------|
| $\frac{1}{4}$ | ۲) | ۱ (۱) |
| ۴) تغییر نمی‌کند. | | ۱ (۳) |