

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری



۱۸۷

187

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تم مرکز) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی بیماری‌شناسی گیاهی (کد - ۲۴۴۰)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (بیماری‌های گیاهی - مدیریت بیماری‌های گیاهی - قارچ شناسی تکمیلی - ویروس‌شناسی گیاهی - پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی - اصول نهادشناسی و نمادهای انگل گیاهی)	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حلقی و حلقوی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

بیماری‌های گیاهی:

- ۱ بیماری‌های نوک‌سفیدی برگ ذرت، توخالی شدن ساقه گل کلم و پوسیدگی انتهای میوه هندوانه به ترتیب در اثر کمبود کدام عناصر ایجاد می‌شوند؟
- (۱) مس - فسفر - مولیبدن
(۲) روی - بور - کلسیم
(۳) گوگرد - منیزیوم - آهن
(۴) پتاسیم - نیتروژن - منگنز
- ۲ عامل بیماری غربالی درختان میوه هسته‌دار (*Wilsonomyces carpophilus*) در فرم غیرجنسی، کدام اندام را تولید می‌کند و به کدام صورت زمستان را سپری می‌کند؟
- (۱) اسپورودوکیوم - ریسه و کنیدی درون شانکرهای شاخه و جوانه
(۲) اسپورودوکیوم - کنیدی در برگ‌های ریخته شده در کف باغ
(۳) آسروروول - ریسه و کنیدی درون شانکرهای شاخه و جوانه
(۴) آسروروول - کنیدی در برگ‌های ریخته شده در کف باغ
- ۳ کدام مورد درباره بیماری لکه آجری بادام درست است؟
- (۱) قارچ آسکومیست دارای توان تولید اپیدمی در سطح وسیع
(۲) قارچ کاملاً بیوتروف ولی قابل کشت روی محیط اختصاصی
(۳) قارچ آسکومیست هموتالیک
(۴) قارچ آسکومیست هتروتالیک
- ۴ کدام قارچ، غیرقابل کشت است؟
- (۱) *Glomus mosseae*
(۲) *Tilletia controversa*
(۳) *Terfezia claveryi*
(۴) *Taphrina deformans*
- ۵ زهرابه فومونیزین اکثراً توسط کدام گونه تولید می‌شود؟
- (۱) *Fusarium culmorum*
(۲) *Fusarium oxysporum*
(۳) *Fusarium graminearum*
(۴) *Fusarium verticillioides*
- ۶ عارضه برگ نقره‌ای (silver leaf) در اثر کدام آلاینده در گیاهان ایجاد می‌شود؟
- (۱) ازن (O_۳)
(۲) فلورید هیدروژن (HF)
(۳) دی‌اکسید گوگرد (SO_۲)
(۴) پراکسی اسیل نیترات (PAN)
- ۷ از گروه‌های آناستوموزی (AG) قارچ *Rhizoctonia solani* کدام AG مهم‌تر است؟
- (۱) AG1
(۲) AG2
(۳) AG3
(۴) AG8
- ۸ جمع آوری و معdown کردن برگ‌های ریخته شده در پای درخت در مدیریت کدام گروه از بیماری‌ها مؤثر است؟
- (۱) زنگ پسته و لکه آجری بادام
(۲) لکه آجری بادام و اسکای مو
(۳) لکه قرمز برگ آلو و غربالی درختان میوه هسته‌دار
(۴) لکه سفید برگ گلابی و پوسیدگی قهقهه‌ای میوه (مومیابی) درختان میوه
- ۹ کدام بیماری درختان گردو در ایران بیشتر شایع است؟
- (۱) لکه سیاه گردو
(۲) گموز گردو
(۳) سوختگی باکتریایی گردو
(۴) شانکر سیتوسپورایی

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۱۰- کدام گونه به عنوان عامل بیماری درختان میوه تاکنون از ایران گزارش نشده است؟
Botryosphaeria obtusa (۲) Colletotrichum musae (۱)
Leucostoma cinctum (۴) Monilinia fructicola (۳)
- ۱۱- پروتئین پوششی ویروس‌های گیاهی کدام وظایف را به عهده دارد؟
(۱) حفاظت از زنوم، انتقال با ناقل و تولید عالیم
(۲) انتقال با ناقل، تکثیر زنوم ویروس و مهار خاموشی
(۳) حرکت ویروس از یک سلول به سلول دیگر، تولید VPg و شروع همانندسازی
(۴) حفاظت از زنوم، حرکت ویروس در آوندها و هضم آنزیمی پروتئین بزرگ ویروسی
- ۱۲- کدام ویروس در بدن ناقل خود همانندسازی می‌کند؟
(۱) زردی چغندر (*Beet yellows virus*)
(۲) موزائیک گل کلم (*Cauliflower mosaic virus*)
(۳) کوتولگی زردجو (*Barley yellow dwarf virus*)
(۴) شبکه زرد (*Lettuce necrotic yellows virus, LNYV*)
- ۱۳- پیکره‌های ویروسی در کدام خانواده ویروسی غلافدار است؟
Bromoviridae (۲) Rhabdoviridae (۱)
Luteoviridae (۴) Potyviridae (۳)
- ۱۴- تولید انداzek‌های همراه فرفراز شکل در سلول‌های گیاهی از مشخصات بارز کدام ویروس گیاهی است؟
(۱) نپوویروس‌ها (۲) بروموموویروس‌ها (۳) پوتی ویروس‌ها (۴) کالیموویروس‌ها
- ۱۵- کدام جزء سلولی می‌تواند به عنوان جایگاه همانندسازی RNA ویروسی محسوب شود؟
(۱) واکوئل‌ها (۲) اندوزوم‌ها (۳) لیزوژوم‌ها (۴) دستگاه گلزی
- ۱۶- کدام ساختار، در انتهای ۵' زنوم ویروس‌های گیاهی دارای RNA دیده می‌شود؟
cap (۲) (۱) OH آزاد
tRNA like structure (۴) poly A (۳)
- ۱۷- متدالول‌ترین زنوم ویروس‌های گیاهی از چه نوعی است?
ds-DNA (۴) ss-DNA (۳) ds-RNA (۲) ss-RNA (۱)
- ۱۸- مجموعه عالیم خشکیدگی شاخه، تولید پاجوش، تولید شانکر و صمن در شاخه مربوط به کدام بیماری است؟
(۱) شانکر باکتریایی گردو (۲) شانکر باکتریایی مرکبات
(۳) شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی (۴) شانکر باکتریایی هسته‌داران
- ۱۹- کدام باکتری، عامل بیماری پژمردگی باکتریایی لوبيا است؟
Agrobacterium tumefaciens (۱)
Pseudomonas syringae pv. *phaseolicola* (۲)
Xanthomonas axonopodis pv. *phaseolicola* (۳)
Curtobacterium flaccumfaciens pv. *flaccumfaciens* (۴)
- ۲۰- کدام بیماری بذر زاد است?
(۱) استابورن مرکبات (۲) شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی
(۳) آتشک سیب و گلابی (۴) شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۱- کدام عامل بیمارگر، انگل اجباری است؟
- Streptomyces scabies* (۲) *Spiroplasma citri* (۱)
Candidatus ‘phytoplasma pyri’ (۴) *Dickeya chrysanthemi* (۳)
- ۲۲- در آلودگی با کدام نماتد، پکنات کلسیم تجزیه شده و کلفت شدن جوانه‌ها و ساقه‌ها و کوچک شدن برگ‌ها حادث می‌شود؟
- Mesocriconema xenoplax* (۲) *Ditylenchus dipsaci* (۱)
Tylenchulus semipenetrans (۴) *Rotylenchulus reniformis* (۳)
- ۲۳- کدام علایم در آلودگی چغندرقند به نماتد سیستی، *Heterodera schachtii*، در قسمت‌های هوایی و زیرخاک بروز می‌کند؟
- (۱) پژمردگی و رشتہ‌ای شدن برگ‌ها - کمی رشد ریشه و بدشکلی آن
(۲) پژمردگی و کاهش رشد و زردی - پر ریشك شدن ریشه اصلی و بدشکل و کوچک شدن آن
(۳) بدشکلی برگ و ریش قبلاً از موعد برگ‌ها - گرهدار شدن ریشه اصلی و بزرگی بیش از حد ریشه
(۴) سوراخ سوراخ شدن برگ‌ها و ریش برگ‌ها - پر ریشك شدن ریشه اصلی و زخم‌های متعدد در آن
- ۲۴- وجود تشابه اعضای خانواده *Criconematidae* و نماتدهای انگل گیاهی دارای *Odontostyle* کدام است؟
- (۱) انگل سطحی بودن - مرحله خروج از تخم
(۲) نداشتن سطوح جانبی در لاروها و ماده‌ها - نیوب فاسمید
(۳) وجود اختلاف دو جنسی بین نر و ماده - نوع استایلت
(۴) نحوه اتصال مری نسبت به روده - تعداد لوله‌های جنسی در ماده‌ها
- ۲۵- کدام مورد، مشخصات بیماری شناختی ناشی از نماتدهای ریشه گری (*Meloidogyne spp.*) روی میزان است؟
- (۱) انگل داخلی مهاجر - ایجاد سلول‌های پرستار - کلفت شدن ریشه
(۲) انگل داخلی ساکن - تشکیل سین سی‌شیوم - پر ریشك شدن ریشه
(۳) انگل نیمه داخلی ساکن - ایجاد زخم در محل تغذیه - ایجاد گره‌های انتهایی
(۴) انگل داخلی ساکن - تشکیل سلول‌های غول‌آسا - پژمردگی در قسمت‌های هوایی

مدیریت بیماری‌های گیاهی:

- ۲۶- ماده بیولوژیک *Nogall™* که در کنترل گال باکتریایی طوفه به کار می‌رود، واجد کدام بیولوژیک است؟
- Rhizobium radiobacter K1026* (۲) *Rhizobium radiobacter K84* (۱)
Pseudomonas protegens CHAO (۴) *Pseudomonas fluorescens A506* (۳)
- ۲۷- با نگرش بر مکانیزم بیماری‌زایی بیمارگرها، اختلال در سیستم حد نصاب احساس (*Quorum sensing*) در ارتباط با کدام یک از بیمارگرهای زیر نقش کنترلی بهتری ایفا می‌کند؟
- (۱) اگروباکتریوم - زانتوموناس
(۲) زانتوموناس - پکتوباکتریوم
(۳) سودوموناس - زانتوموناس
(۴) پکتوباکتریوم - اگروباکتریوم
- ۲۸- بهدلیل وجود کدام سیستم در گونه‌های تریکودرما، مقاومت این قارچ نسبت به توکسین‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های تولیدشده توسط سایر میکرووارگانیسم‌ها در خاک قابل توجه است؟
- Functional system (۲) Sigma factor (۱)
ABC-transporter (۴) Auto-inducer system (۳)

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۹- برای تهییه مدل تعیین خسارت برای بیماری بلاست برنج، استفاده از کدام مدل تجربی را توصیه می‌کنید؟
- (۱) انگرالی
(۲) نقطه بحرانی
(۳) چند نقطه‌ای
AUDPC (۴)
- ۳۰- کدام باکتری آنتاگونیست در شرایط محدودیت اکسیژن در ناحیه ریزوسفر (فراریشه) از توانایی رقابت بیشتری برخوردار است؟
- (۱) باسیلوس‌ها
(۲) ریزوبیوم‌ها
(۳) آکتینومیست‌ها
سودوموناس‌های فلورستن (۴)
- ۳۱- کدام ترکیب شیمیایی مانع از سنتز بتا توبولین در بیمارگر می‌شود؟
- (۱) دی‌نیترامین
(۲) تیابندازول
(۳) فلورونکوتازول
(۴) دیفنوکوتازول
- ۳۲- در مبارزه بیولوژیک کدام میکروبازیت در تخریب اسکلروت قارچ عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا موقوفیت آمیز و مؤثر بوده و با کدام فرمولاسیون در بازار کشاورزی وارد شده است؟
- (۱) Pythium nunn - پودری
(۲) Coniothyrium minitans - گرانوله
(۳) Trichoderma harzianum - پودری
(۴) Pythium oligandrum - ترکیب کردن به داخل ماده ارگانیک
- ۳۳- کدام بروتوزوئر سبب ممانعت از بیماری پاخوره گندم در خاک‌های ممانعت‌گذار در استرالیا شده است؟
- (۱) Sacamoeba sp.
(۲) Naegleria fowleri
(۳) Thecamoeba granifera
(۴) Acanthamoeba castellanii
- ۳۴- کدام مورد، از وقایع مهم بعد از القای مقاومت سیستمیک اکتسابی (Systemic Acquired Resistance) در گیاه است؟
- (۱) افزایش سنتز پروتئین‌های PR
(۲) کاهش غلظت اسید سالیسیلیک در گیاه
(۳) افزایش احساس هورمون اتیلن بدون افزایش تولید اتیلن
(۴) افزایش احساس هورمون اتیلن و جاسمونیک اسید بدون افزایش غلظت آنها
- ۳۵- کدام سیدروفور علاوه بر آهن، می‌تواند Zn^{2+} را نیز به خوبی کلاته کند و موجب کاهش بیماری شود؟
- (۱) پایووردین (Pyoverdine)
(۲) انترباکتین (Enterobactin)
(۳) پایوچلین (Pyochelin)
(۴) سودوباکتین (Pseudobactin)
- ۳۶- ترکیب دیاستیل فلوروگلوسینول موجب افزایش (تشدید) کدام خاصیت آنتاگونیستی در گونه‌های *Trichodera* می‌شود؟
- (۱) رقابت
(۲) آنتی‌بیوز
(۳) پارازیتیسم
(۴) مقاومت القایی
- ۳۷- کدام ماده باعث القای مقاومت سیستمیک اکتسابی (SAR) در گیاهان می‌شود؟
- (۱) اتیلن
(۲) اسید پیروویک
(۳) اسید سالیسیلیک
(۴) اسید جاسمونیک

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۶

187F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام‌کن)

قارچ شناسی تکمیلی:

- ۳۸- مطابق قوانین جهانی نام‌گذاری برای جلبک‌ها، قارچ‌ها و گیاهان (ICN)، رعایت کدام مورد برای توصیف آرایه‌های جدید در قارچ‌ها ضروری است؟

(۱) نوشتن نام مصنف و سطح تاکسونومیک و انتخاب نمونه تیپ

(۲) نوشتن نام مصنف، ارائه توصیف لاتین، نوشتن سطح تاکسونومیک

(۳) انتخاب نمونه تیپ، انتشار شناسه‌دار الکترونیکی، انتخاب نام تلثومورف

(۴) نوشتن سطح تاکسونومیک، انتشار شناسه‌دار الکترونیکی و ارائه توصیف لاتین

- ۳۹- قارچ‌های حقیقی ریسه‌ای با وجود هاپلوئید بودن چگونه می‌توانند جهش‌های مغلوب خود را از فشار انتخاب محافظت کنند؟

(۱) با چرخه پراجنسی

(۲) با حالت هتروپلیوتیدی

(۳) با پدیده رانش ژنتیکی

- ۴۰- اگر نمونه تیپ معرفی شده برای یک آرایه، کیفیت خود را از دست داده باشد و ساختارهای تاکسون مربوطه قابل تشخیص نباشد، به عملی که انجام می‌شود چه گفته می‌شود؟

(۱) تعیین Epitype

(۲) Lectotype

(۳) تعیین Ex-type culture

(۴) Neotype

- ۴۱- برای پیدایش گونه‌های جدید در فرایند گونه‌زایی قارچ‌ها، نقش کدام عامل مهم‌تر است؟

(۱) جهش و پیوند هیفی

(۲) نوترکیبی جنسی و پیوند هیفی

- ۴۲- کدام راسته از زیرشاخه *Ustilaginomycotina* واحد منفذ بشکه‌ای در دیواره عرضی هیف می‌باشد؟

(۱) Exobasidiales

(۲) Microstromatales

(۳) Tillettiales

(۴) Ustilaginales

- ۴۳- اصطلاح **Homoplasy** در زمینه فیلوزنیک به چه مفهومی است؟

(۱) شباهت بهدلیل فرایند گونه‌زایی

(۲) شباهت در اثر تکامل همگرا از نیاهای مختلف

(۳) شباهت در اثر تکامل واگرا از یک نیای مشترک

(۴) شباهت بهدلیل به ارث رسیدن صفات نیایی مشترک

- ۴۴- با در نظر گرفتن سازگاری رویشی بین دو جدایه در قارچ‌ها، کدام فرایند باعث ایجاد مرگ برنامه‌ریزی شده سلول می‌شود؟

(۱) ناسازگاری هتروکاریونی بین هیفهای دو جدایه از یک گروه VCG

(۲) آناستوموز غیرخودی بین هیفهای دو جدایه از دو گروه مختلف VCG

(۳) آناستوموز پایدار خودی بین هیفهای دو جدایه از دو گروه مختلف VCG

(۴) آناستوموز وقت و غیرخودی بین هیفهای دو جدایه از یک گروه VCG

- ۴۵- کدام مورد مفهوم **Synanamorph** است؟

(۱) دو آنامورف متفاوت متعلق به دو تلثومورف شبیه هم است.

(۲) دو آنامورف شبیه بهم متعلق به دو تلثومورف متفاوت است.

(۳) یکی از دو یا بیشتر از دو آنامورف متعلق به یک تلثومورف که آنها را تولید می‌کند.

(۴) از یکی از دو یا بیشتر از دو تلثومورف متعلق به یک آنامورف که آنها را تولید می‌کند.

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

۴۶- فرض بر این است که قارچ‌ها از یک پروتوزوآئی نزدیک به کوآنوفلاژل‌ها منشأ گرفته‌اند. این تکامل چگونه ممکن است اتفاق افتاده باشد؟

(۱) در اثر از دست دادن خاصیت فتوسنتزی و تازگ

(۲) در اثر حذف خاصیت فاگوتروفی و ایجاد دیواره سلولی

(۳) در اثر تبدیل ترکیبات دیواره سلولی به کپتین و از دست دادن تازگ

(۴) در اثر حذف خاصیت اسموتروفی و از دست دادن خاصیت فتوسنتزی

کدام مورد، تفاوت یک پریتسیوم و یک سودوتیسیوم است؟

(۱) هم در پریتسیوم و هم در سودوتیسیوم، دیواره قبل از تشکیل آسک‌ها وجود دارد اما در پریتسیوم ماهیت آن زایشی دیکاربوتیک و در سودوتیسیوم، زایشی هاپلوبیوتیک است.

(۲) در پریتسیوم، بافت دیواره قبل از پیدایش آسک‌ها وجود دارد و ماهیت هاپلوبیوتیک زایشی دیکاربوتیک داشته ولی در سودوتیسیوم، بافت دیواره قبل از به وجود آمدن اندام‌های جنسی وجود داشته و ماهیت هاپلوبیوتیک رویشی دارد.

(۳) در پریتسیوم، بافت دیواره بعد از تشکیل آنتربیدیوم و آسکوگونیوم تشکیل شده و ماهیت دیکاربوتیک زایشی داشته ولی در سودوتیسیوم، بافت دیواره قبل از به وجود آمدن اندام‌های جنسی وجود داشته و ماهیت هاپلوبیوتیک رویشی دارد.

(۴) در پریتسیوم، بافت دیواره بعد از پیدایش آنتربیدیوم و آسکوگونیوم تشکیل می‌شود و ماهیت هاپلوبیوتیک زایشی داشته ولی در سودوتیسیوم، بافت دیواره قبل از به وجود آمدن اندام‌های جنسی وجود داشته و ماهیت هاپلوبیوتیک رویشی دارد.

۴۸- لوكوس *het* در قارچ‌ها چه ویژگی‌ای را کنترل می‌کند؟

(۱) امتزاج سلول‌ها را داخل و نیز بین افراد یک گونه کنترل می‌کند و هترواللیسم در لوكوس در یک هتروکاربون قابل تحمل نیست.

(۲) امتزاج سلول‌ها را داخل و نیز بین افراد یک گونه کنترل می‌کند و هترواللیسم در لوكوس در یک هتروکاربون به وجود می‌آید.

(۳) فقط امتزاج سیتوبلاسم را داخل و نیز بین افراد یک گونه کنترل می‌کند و هترواللیسم در لوكوس در یک هتروکاربون به وجود می‌آید.

(۴) فقط امتزاج سیتوبلاسم را داخل و نیز بین افراد گونه‌های مختلف کنترل می‌کند و هترواللیسم در لوكوس در یک هتروکاربون قابل تحمل نیست.

در کدام جنس‌ها، آسکوسپورها آلانتوئید هستند؟

Valsella , *Cryphonectria* (۲)

Phyllachora , *Eutypa* (۱)

Gibberella , *Leucostoma* (۴)

Diatrype , *Valsa* (۳)

۵۰- صفات هم آپومورفیک (*Synapomorphic*) در روابط فیلوزنتیک قارچ‌ها به چه نوع صفاتی اطلاق می‌شود؟

(۱) به صفاتی که در نتیجه همگرایی با هم شباهت پیدا کرده‌اند.

(۲) به صفات همولوگی که از طریق یک نیای مشترک به ارث رسیده باشند.

(۳) به صفات همولوگی که جدیداً به طور مشترک به یک سری از تاکسون‌ها به ارث رسیده باشند.

(۴) به صفاتی که در نتیجه همگرایی در تکامل یا اشتاقاک اولیه از اجداد مشترک به ارث رسیده باشند.

ویروس‌شناسی گیاهی:

- ۵۱- کدام مورد درباره مکان و نحوه همانندسازی ویروئیدهای خانواده **Pospiviroidae** درست است؟

- (۱) هسته - دایره غلتان نامتقارن
- (۲) هسته - دایره غلتان متقارن
- (۳) کلروپلاست - دایره غلتان نامتقارن
- (۴) کلروپلاست - دایره غلتان متقارن

- ۵۲- پدیده پیرایش (splicing) در تولید ترانس کریپت در ویروس‌های کدام جنس از تیره **Geminiviridea** اتفاق می‌افتد؟

- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Begomovirus (۴) | Curtovirus (۳) | Mastrevirus (۲) | Topocuvirus (۱) |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|

- ۵۳- کدام گروه از ویروس‌ها، دارای ژنوم آمبی سنس (ambisense) هستند؟

- | | |
|----------------|---------------|
| Reovirus (۲) | Rhabdovirus |
| Tospovirus (۴) | Nanovirus (۳) |

- ۵۴- کدام مکانیزم نوترکیبی در ویروس‌های چند بخشی دیده می‌شود؟

- | | |
|--------------------|------------------|
| intramolecular (۲) | Reassortment (۱) |
| substitution (۴) | Copy-choice (۳) |

- ۵۵- از میان استراتژی‌های بیان چارچوب‌های خوانش داخلی (internal ORFs) در ویروس‌ها، کدام استراتژی‌ها متداول‌تر هستند؟

- (۱) Ribosomal shunt و Transactivation

(۲) ژنوم تقسیم شده و ورود ریبوزوم‌ها به نقطه شروع داخلی

(۳) پیوسته خوانی (read-through) و آر ان ای زیرژنومی (subgenomic RNA)

(۴) تولید پروتئین مرکب (Polyprotein) و تغییر کادر خوانش (Frameshift)

- ۵۶- کدام مورد درباره ویروس‌هایی که به طور ناپایا با شته‌ها انتقال پیدا می‌کنند، درست است؟

- (۱) عمل بلع یا «regurgitation» نقش مهمی در این نوع انتقال دارد.

(۲) این نوع از انتقال صرفاً مکانیکی است و ارتباط خاصی میان ویروس و شته وجود ندارد.

(۳) لازمه این نوع انتقال، عور ویروس از لایه‌های روده میانی و ورود به همولنف و سپس عدد بزاوی است.

(۴) این نوع انتقال مستلزم برهمکنش پوشش پروتئینی ویروس با نواحی خاصی از لایه کوتیکولی استایلت ناقل است.

- ۵۷- مکانیسم **premature termination** در هنگام ساخت کدام رشته ویروسی اتفاق می‌افتد؟

- (۱) ساخت رشته مثبت از روی رشته منفی

(۲) ساخت رشته منفی از روی رشته مثبت

(۳) ساخت RNA از روی ژنوم DNA ویروسی

(۴) ساخت رشته منفی از روی رشته مثبت و ساخت رشته مثبت از روی رشته منفی

- ۵۸- آنزیم پلیمرازی که به عنوان یک بخش فعال در پیکره‌های ویروس‌های تیره **Rhabdoviridae** است، چه نوع آنزیم پلیمرازی است؟

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| DNA-dependent RNA polymerase (۲) | RNA-dependent RNA polymerase (۱) |
|----------------------------------|----------------------------------|

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| DNA-dependnt DNA polymerase (۴) | RNA-dependent DNA polymerase (۳) |
|---------------------------------|----------------------------------|

- ۵۹- چه پروتئین‌هایی از ویروس‌های تیره **Potyviridae** نفس پروتئینازی (Proteinase) دارند؟

- | | |
|-----------------|------------------|
| P3, NIb, CP (۲) | PI, NIa, NIb (۱) |
|-----------------|------------------|

- | | |
|-----------------|---|
| PI, HC, NIa (۴) | C ₁ (Hel), 6k ₁ , 6k ₂ (۳) |
|-----------------|---|

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی:

- ۶۰- امروزه علاوه بر استفاده از ژن ۱۶S rRNA و هیبریداسیون DNA/DNA، برای شناسایی گونه‌های پروکاریوت بر کدام اطلاعات نیز تأکید می‌شود؟
(۱) rpoB gene (۲) gyrB gene (۳) 23S rRNA gene (۴) Average Nucleotide Identity (۵)
- ۶۱- واژه **Candidatus** برای کدام میکروارگانیزم به کار می‌رود؟
(۱) سخت‌کشت (۲) فاقد دیواره سلولی (۳) به صورت کامل توصیف‌نشده (۴) زندگی کردن در آوندهای آبکشی گیاهان
- ۶۲- پورین‌ها (Porins) در کدام قسمت از دیواره سلولی باکتری‌ها قرار دارند؟
Cortex layer (۱) Outer membrane (۲) Peplidoglycan layer (۳) Cytoplasmic membrane (۴)
- ۶۳- در کدام سیستم ترشحی (Secretion system) نوکلوبیوتین به سلول‌های میزبان منتقل می‌شود؟
(۱) نوع اول (۲) نوع دوم (۳) نوع سوم (۴) نوع چهارم
- ۶۴- مهم‌ترین توکسین و مخرب‌ترین فرم آن در باکتری *Streptomyces scabies* کدام است؟
(۱) تاکستومین (thaxtomin) - فرم A (۲) تاکستومین (thaxtomin) - فرم B (۳) Concanaamycin - فرم A (۴) بوربیلیدین - فرم B
- ۶۵- کدام توکسین، یک Polypeptide است؟
Rhizobiotoxin (۲) Tabtoxin (۱) Phaseolotoxin (۴) Syringomycin (۳)
- ۶۶- ژن‌های گُددکننده آپین‌ها (Opines) روی کدام ناحیه از Tiplasmid قرار دارند؟
Opine catabolism (۱) Replication (۲) T-DNA (۳) Vir (۴)
- ۶۷- آزمون‌های LOPAT برای تشخیص کدام جنس از باکتری‌های بیمارگر گیاهی اهمیت دارد؟
Pseudomonas (۱) Xanthomonas (۲) Clavibacter (۳) Curtobacterium (۴)

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۶۸- کدام تاکسون برای رشد به کلستروول نیاز دارد؟

- Rathayibacter tritici* (۲) *Acholeplasma* sp. (۱)
Spiroplasma kunkelii (۴) *Brenneria nigrifluens* (۳)

- ۶۹- رده Mollicutes از نظر فیلوژنی به کدام گروه‌ها نزدیک تر است؟

- (۱) باکتری‌های راسته Actinomycetales
(۲) باکتری‌های گرم مثبت دارای G+C
(۳) باکتری‌های گرم مثبت دارای High G+C
(۴) باکتری‌های L-form

- ۷۰- کدام عامل از عوامل بیمارگر، توان تجزیه مواد پکتینی میزبان خود را دارد؟

- Dickeya chrysanthemi* (۲) *Streptomyces scabies* (۱)
Erwinia tracheiphila (۴) *Erwinia amylovora* (۳)

أصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی:

- ۷۱- اندازه کوتیکول انتهای دم (هیالین) در شناسایی کدام دو جنس به کار می‌رود؟

- Amplimerlinius - Merlinius* (۲) *Amplimerlinius - Trophorus* (۱)
Trophorus - Tylenchorhynchus (۴) *Geocenamus - Scutylengchus* (۳)

- ۷۲- نماتدهای نر کدام گروه از جنس‌ها قابل تمایز از یکدیگر هستند؟

- Meloidogyne - Heterodera - Rotylenchulus* (۱)
Pratylenchus - Zygotylenchus - Radopholus (۲)
Criconema - Hemicriconemoides - Hemicycliophora (۳)
Criconemoides - Mesocriconemoids - Hemicycliophora (۴)

- ۷۳- چنانچه در جمعیت نماتدهای استخراج شده از خاک فقط لارو وجود داشته باشد، جداسازی کدام گروه از نماتدهای زیر به سختی امکان‌پذیر است؟

- Meloidogyne - Heterodera* (۲) *Aphelenchus - Aphelenchoides* (۱)
Merlinius - Tylenchorhynchus (۴) *Pratylenchus - Zygotylenchus* (۳)

- ۷۴- کدام خانواده از نماتدهای زیر فاقد دو شکلی جنسی است و تعداد شیارهای سطوح جانبی در جداسازی جنس‌های آن‌ها کاربرد دارد؟

- Pratylenchidae* (۲) *Anguinidae* (۱)
Dolichodoridae sensu lato (۴) *Hoplolaimidae* (۳)

- ۷۵- دو جنس *Pratylenchus* و *Paratylenchus* را براساس کدام دو صفت زیر از هم تشخیص می‌دهند؟

- (۱) شکل مری - محل روزنہ دفعی - ترشحی
(۲) شکل مری - اندازه و شکل استایلت
(۳) تعداد لوله‌های جنسی در افراد نر - اندازه و شکل استایلت
(۴) نحوه ارتباط انتهای مری به ابتدای روده - تعداد لوله‌های جنسی در افراد ماده

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۷۶- در کدام دو نماتد زیر پدیده Anhydrobiosis گزارش نگردیده است؟

Aphelenchus avenae, *Anguina tritici* (۱)

Anguina tritici, *Ditylenchus dipsaci* (۲)

Ditylenchus dipsaci, *Aphelenchus avenae* (۳)

Xiphinema index, *Ditylenchus destructor* (۴)

- ۷۷- در کدام جنس‌های نماتدی، افراد نر فاقد بورسا و در عین حال دارای پاییل‌های جفت‌گیری (کمکی تناسلی) هستند؟

Aphelenchoides – *Aphelenchus* (۲)

Paratrichodorus – *Trichodorus* (۱)

Longidorus – *Xiphinema* (۴)

Heterodera – *Globodera* (۳)

- ۷۸- از نظر بود و نبود ضمایم و تربیبات، کوتیکول مراحل لاروی و افراد ماده کدام گروه از نماتدهای انگل گیاهی زیر متفاوت است؟

Criconema – *Criconemoides* (۲)

Hemicyclophora – *Ogma* (۱)

Criconema – *Hemicriconemoides* (۴) *Mesocriconema* – *Hemicriconemoides* (۳)

- ۷۹- نماتد برگی *Aphelenchoides ritzemabosi* چگونه وارد برگ می‌شود و به چه قسمتی از برگ آسیب می‌رساند و کدام گیاه میزبانی آن است؟

(۱) زخم - مزو菲尔 برگ - توت فرنگی

(۱) زخم و روزنه - آوندهای آبکش - داودی

(۴) زخم - فضاهای بین سلولی - توت فرنگی

(۳) زخم و روزنه - مزو菲尔 برگ - داودی

- ۸۰- کدام جنس از نماتدهای زیر از نظر نوع همپوشانی مری و روده با دیگر گزینه‌ها متفاوت است و دایرید در آن مشاهده می‌گردد؟

Pratylenchoides (۲)

Radopholus (۱)

Hirschmaniella (۴)

Zygotylenchus (۳)

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

187F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیرگز)