

206

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



صبح جمعه  
۱۳۹۵/۱۲/۶  
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل - سال ۱۳۹۶

### رشته امتحانی بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک (کد ۲۷۰۳)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی | مجموعه دروس تخصصی (بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک - اصول معاینه دام - رادیولوژی دامپزشکی - کلینیکال پاتولوژی) | تعداد سؤال | از شماره | تا شماره |
|------|--------------|--|------------|----------|----------|
| ۱    | ۹۰           | ۹۰   | ۱          | ۹۰       |          |

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسقندمهام - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیم اشخاص حلبی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

## بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک:

- ۱- کدام عبارت در مورد سندرم صرع صحیح نیست؟
- (۱) کنترل صرع بدون شناخت عامل مولد بیماری ممکن نیست.
  - (۲) کتابخانه در درمان علایم بالینی اشکال شدید صرع مصرف دارد.
  - (۳) امواج الکترو آنسفالوگرافی در فواصل بین حملات صرع نیز معرف بیماری صرع خواهد بود.
  - (۴) مهم‌ترین نشانه سندرم صرع حرکات تونیک و کلونیک با فواصل منظم و مشاهده علایم مقدماتی و گیجی پس از حمله است.
- ۲- رفلکس پاسخ به خطر، کدام بخش را بررسی می‌کند؟
- (۱) سیستم بینایی
  - (۲) حس عمقی
  - (۳) سیستم تعادلی
  - (۴) فقط عصب بینایی
- ۳- کدام یک می‌تواند علایم عصبی استاتیک ایجاد کند؟
- (۱) آبسه
  - (۲) دیابت
  - (۳) هیپوپلازی مخچه
  - (۴) بیماری‌های متابولیک
- ۴- اختلال هوشیاری نشانه ضایعه کدام بخش است؟
- (۱) تalamوس
  - (۲) سیستم مشبك
  - (۳) هیپوتalamوس
  - (۴) قشر خاکستری مغز
- ۵- در بیماری که مبتلا به نیستاگموس عمودی است کدام بخش دستگاه عصبی صدمه دیده است؟
- (۱) سیستم وستیبولاژ مرکزی
  - (۲) نوده فضایک در گوش داخلی
  - (۳) ادم ناشی از ترومای بصل النخاع
  - (۴) قطع نخاع از قسمت بالاتر از L<sub>4</sub>
- ۶- داروی PNF -  $\alpha$  یک سیتوکین.....
- (۱) پیش التهابی با اثر اینوتوروب مثبت است.
  - (۲) پیش التهابی با اثر اینوتوروب منفی است.
  - (۳) التهابی است که از بافت ریه آزاد می‌گردد.
  - (۴) التهابی است که از آنورت ترشح شده و اینوتوروب مثبت است.
- ۷- مکانیسم عمل بی‌پیریدن‌ها کدام است؟
- (۱) از داروهای بتا بلوكر می‌باشد.
  - (۲) از داروهای بلوك‌کننده کانال کلسیمی می‌باشد.
  - (۳) از داروهای گلیکوپروتئین می‌باشد.
  - (۴) از داروهای هستند که بر روی پمپ سدیم - پتاسیم اثر می‌گذارند.
- ۸- در همه موارد زیر نبض سرخرگی وجود دارد، به جز:
- (۱) فیبریلاسیون بطئی
  - (۲) Silent atrium
  - (۳) تاکیکاردی بطئی
  - (۴) فیبریلاسیون دهلیزی
- ۹- کدام یک در درمان کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک در گربه‌ها منع مصرف دارد؟
- (۱) داروهای بتا بلوكر
  - (۲) داروهای کلسیم بلوكر
  - (۳) داروی دیگوکسین
  - (۴) داروهای بلوك‌کننده کانال سدیمی

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تممرکز)

صفحه ۳

206F

- ۱۰ درمان مناسب برای بلوک قلبی درجه ۱ در سگ‌ها و گربه‌ها کدام است؟  
(۱) تجویز ایزوپروترنول  
(۲) تجویز دیزیتال همراه با بی‌کربنات سدیم  
(۳) تجویز دزوکسی کورتیکواستروئید استات  
-۱۱ معمول ترین کاردیومیوپاتی به ترتیب در سگ‌ها و گربه‌ها کدام است؟  
(۱) انساعی - انساعی  
(۲) هیپرتروفیک - انساعی  
(۳) هیپرتروفیک - هیپرتروفیک  
-۱۲ **Diltiazem** جزء کدام دسته دارویی قرار دارد؟  
(۱) بلوکر کانال کلسیم  
(۲) اینوتروپ مثبت  
(۳) مهارکننده فسفودی استراز  
-۱۳ احتمال وقوع کدام یک از تغییرات آزمایشگاهی در یک بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی کمتر است؟  
(۱) طبیعی ماندن تعداد پلاکت‌ها  
(۲) طبیعی ماندن غلظت کلسیم تام  
(۳) کاهش خفیف تا متوسط بی‌کربنات  
(۴) افزایش هماتوکریت به دلیل پاسخ جبرانی مغز استخوان در برابر خونریزی دستگاه گوارش  
-۱۴ معمول ترین عامل بیماری **FLUT** (بیماری دستگاه ادراری تحتانی گربه‌ها) کدام است؟  
(۱) پلاک یورترا  
(۲) اختلال الکترولیتی  
(۳) بیماری مزمن کلیوی  
(۴) سیستیت ایدیوپاتیک (FIC)  
-۱۵ استفاده از کدام ترکیب در درمان سنگ‌های سیستینی ممنوع است؟  
(۱) بیکربنات سدیم  
(۲) کلرور آمونیوم  
(۳) سیترات پتاسیم  
(۴) مرکاپتوپریونیل گلیسین  
-۱۶ اکسی بوتینین و بروپانتیلن بروماید برای درمان کدام یک از علل بی‌اختیاری ادراری استفاده می‌شود؟  
Reflex dyssinergia (۲) Hyporeflexia (۱)  
Urge incontinence (۴) Ectopic ureter (۳)  
-۱۷ مشخصه مایعات آسیتی ایجاد شده در گلومرولونفریت کدام است؟  
(۱) پروتئین کم و سلول کم  
(۲) پروتئین زیاد و سلول زیاد  
(۳) پروتئین زیاد و سلول کم  
-۱۸ تجویز کدام دیورتیک در کاهش دفع ادراری کلسیم می‌تواند مفید باشد؟  
(۱) فروزمايد  
(۲) کلرور سدیم  
(۳) استازولامید  
(۴) هیدروکلرتیازید  
-۱۹ کدام یک از انواع بیماری‌های ایمونولوژیک پوستی کمترین پاسخ را به درمان‌های استروییدی می‌دهند؟  
(۱) آتوپی  
(۲) آرژی غذایی  
(۳) لوپوس اریتماتوز  
(۴) درماتیت آرژیک تماسی  
-۲۰ آتوپی سگ‌ها نوعی ..... است.  
(۱) زنودرماتوز (با منشاء ژنتیکی)  
(۲) درماتیت فصلی و غیر خارش‌دار  
(۳) درماتیت غیرفصلی مختص سگ‌های پیر

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۱- عفونت اسپوروتروکوز ناشی از **Sporothrix schenekii** :
- (۱) یک عفونت قارچی زیر جلدی است.
  - (۲) یک عفونت قارچی عمومی است.
  - (۳) نوعی عفونت تک یاخته‌ای پوست است.
  - (۴) یک عفونت قارچی سطحی پوست و نوعی درماتوفیتوز است.
- ۲۲- برای درمان آلودگی‌های انگلی پوستی در توله‌های زیر ۴ ماه کدام گزینه می‌تواند خطرناک باشد؟
- (۱) استفاده از شامپوهای ضد انگل
  - (۲) استفاده از پودرهای و اسپری‌های ضد انگل
  - (۳) تزریق Ivermectin (آیورمکتین)
  - (۴) استفاده از سوم مایع همچون آمیتراز و یا دیازینون
- ۲۳- کدام یک از عفونت‌های پوستی زیر، جزو عفونت‌های نیمه عمقی محسوب می‌گردد؟
- (۱) Hot spot (۲) Impetigo (۳) Furunculosis (۴) Skin fold dermatitis
- ۲۴- در درماتیت حاد مرطوب سگ‌ها کدام فاکتور کمتر مطرح است؟
- (۱) سن
  - (۲) استعداد نژادی
  - (۳) هوای گرم و مرطوب
  - (۴) التهاب کیسه‌های آنال
- ۲۵- متداول‌ترین ناحیه رشد پولیپ‌های التهابی در گوش گربه‌ها کدام گزینه است؟
- (۱) سیستم وستیبول
  - (۲) تیمپانیک بولا
  - (۳) کانال خارجی نزدیک پرده صماخ
  - (۴) لاله گوش بخش ابتدایی کانال
- ۲۶- در همه موارد زیر نیاز به درمان سیستمیک وجود دارد، به جز:
- (۱) اوتیت خارجی شدید
  - (۲) اوتیت میانی
  - (۳) اوتیت خارجی ملایم
  - (۴) اوتیت داخلی
- ۲۷- در صورتی که پرده صماخ قابل رویت و سالم باشد، بهترین محلول برای شستشوی گوش کدام است؟
- (۱) مواد دترجنت و الکلیک
  - (۲) محلول نیم گرم (ولرم) نمکی با درجه حرارت ۳۶ درجه
  - (۳) بتادین بسیار غلیظ برای نرم کردن و جداسازی دربریمان و مومن
  - (۴) بهتر است در این گونه موارد که پرده صماخ سالم است، شستشو انجام نشود.
- ۲۸- ارتباط بیماری گوش با کدام بیماری آندوکرین به خوبی مشخص شده است؟
- (۱) هیپرتیروئیدیسم
  - (۲) هیپرآدرنوکورتیزیسم
  - (۳) هیپوآدرنوکورتیزیسم
- ۲۹- کدام گزینه از عوامل مستعد‌کننده پودودرماتیت (Pododermatitis) در خرگوش است؟
- (۱) دمای بالای محیط، کمبود تیامین
  - (۲) کمبود ویتامین B ، تراشه چوب کف بستر
  - (۳) درماتوفیتوز، استاف اورنوس
  - (۴) چاقی، میله‌های فلزی کف بستر

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۰- کدام مورد از جمله عوامل مستعد کننده بروز **Malocclusion & Root elongation** در خرگوش است؟
- (۱) نگهداری خرگوش به صورت Outdoor
  - (۲) استفاده از جیره‌های غنی از دانه غلات
  - (۳) استفاده از جیره‌های حاوی علوفه از جنس گیاهان گرامینه
  - (۴) استفاده از جیره‌های حاوی علوفه از جنس گیاهان لگومینه
- ۳۱- کدام عبارت در مورد خصوصیات آناتومیک دندان خرگوش صحیح است؟
- (۱) فقط دندان‌های آسیای خرگوش از نوع هیپسودونت (Hypsodont) هستند.
  - (۲) فقط دندان‌های پیشین خرگوش از نوع هیپسودونت (Hypsodont) هستند.
  - (۳) تمامی دندان‌های خرگوش از نوع هیپسودونت (Hypsodont) هستند.
  - (۴) فقط دندان‌های پیش آسیای خرگوش از نوع هیپسودونت (Hypsodont) هستند.
- ۳۲- همه عبارات زیر در مورد عارضه **Proliferative ileitis** در هامستر صحیح‌اند، به‌جز:
- (۱) پیش‌آگهی ضعیف و مرگ و میر بالا است.
  - (۲) عامل بیماری، باکتری Clostridium difficile است.
  - (۳) عارضه بیشتر در هامسترها جوان دیده می‌شود.
  - (۴) اسهال خونی از علائم مراحل پیشرفته بیماری است.
- ۳۳- همه عبارات زیر در مورد خصوصیات رفتاری هامسترها صحیح‌اند، به‌جز:
- (۱) هامسترها معمولاً شب‌ها جفت‌گیری می‌کنند.
  - (۲) هامسترها عادت به ذخیره مواد غذایی دارند.
  - (۳) هامسترها معمولاً به صورت گروهی زندگی می‌کنند.
  - (۴) بچه‌خواری معمولاً طی هفته اول پس از زایمان رخ می‌دهد.
- ۳۴- تجویز کورتیکواستروئیدها در کدام‌یک از بیماری‌های کبدی ممنوع است؟
- (۱) سیروز کبدی
  - (۲) هپاتیت مزمن فعال
  - (۳) کلائزیت لنفوسیتیک
  - (۴) بیماری‌های ویروسی کبد
- ۳۵- در خصوص فتق ناحیه پرینه کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) از علائم مهم در بیماران مبتلا اسهال‌های با منشاء روده بزرگ است.
  - (۲) بیشتر در سگ‌های مسن به دلیل پولیپ ناحیه رکتوم ایجاد می‌شود.
  - (۳) یکی از مهم‌ترین مخاطرات این بیماری می‌تواند بروز اورمی پس کلیوی باشد.
  - (۴) به دلیل شدت استعداد خونریزی این بیماران در معرض ابتلا به کم‌خونی قرار دارند.
- ۳۶- در خصوص اسهال‌های سالمونلایی در دام‌های کوچک کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) در اسهال‌های سالمونلایی انتخاب اول درمان اریتروماسین است.
  - (۲) آلوگی بیشتر همانند انسان توسط سالمونلایی ایجاد خواهد شد.
  - (۳) یکی از عوامل مهم بروز اسهال در سگ‌های باسن بالا است که ایجاد اسهالی مشابه پاروویروس خواهد کرد.
  - (۴) آلوگی بیشتر توسط سالمونلایی موریوم ایجاد می‌شود هرچند در سگ و گربه سالمونلایی نقش چندانی در بروز اسهال ندارد.

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۷- مشخصه آلودگی هلیکوباتریا بی در معده سگ‌ها کدام است؟

(۱) نفوذ سلول‌های نوتروفیلی در زیر مخاط

(۲) آلودگی بیشتر توسط گونه پیلوری ایجاد می‌شود.

(۳) آلودگی بیشتر توسط گونه بیزوژرونی ایجاد می‌شود.

(۴) نفوذ سلول‌های لنفوцитی و در مواردی نوتروفیلی در زیر مخاط

- ۳۸- کدام مورد باعث کاهش تونوستیه اسفنکتر پایینی مری می‌شوند؟

(۱) داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی

(۲) متوكلوپرامید

(۳) داروهای کلی نرژیک

(۴) غذاهای پروتئینی

- ۳۹- کدام مورد به احتمال بیشتر عامل کمپلکس گرانولومای انوزینوفیلی گربه می‌باشد؟

(۱) ازدیاد حساسیت

(۲) عفونت ویروسی

(۳) بیماری‌های با واسطه ایمنی

(۴) عفونت باکتریایی

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۶- میزان کدام هورمون، در اکثر گربه‌های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک از حد معمول بالاتر است؟
- (۱) هورمون رشد  
(۲) هورمون پرولاکتین  
(۳) هورمون کورتیزول  
(۴) هورمون تیروکسین
- ۴۷- کدام مورد، شایع‌ترین اختلال الکترولیتی در سگ‌های مبتلا به هیپوآدرنوکورتیزیسم می‌باشد؟
- (۱) افزایش پتاسیم - کاهش سدیم  
(۲) کاهش کلر - کاهش کلسیم  
(۳) کاهش سدیم - افزایش فسفات  
(۴) کاهش پتاسیم - افزایش سدیم
- ۴۸- کدام‌یک از ناهنجاری‌های زیر در دیابت قندی تیپ I شدیدتر از دیابت تیپ II می‌باشد؟
- (۱) هیپرتری گلیسریدمی  
(۲) هیبریلی روئینمی  
(۳) کتواسیدوز  
(۴) گلومرولوپاتی
- ۴۹- اختلال در کدام هورمون باعث سقط می‌گردد؟
- (۱) استروژن  
(۲) پرولاکتین  
(۳) پروژسترون  
(۴) FSH
- ۵۰- در کدام‌یک از مراحل سیکل جنسی غالبیت سلول‌ها با سلول‌های هیپرتروف همراه با هسته پیکنوزه می‌باشد؟
- (۱) استروس  
(۲) دی استروس  
(۳) آن استروس
- ۵۱- کدام اختلال غدد پستانی، غالباً پس از زایمان‌های زودرس یا جراحی سزارین دیده می‌شود؟
- (۱) گالاکتیا  
(۲) گالاکتوستاز  
(۳) آگالاکتوستاز  
(۴) آگالاکتیا
- ۵۲- کدام‌یک از داروها، در درمان سگ‌های مبتلا به اینترسی رحمی مناسب هستند؟
- (۱) محلول ۱۰ درصد گلوکز و پرولاکتین  
(۲) محلول ۱۰ درصد گلوکز و اکسی توسین  
(۳) محلول ۱۰ درصد بروگلوکونات کلسیم و پرولاکتین  
(۴) محلول ۱۰ درصد بروگلوکونات کلسیم و اکسی توسین
- ۵۳- برای درمان کراتیت سطحی مزمن از چه داروهایی کمک گرفته می‌شود؟
- (۱) تجویز داروهای کاهنده فشار داخلی کره چشم  
(۲) تجویز استروئیدهای موضعی و سیستمیک  
(۳) قطره‌های چشمی حاوی آنتی‌بیوتیک و ویتامین A  
(۴) تجویز روغن‌های معدنی برای کاهش میزان تخریش قرنیه
- ۵۴- شالازیون (Chalazion)، چه عارضه‌ای است؟
- (۱) عفونت غدد پلکی  
(۲) عفونت گابلت سل‌های ملتحمه  
(۳) تجمع ترشحات طبیعی غدد پلکی  
(۴) ادم ملتحمه ناشی از پر خونی
- ۵۵- کدام مورد جزء عالیم همیشگی کراتیت است؟
- (۱) درد  
(۲) میوزیس  
(۳) نتووسکولاریزیشن  
(۴) رنگ شدن با فلئورسین
- ۵۶- گلوكوم ثانويه با زاويه باريک (بسته) به چه علتی رخ می‌دهد؟
- (۱) هایفما  
(۲) انسداد مردمک  
(۳) مسطح بودن عنبيه  
(۴) اختلال بافت کلارزن

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| -۵۷ | میوزیس و کاهش فشار داخلی کره چشم از نشانی‌های کدام بیماری است؟  |  |
| (۱) | Descemetocoele (۲)  | Glaucoma (۱)                                   |
| (۲) | Corneal staphyloma (۴)  | Anterior Uveitis (۳)                           |
| -۵۸ | همه موارد زیر از مشخصه‌های آسم و برونشیت در گربه است، به جز:  |  |
| (۱) | گشاد شدن مجاری هوایی  | (۱) تشدید بیماری در سرما                       |
| (۲) | حضور انوزینوفیل‌ها و لمفوسیت‌ها در مجاری هوایی  | (۲) حضور ماست سل‌ها در مجاری هوایی             |
| (۳) |   | (۳) آنمی باعث کدام‌یک از انواع هیپوکسی می‌شود؟ |
| -۵۹ |   | (۱) Anoxic (۱)                                 |
| (۴) | anemic (۲)  | Cytotoxic (۳)                                  |
| -۶۰ | درمان استاندارد در آسم گربه کدام است؟   |  |
| (۱) | (۲) خلط‌آور و ضد انگل، برونوکودیلاتاتور   | (۱) ضد سرفه، خلط‌آور کورتون                    |
| (۲) | (۴) اکسیژن تراپی، کورتون و برونوکودیلاتاتور   | (۳) ضد سرفه، ضد انگل و اکسیژن تراپی            |
| -۶۱ | در مورد <b>Kennel cough</b> ، کدام جمله صحیح‌تر است؟  |  |
| (۱) | (۱) بیماری معمولاً با علایم عمومی همراه نیست و حیوان اکثراً دچار سرفه‌های مداوم و خشک و خشن است.        |  |
| (۲) | (۲) برای درمان حتماً باید از آنتی‌بیوتیک و ضدسرفه و ضد التهاب استفاده نمود.                             |  |
| (۳) | (۳) در لارنژیت حاد هم دیده می‌شود.  |  |
| (۴) | (۴) موارد ۲ و ۳   |  |
| -۶۲ | در چه موقعی تشخیص وجود لنف در ترشحات محوطه صدری قطعی می‌شود؟  |  |
| (۱) | (۲) میزان کلسترول نمونه از خون بیشتر باشد.  | (۱) نمونه ظرف مدت کوتاهی منعقد می‌گردد.        |
| (۲) | (۳) نمونه از چسبندگی بالایی برخوردار باشد.  | (۲) میزان تری‌گلیسرید نمونه از خون بیشتر باشد. |
| -۶۳ | کدام جمله در مورد آسپرژیلوز بینی سگ‌ها درست است؟  |  |
| (۱) | (۱) به طور کلی بیماری بیشتر در نژادهای برآکیوسفال سگ‌ها مشاهده می‌شود.                                  |  |
| (۲) | (۲) در تشخیص آزمایشگاهی معمولاً آزمایش‌های هماتولوژی و بیوشیمیابی طبیعی هستند.                          |  |
| (۳) | (۳) نتایج منفی آزمایش‌های سرولوژیک یا عدم کشت جرم تشخیص آسپرژیلوز بینی را رد می‌نمایند.                 |  |
| (۴) | (۴) روش‌های سی تی اسکن (CT) و ام ار ای (MRI) حساسیت چندانی برای تشخیص بیماری ندارند.                    |  |
| -۶۴ | کدام مورد، شایع‌ترین علائم نورولوژیک در عفونت ناشی از <b>FIV</b> در گربه‌ها است؟                        |  |
| (۱) | (۲) تشنج  | (۱) فلجي                                       |
| (۲) | (۴) اشکال در خوابیدن  | (۲) تغییرات رفتاری                             |
| -۶۵ | کدام عبارت در مورد پیتوسپیروز سگ‌ها صحیح است؟   |  |
| (۱) | (۱) واکسن‌های زنده تخفیف حدت یافته بر نوع کشته برتری دارند.   |  |
| (۲) | (۲) نتایج تست‌های سرولوژی اغلب در هفته اول مثبت می‌گردند.   |  |
| (۳) | (۳) واکسیناسیون سگ‌ها اصولاً با اینمی طولانی همراه نیست و می‌باشد تا پایان عمر سالیانه ادامه یابد.      |  |
| (۴) | (۴) واکسیناسیون بر علیه بعضی سرو واریته‌ها موجب حفاظت متقاطع علیه دیگر سرو واریته‌ها می‌شود.            |  |
| -۶۶ | در کدام‌یک از مراحل بیماری کرم قلب، بلافاصله بعد از تشخیص داروی <b>Melarsomine</b> رامی‌توان تجویز کرد؟ |  |
| (۱) | stage 1 , 2 (۴)   | stage 3 (۳)                                    |
|     |   | stage 2 (۲)                                    |
|     |   | stage 1 (۱)                                    |

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۶۷- کدام عبارت در مورد پان‌لکوپنی گربه‌ها (FPV) صحیح است؟
- (۱) ویروس FPV بسیار حساس است و سریعاً در محیط از بین می‌رود.
  - (۲) یکی از راه‌های تشخیص، شناسایی آنتی‌ژن ویروس در مدفوع است.
  - (۳) انتقال عفونت معمولاً از راه تماس مستقیم گربه حساس با گربه بیمار است و انتقال غیرمستقیم کمتر مطرح می‌باشد.
  - (۴) برای درمان این بیماری تأمین آب و الکتروولیت کافی است و سرم‌های هایپرایمون برخلاف سگ کارآبی چندانی ندارند.
- ۶۸- کدام جمله در مورد عفونت پارورو ویروسی سگ‌ها (CPV) درست است؟
- (۱) آزمایش‌های تشخیص آنتی‌ژن در مدفوع در هفته دوم بیماری معمولاً منفی کاذب هستند.
  - (۲) سگ‌های بهبود یافته تا ماهها آنتی‌ژن ویروس را از دستگاه گوارش دفع می‌نمایند.
  - (۳) آزمایش‌های تشخیص آنتی‌ژن در مدفوع ممکن است در پی واکسیناسیون اخیر منفی کاذب گردد.
  - (۴) آزمایش‌های تشخیص آنتی‌ژن در مدفوع سگ‌ها برای تشخیص آنتی‌ژن در مدفوع گربه‌های دچار پان‌لکوپنی (FPV) نمی‌توانند استفاده گردد.
- ۶۹- کدام مورد در ارتباط با مایکوپلاسموز هموتروپیک (هموبارتولوز) گربه‌ها صحیح است؟
- (۱) کم‌خونی به طور عمده ناشی از همولیز داخل عروقی است.
  - (۲) کم‌خونی از نوع جبران شونده است و تست کومبز منفی می‌گردد.
  - (۳) کم‌خونی به طور عمده ناشی از اریتروفاغوسیتوز خارج عروقی است.
  - (۴) کم‌خونی از نوع غیرجبران شونده است و تست کومبز مثبت می‌گردد.
- ۷۰- کدام عبارت در مورد توکسوبلاسموز گربه‌ها صحیح است؟
- (۱) سیکل آنترو اپی‌تلیال پس از خوردن اووسیست یا تاکی‌زوایت سریع‌تر از خوردن کیست بافتی دارای برادی زوایت تکمیل می‌شود.
  - (۲) سیکل آنترو اپی‌تلیال پس از خوردن کیست بافتی دارای برادی زوایت سریع‌تر از خوردن اووسیست تکمیل می‌شود.
  - (۳) توکسوبلاسموز پس از تولد خطرناک‌تر از توکسوبلاسموز پیش از تولد است.
  - (۴) گربه‌ها هنگام دوره دفع اووسیست معمولاً بیمار هستند.
- اصول معاینه دام:
- ۷۱- منظور از دندان ۳۰۴ کدام دندان است؟
- (۱) Canine پایین سمت چپ
  - (۲) Canine بالا سمت چپ
  - (۳) Canine پایین سمت راست
  - (۴) Canine بالا سمت راست
- ۷۲- در چه سنی از آبستنی در سگ‌ها می‌توان از طریق ملامسه شکمی آبستنی را تأیید کرد؟
- (۱) ۱۲ روزگی
  - (۲) ۲۱ روزگی
  - (۳) ۳۵ روزگی
  - (۴) ۴۲ روزگی
- ۷۳- کدام یک از سرم‌های زیر «هیپوتونیک» هستند؟
- (۱) هتاستارج؛ تاستارج
  - (۲) رینگرلاکتان؛ نورموسول
  - (۳) دکستروز ۰/۵٪؛ سالین ۹٪
- ۷۴- قسمت دیافراگم گوشی پزشکی برای شنیدن چه نوع صدای‌هایی کاربرد دارد؟
- (۱) صدای‌های با فرکانس پایین
  - (۲) صدای‌های غیر طبیعی قلب
  - (۳) صدای‌های مرمری مادرزادی

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰

206F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تممرکز)

- ۷۵- شنیدن صدای ویز در هنگام بازدم نشان‌دهنده کدام مورد است؟

(۲) فقط دیافراگمی      (۱) برونکوبینومونی

(۴) انسداد مجرای هوایی درون قفسه سینه      (۳) پنوموتوراکس

- ۷۶- در هنگام ادم ریه کدامیک از صدای‌های اضافی و در چه زمانی شنیده می‌شود؟

(۲) صدای کراکل در ابتدای دم      (۱) صدای ویز در دم و بازدم

(۴) صدای کراکل در انتهای دم      (۳) صدای کراکل در ابتدای بازدم

- ۷۷- در تشخیص نوع گلوبکوم از کدام وسیله استفاده می‌شود؟

(۴) افتالموسکوپ      (۳) گونیوسکوپ      (۲) تنومتر      (۱) Slit lamp

- ۷۸- کدامیک از ضایعات پوستی، جزو ضایعات ثانویه محسوب می‌شود؟

Excoriation (۴)      Macula (۳)      Nodule (۲)      Cyst (۱)

- ۷۹- همه قارچ‌های زیر به هنگام استفاده از چراغ وود، تولید رنگ فلورسانس می‌کنند، به جز:

(۲) میکروسپیروم کنیس      (۱) میکروسپیروم اودوئینی

(۴) میکروسپیروم دیستورتوم      (۳) میکروسپیروم جیپسیوم

- ۸۰- محل شروع ضایعه پانوس در اغلب موارد از چه ناحیه‌ای می‌باشد؟

(۱) از هر ناحیه‌ای از اطراف لیمبوس شروع می‌شود.

(۲) ساعت ۹ چشم راست و ساعت ۳ چشم چپ

(۳) ساعت ۹ چشم چپ و ساعت ۳ چشم راست

(۴) محل شروع پانوس از ناحیه نزدیک بینی در هر دو چشم است.

## رادیولوژی دامپزشکی:

- ۸۱- در چندمین روز آبستنی گربه‌ها می‌توان از طریق رادیوگرافی تعداد جنین‌ها را مشخص کرد؟

(۲) روز ۲۱      (۱) روز ۲۲

(۴) برای شمارش تعداد جنین‌ها، سونوگرافی بهتر است.      (۳) روز ۴۰

- ۸۲- کدام عبارت صحیح است؟

(۱) دانسیته بافتی همان رادیو اوپسیتی است.

(۲) دانسیته بافتی همان دانسیته رادیوگرافی است.

(۳) دانسیته بافتی با دانسیته رادیوگرافی نسبت معکوس دارد.

(۴) اوپسیته بافتی با دانسیته رادیوگرافی نسبت مستقیم دارد.

- ۸۳- اکوئنسیته سنگ کلیه معمولاً چگونه است؟

Anechoic to hypoechoic (۲)      Anechoic (۱)

Hyperechoic with acoustic shadow (۴)      hypoechoic (۳)

- ۸۴- از کدام مورد می‌توان برای تعیین نوع حیوان از روی رادیوگراف استفاده کرد؟

(۲) صفحه رشد پایینی اولنا در سگ‌ها      (۱) تعداد و حجم و اندازه کلیه‌ها

(۴) جزئیات سروزی در محوطه بطئی سگ‌ها      (۳) حجم قفسه سینه در گربه‌ها

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۸۵ - همه ساختارهای زیر در اولتراسونوگرافی کبد سالم مشاهده می‌شوند، به جزء:
- (۱) دیواره کیسه صفراء
  - (۲) سیاهرگ‌های باب
  - (۳) سیاهرگ‌های کبدی
  - (۴) سرخرگ‌های کبدی

## کلینیکال پاتولوژی:

- ۸۶ - حضور کدام کریستال ادراری، لزوماً نشان دهنده یک اختلال است؟
- (۱) آمونیوم اورات
  - (۲) فسفات آمورف
  - (۳) فسفات آمونیوم منیزیم
  - (۴) سولفاکریستال
- ۸۷ - ضدانعقاد انتخابی برای تست‌های انعقادی، کدام است؟
- (۱) EDTA
  - (۲) NaF
  - (۳) سیترات
  - (۴) هپارین
- ۸۸ - در صورت مشاهده کست‌های WBC در ادرار یک سگ، به چه چیزی مشکوک می‌شوید؟
- (۱) نشت گلومروالی
  - (۲) خونریزی کلیوی
  - (۳) دزنسانس مزمن توبول‌های کلیوی
  - (۴) پیلوونفریت (عفونت کلیه)
- ۸۹ - کمبود کدام مکمل‌ها در ایجاد کاردیومیوپاتی‌های اتساعی در سگ و گربه به اثبات رسیده است؟
- (۱) آرژینین و متیونین
  - (۲) آسپاراژین و لیزین
  - (۳) تورین و کاربینتین
  - (۴) هیستیدین و پروولین
- ۹۰ - اندازه‌گیری میزان گلوگز و pH مایع صفاقی، به تشخیص کدام مایع کمک می‌کند؟
- (۱) آنزینوفیلیک
  - (۲) سپتیک
  - (۳) نوپلاستیک
  - (۴) هموراژیک

# پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

206F

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیرگز)