

# پیاچ دی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

کد کنترل


174

E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



174E

صبح جمعه  
۱۳۹۶/۱۲/۴  
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۷

### رشته مدیریت منابع خاک (کد ۲۴۲۱)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	فا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: شبیه و حاصلخیزی خاک – فیزیک و حفاظت خاک – ردیبدنده و ارزیابی خاک – فیزیک و حفاظت خاک پیشرفته – پیسدایش و ردیبدنده خاک بنده خاک پیشرفته – ارزیابی تناسب اراضی	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جای، تکیه و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی انتخاب حلقی و حرفی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای معرفات رفتار می‌شود.

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

174E

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- معادله گاپون بیان کننده ارتباط بین کدام موارد است؟
- SAR و ESP (۲) EC و SAR (۱)  
ESR و ESP (۴) SAR و ESR (۳)
- ۲- در کدام خاک، pH سوسپانسیون خاک در محلول ۱٪ مولار  $\text{CaCl}_2$  در نسبت ۱:۲ بزرگ‌تر از ۱:۱ است؟
- (۱) خاک شور (۲) خاک آهکی (۳) خاک غیرشور (۴) خاک غیرآهکی
- ۳- در کلیه مقادیر pH، خاک‌های حاوی کدام کانی، دفع آنیونی بیشتری را نشان می‌دهند؟
- (۱) ساپونایت (۲) ورمی کولايت (۳) کانولینایت (۴) مونت موریلونایت
- ۴- کدام مورد، درست است؟
- (۱) تمایل به هیدرولیز  $\text{Fe}^{3+}$  بیشتر از  $\text{Al}^{3+}$  است زیرا الکترونگاتیوی بیشتری دارد.  
(۲) تمایل به هیدرولیز  $\text{Fe}^{3+}$  بیشتر از  $\text{Al}^{3+}$  است زیرا شعاع کریستالوگرافی کوچک‌تری دارد.  
(۳) تمایل به هیدرولیز  $\text{Al}^{3+}$  بیشتر از  $\text{Fe}^{3+}$  است زیرا شعاع کریستالوگرافی بزرگ‌تری دارد.  
(۴) تمایل به هیدرولیز  $\text{Al}^{3+}$  بیشتر از  $\text{Fe}^{3+}$  است زیرا الکترونگاتیوی کمتری دارد.
- پایدارترین شکل اکسیدهای آهن و آلومینیم به ترتیب کدام است؟
- $\text{Al}_2\text{O}_3$  و  $\text{FeOOH}$  (۱)  $\text{AlOOH}$  و  $\text{Fe(OH)}_2$  (۲)  
 $\text{Al(OH)}_2$  و  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (۳)  $\text{Al(OH)}_2$  و  $\text{FeOOH}$  (۴)
- ۵- اگر فرمول شیمیایی نیم‌سلول یک کانی سیلیکاتی لایه‌ای به صورت زیر باشد، خالص بار لایه‌ای این کانی چقدر است؟  
 $(\text{Al}_{1/28}^{3+} \text{Si}_{2/72}^{4+})(\text{Mg}_{2/36}^{2+} \text{Fe}_{0/48}^{3+} \text{Al}_{0/16}^{3+})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
- ۰/۸۰ (۱) -۰/۶۴ (۲) -۰/۴۸ (۳) -۰/۳۲ (۴)

# پیاچ دی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

174E

صفحه ۳

-۷ CEC دو خاک A و B (که به روش باور در  $pH = 8/2$  اندازه‌گیری شده‌اند) برابر با ۲۰ سانتی‌مول بار بر کیلوگرم است. خاک A دارای  $pH = 7/3$  و خاک B دارای  $pH = 7/9$  است، کدام مورد درباره مقایسه CEC این دو خاک صدق می‌کند؟

(۱) CEC واقعی (در حالت طبیعی) خاک A بزرگ‌تر از B است.

(۲) CEC واقعی (در حالت طبیعی) خاک A برابر با خاک B است.

(۳) CEC واقعی (در حالت طبیعی) خاک A کوچک‌تر از خاک B است.

(۴) اطلاعات موجود برای پاسخ کافی نبوده و به سهم بار دانمی و متغیر در هر یک از خاک‌ها بستگی دارد.  
کدام اکسی‌آنیون، تمایل بیشتری به جذب سطحی اختصاصی توسعه اجزای خاک دارد؟

(۱)  $MoO_4^{2-}$  (۴)  $SiO_4^{4-}$  (۳)  $SeO_4^{2-}$  (۲)  $AsO_4^{3-}$

-۹ با فرض یکسان بودن بار لایه‌ای، کدام کانی توانایی کمتری برای ثبت پتانسیم دارد؟

(۱) بیدلیت (۲) ساپونیت (۳) هکتوریت (۴) ناترونیت

-۱۰ با افزایش جذب اختصاصی یون فسفات ( $PO_4^{3-}$ ) به ترتیب بار سطحی و ZPC چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) افزایش - افزایش (۲) افزایش - کاهش (۳) کاهش - کاهش (۴) کاهش - افزایش

-۱۱ به کدام دلیل پخشیدگی و تبادل یونی در ریشه فرایندهای غیرفعال هستند؟

(۱) جذب غیرانتخابی است و نیاز به انرژی متابولیکی ندارد.

(۲) فرایندها انتخابی هستند و نیاز به انرژی حاصل از متابولیسم دارند.

(۳) فرایند جذب صرفاً در خلاف شب غلط و در جهت شبکتیکی است.

(۴) جذب در جهت شب غلط و شبکتیکی و برای یون‌ها به صورت انتخابی است.

-۱۲ از میان عناصر پر مصرف کدام مورد را می‌توان یک منبع تجدیدپذیر دانست؟

(۱) فسفر (۲) پتاسیم (۳) آهن (۴) نیتروژن

-۱۳ گیاهانی که قادرند خود را با شرایط باتلاقی (کمبود شدید اکسیژن) سازگار نمایند، چگونه این سازگاری را انجام می‌دهند؟

(۱) ملات را در خود به جای الكلاتیلیک جمع می‌کنند.

(۲) ساخت فیتوهormون‌ها را درون خود افزایش می‌دهند.

(۳) تجزیه اکسیداسیونی قندها را افزایش یا کاهش می‌دهند.

(۴) اکسیژن را از طریق اندام هوایی به ریشه منتقل نموده و ریزوسفر را اکسیدی می‌کنند.

-۱۴ آزمایشگاهی میزان نیاز کودی محصول زراعی را برای P.K.N به ترتیب ۵۰، ۹۰ و ۱۰۰ تعیین کرده است. اگر بخواهیم آن را از منبع کود دامی با نسبت ۵/۰، ۲۵/۰ و ۵/۰ تأمین کنیم، چندتن در هکتار رکود مورد نیاز است؟

(۱) ۱۵

(۲) ۲۰

(۳) ۲۵

(۴) ۳۰

-۱۵ کمبود روی در گیاه موجب کدام تغییرات می‌شود؟

(۱) افزایش سنتز تریپتوفان و کاهش اکسین

(۲) کاهش سنتز تریپتوفان و افزایش اکسین

(۳) کاهش فعالیت IAA اکسیداز و افزایش اکسین

(۴) افزایش فعالیت IAA اکسیداز و کاهش اکسین

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۱۶ در گستره pH خاک بین ۵-۷/۵ اکثر خاک‌های کشاورزی ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) تأمین شده از ماده آلی خاک به‌طور عمده از کدام مورد تأمین می‌شود؟
- (۱) تجزیه گروه‌های پلی‌فنلی و آزادسازی OH و کسب بار مثبت
  - (۲) گروه‌های آمینی (R - NH<sub>2</sub>) در نتیجه آزادسازی H و کسب بار منفی
  - (۳) گروه‌های هیدروکسیلی (R - OH) در نتیجه آزادسازی H و کسب بار منفی
  - (۴) گروه‌های کربوکسیلی (R - COOH) در نتیجه آزادسازی H و کسب بار منفی
- ۱۷ کدام مورد درباره تناوب زراعی یونجه - گندم درست است؟
- (۱) بر اثر زیادی نیتروژن، فسفر و پتاسیم، ممکن است گندم دچار خوابیدگی شود.
  - (۲) بر اثر سمیت اسیدهای آلی و کمبود پتاسیم، ممکن است رشد ریشه گندم کاهش یابد.
  - (۳) تناوب یونجه - گندم سبب کاهش نیاز گندم به کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم می‌شود.
  - (۴) بر اثر کمبود فسفر و پتاسیم و زیادی نیتروژن، ممکن است گندم به عارضه ورس (Lodging) مبتلا شود.
- ۱۸ در طی فرایند هوادیدگی میکا و تغییر شکل آن به کانی‌های رسی، به ترتیب در صدد پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی آن چه تغییری می‌کند؟
- (۱) کاهش - کاهش
  - (۲) افزایش - افزایش
  - (۳) کاهش - افزایش
  - (۴) افزایش - کاهش
- ۱۹ به کدام دلیل، قانون دارسی در خاک‌های رسی در گردایان‌های پایین کاربردی نیست؟
- (۱) آشفته بودن جریان
  - (۲) بار منفی ذرات رسی
  - (۳) افزایش سهولت حرکت آب در نزدیکی سطح ذرات رسی
  - (۴) افزایش گرانزوی و چگالی آب در نزدیکی سطح ذرات رسی
- ۲۰ با کاهش رطوبت خاک، کدام فرایند در خاک افزایش می‌باید؟
- (۱) سرعت انتقال گرما از سطح به عمق خاک
  - (۲) نفوذپذیری ذاتی خاک (Permeability)
  - (۳) ضریب آبگذری خاک (Hydraulic Conductivity)
  - (۴) سرعت نفوذ اولیه آب به خاک (Initial Infiltration Rate)
- ۲۱ کدام مورد درست است؟
- (۱) غلظت CO<sub>2</sub> در هوای خاک تقریباً با غلظت CO<sub>2</sub> در هوای اتمسفر برابر است.
  - (۲) غلظت CO<sub>2</sub> در هوای خاک ۳ تا ۸ برابر غلظت CO<sub>2</sub> در اتمسفر بالای خاک است.
  - (۳) غلظت CO<sub>2</sub> در هوای خاک ۳۰٪ درصد غلظت CO<sub>2</sub> در اتمسفر بالای خاک است.
  - (۴) غلظت CO<sub>2</sub> در اتمسفر بالای خاک ۳۰٪ درصد غلظت CO<sub>2</sub> در هوای خاک است.
- ۲۲ به ترتیب کدام جزء، در هدایت گرمایی خاک، کمترین و بیشترین سهم را بر عهده دارد؟
- (۱) هوا - جامد
  - (۲) هوا - آب
  - (۳) آب - جامد

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

174E

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

-۲۳- افزایش نسبت پوکی خاک باعث کاهش کدام پارامتر آن می‌شود؟

$$\frac{D_b}{D_s} = \frac{1}{1+e}$$

(۲) تخلخل تهوبهای

(۱) تخلخل کل

(۴) نسبت جرم مخصوص ظاهری به حقیقی

(۳) رطوبت اشباع

-۲۴- علت اساسی کاهش مرتب سرعت نفوذ آب به خاک در طول فرایند نفوذ کدام است؟

(۱) کاهش تدریجی تخلخل خاک

(۱) کاهش تدریجی شیب پتانسیل ثقلی

(۴) کاهش تدریجی ارتفاع آب در سطح خاک

(۳) کاهش تدریجی شیب پتانسیل ماتریک

-۲۵- اگر مدل ون گنوختن برای دو خاک به ترتیب به صورت  $S_e = [1 + (0.005h)^{1/6}]^{1/4}$  و  $S_e = [1 + (0.05h)^{1/7}]^{1/3}$  باشد، کدام مورد درست است؟

(۱) خاک اول رسی و خاک دوم شنی است.

(۲) خاک اول درشت‌بافت و خاک دوم ریزبافت است.

(۳) خاک اول متراکم و خاک دوم ساختمان دار است.

(۴) مکش در نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی خاک اول بزرگ‌تر از خاک دوم است.

-۲۶- در یک پروفیل خاک، سطح ایستابی در عمق یک متری بوده و آب از طریق صعود مویینگی تا سطح خاک را مروط نموده است. مقدار پتانسیل ماتریک تحت شرایط تبخیر در سطح خاک چند متر است؟

(۱) کمتر از ۱

(۲) بیشتر از ۱

(۳) بیشتر از ۱

(۴) بیشتر از ۱

-۲۷- از یک خاک غیرقابل انبساط از مزرعه، نمونه‌ای به حجم ۱۰۰ سانتی‌متر مکعب برداشته‌ایم. در آزمایشگاه مقادیر جرم مروط ۱۵۰ گرم، جرم اشباع ۱۷۰ گرم، جرم خشک ۱۲۰ گرم محاسبه شده است. تخلخل تهوبه این خاک چند درصد است؟ (چگالی آب یک گرم بر سانتی‌متر مکعب فرض شود).

(۱) ۱۰

(۲) ۲۰

(۳) ۳۰

(۴) ۳۵

-۲۸- درجه توراکم یک خاک را با کدام مورد می‌توان ارزیابی کرد؟

(۱) منحنی تجمعی ذرات خاک (Cumulative particle size distribution)

(۲) پروفیل رطوبتی خاک (Soil Moisture Profile)

(۳) منحنی رطوبتی خاک (Soil Moisture Curve)

(۴) پروفیل مکش خاک (Soil Suction Profile)

-۲۹- کدام ویژگی باران، اثر مهم‌تری در فرسایش خاک دارد؟

(۱) مدت

(۲) شدت

(۳) مقدار

(۴) اندازه قطرات

-۳۰- در یک زمین مسطح، حداکثر ارتفاع و فاصله افقی پرتاب ذرات در اثر پاشمان، به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟

(۱) ۱-۱/۵

(۲) ۱-۰/۵

(۳) ۰/۵-۱

(۴) ۱-۰/۵

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۱- در مدل USLE، برای اصلاح اثر شکل شیب، عامل توپوگرافی (LS) در شیب‌های محدب و مقعر به ترتیب از راست به چپ در چه عددی ضرب می‌شود؟
- (۱) ۰/۷۵-۱/۲۵ (۲) ۱/۲۵-۰/۷۵ (۳) ۱/۲-۰/۸ (۴) ۰/۸-۱/۲
- ۳۲- رابطه CIA، برای محاسبه کدام عامل است؟
- (۱) زمان مرکز (۲) ارتفاع رواناب (۳) حجم کامل رواناب (۴) حداکثر دبی رواناب
- ۳۳- ارتفاع رواناب ناشی از باران در کدام حالت بیشترین مقدار است؟ (تخمین به روش CN)
- (۱) کشت غلات و خاک با گروه هیدرولوژیکی D (۲) کشت غلات و خاک با گروه هیدرولوژیکی C (۳) زمین آیش و خاک با گروه هیدرولوژیکی D (۴) زمین آیش و خاک با گروه هیدرولوژیکی C
- ۳۴- اگر دبی رودخانه‌ای قبل از شروع بارندگی ۴۰ مترمکعب بر دقیقه باشد و در طی یک بارندگی ۲ ساعته، دبی متوسط آن به ۹۰ مترمکعب بر دقیقه برسد، میانگین ارتفاع رواناب ناشی از این باران برای حوضه‌ای به مساحت ۶۰ هکتار چند میلی‌متر است؟
- (۱) ۶ (۲) ۱۰ (۳) ۱۲ (۴) ۱۸
- ۳۵- اگر میزان فرسایش خاک در یک منطقه ۱۵ تن در هکتار در سال باشد، پس از چند سال یک سانتی‌متر از خاک سطحی در اثر فرسایش از بین می‌رود؟ (جرم مخصوص ظاهری خاک  $1.5 \text{ g cm}^{-3}$  است).
- (۱) ۰/۱ (۲) ۱ (۳) ۱۰ (۴) ۱۰۰
- ۳۶- تراس‌های آبراهه‌ای مسطح (بانکت غلات) در شیب‌های چند درصد احداث می‌شوند؟
- (۱) کمتر از ۵ (۲) ۱۲ تا ۲۵ (۳) ۱۸ تا ۶۰ (۴) ۱۲ تا ۱۸
- ۳۷- در خاک مطالعه شده با افق‌های  $C_1$ ،  $C_2$ ،  $B_z$  و  $A_z$  کدام فرایند خاک‌سازی غالب است؟
- Melanization (۱) Salinization (۱)  
Cumulization (۴) Alkalization (۳)
- ۳۸- امکان تشکیل کانی مونت موریلدونیت و به تبع آن تشکیل خاک‌های ورتیسول در کدام بخش از یک دامنه بیشتر است؟ (Hillslope)
- (۱) پنجه شیب (Toeslope) (۲) رأس شیب (Summit) (۳) شانه شیب (Shoulder)

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۹- در نیمیرخ یک خاک، انقطاع سنتگی (Discontinuity) وجود دارد، کدام مورد درباره نام‌گذاری افق‌های این خاک درست است؟
- A,B ,2B ,2C (۲) A,B1 ,B2 ,C (۱)  
A,Bt21 ,Bt22 ,C (۴) A,Bt1 ,Bt2 ,C (۳)
- ۴۰- اشباع بازی پایین، مواد آلی نسبتاً بالا و ساختمندان خوب از ویژگی‌های کدام افق مشخصه سطحی خاک‌ها است؟
- Anthropic (۴) Umbric (۳) Mollic (۲) Ochric (۱)
- ۴۱- در یک منطقه نیمه‌خشک اگر میزان تبخیر و تعرق بیست برابر نزوالت باشد و جریان آب به وسیله لوله‌های موئین به سمت بالا باشد و افق‌های مشخصه کلسيک سالیک و جیپسیک در خاک تشکیل شده باشند، ترتیب قرار گرفتن آن‌ها از سطح به عمق چگونه است؟
- (۱) سالیک، کلسيک، جیپسیک، سالیک  
(۲) کلسيک، جیپسیک، سالیک  
(۳) سالیک، جیپسیک، کلسيک  
(۴) جیپسیک، سالیک، کلسيک
- ۴۲- اگر رژیم رطوبتی خاک اریدیک، رژیم حرارتی آن ترمیک و دارای افق‌های آرجیلیک و پتروکلسيک در عمق یک متري از سطح خاک باشد، رده‌بندی این خاک کدام است؟
- (۱) پتروآرجید (Petroargid) (Calcid)  
(۲) کلسيد (Calcid)  
(۳) کمبید (Cambid)  
(۴) آرجید (Argid)
- ۴۳- حضور مواد آلی با حداقل حداقل تجزیه و تخریب (درجه تجزیه) در خاک‌ها به ترتیب با کدام عناصر سازنده نمایش داده می‌شود؟
- Per - Turb (۴) Hum - Hem (۳) Hist - Fol (۲) Fibr - Sapr (۱)
- ۴۴- کدام مورد بیانگر کلاس‌های تناسب اراضی با محدودیت‌های (بدون محدودیت - محدودیت کم - محدودیت متوسط - محدودیت زیاد) در روش محدودیت ساده یا حداقل محدودیت است؟
- S<sub>۴</sub> - S<sub>۳</sub> - S<sub>۲</sub> - S<sub>۱</sub> (۲) S<sub>۷</sub> - S<sub>۶</sub> - S<sub>۵</sub> - S<sub>۴</sub> (۱)  
S<sub>۴</sub> - S<sub>۳</sub> - S<sub>۲</sub> - S<sub>۱</sub> (۴) N<sub>۱</sub> - S<sub>۷</sub> - S<sub>۶</sub> - S<sub>۵</sub> (۳)
- ۴۵- اگر فرمول طبقه‌بندی اراضی  $\frac{4m}{A-EO}$  باشد، قابلیت اراضی برای زراعت آبی با آبیاری سطحی کدام مورد است؟
- (۱) اراضی بدون محدودیت بافت خاک سطحی بوده و در کلاس یک (I) قرار می‌گیرد.  
(۲) اراضی با محدودیت متوسط بافت خاک سطحی بوده و در کلاس سه (III) قرار می‌گیرد.  
(۳) اراضی با محدودیت کم نفوذپذیری خاک تحتانی بوده و در کلاس دو (II) قرار می‌گیرد.  
(۴) اراضی بدون محدودیت نفوذپذیری خاک تحتانی، بافت خاک سطحی، با شیب کمتر از ۲ درصد و بدون فرسایش آبی و پستی و بلندی بوده و در کلاس یک (I) قرار می‌گیرد.
- ۴۶- در ارزیابی تناسب اراضی برای نباتات خاص، **Crop requirements** شامل کدام گروه از موارد است؟
- (۱) خصوصیات اقلیمی، زمین نما و خاک  
(۲) خصوصیات زمین نما، خاک  
(۳) خصوصیات اقلیمی، خاک  
(۴) خصوصیات اقلیمی، زمین نما
- ۴۷- کدام عامل، اثر بیشتری در حرکت بخار آب در خاک دارد؟
- (۱) گرادیان دمای خاک  
(۲) گرادیان رطوبت خاک  
(۳) گرادیان غلظت املاح در خاک  
(۴) گرادیان غلظت گاز کربنیک

# پیاچ دی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری


- ۴۸- اگر  $d_1 = 20$  میلی‌متر، جرم مخصوص ظاهری آن نصف جرم مخصوص حقیقی و مقدار ضریب  $C$  برابر با  $4/0$  باشد، ارتفاع صعود موئینه آب در این خاک چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۲
- (۲) ۴
- (۳) ۲۰
- (۴) ۴۰

- ۴۹- کدام مورد درباره بافت خاک درست است؟

- (۱) انحراف معیار هندسی اندازه ذرات ( $\sigma_g$ ) با ریزی و درشتی ذرات خاک مرتبط است.
- (۲) خاک‌هایی که در بالای نمودار جدید بافت خاک قرار دارند، از نظر دانه‌بندی یکنواخت‌تر هستند.
- (۳) وقتی درصد شن در خاک ۱۰۰ باشد، انحراف معیار هندسی اندازه ذرات ( $\sigma_g$ ) بیشترین است.
- (۴) انحراف معیار هندسی اندازه ذرات ( $\sigma_g$ ) با افزایش گستردگی توزیع اندازه ذرات، افزایش می‌یابد.

- ۵۰- اگر منحنی رطوبتی خاکی (Soil Moisture Curve) قبل و بعد از تراکم خاک به صورت نمودار زیر باشد، کدام



- تخلخل در اثر تراکم خاک افزایش یافته است؟
- (۱) کل
  - (۲) ریز
  - (۳) متوسط
  - (۴) درشت

- ۵۱- ظرفیت حرارتی حجمی خاک با کدام پارامتر رابطه مستقیم دارد؟

- (۱) تهییه خاک
- (۲) جرم مخصوص ظاهری
- (۳) مکش ماتریک خاک
- (۴) جرم مخصوص حقیقی خاک

- ۵۲- اگر مدل فیلیپ در مورد نفوذ آب برای دو خاک به ترتیب به صورت زیر باشد، کدام مورد درست است؟

$$(1): i(t) = 0.5t^{-0.5} + 20$$

$$(2): i(t) = 2t^{-0.5} + 2$$


- (۱) خاک اول متراکم و خاک دوم ساختمان دار است.
- (۲) توانایی جذب آب خاک اول بیشتر از خاک دوم است.
- (۳) توانایی انتقال آب خاک دوم بیشتر از خاک اول است.
- (۴) خاک اول سبک‌بافت و خاک دوم سنگین‌بافت است.

- ۵۳- در ستون خاک عمودی به ضخامت  $10\text{ cm}$ ، شدت جريان ورودی از بالا  $3\text{ cm h}^{-1}$  و خروجی از انتهای آن  $4\text{ cm h}^{-1}$  است. نرخ تغییرات زمانی رطوبت در این خاک چند  $\text{h}^{-1}$  است؟

- (۱)  $-0.02$
- (۲)  $-0.01$
- (۳)  $+0.025$
- (۴)  $+0.12$

# پیاچ دی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

۵۴- منحنی رطوبتی دو خاک A و B در شکل زیر نشان داده شده است. این دو خاک در تماس کامل با هم قرار گرفته‌اند. رطوبت حجمی خاک A، ۰/۲۸ و خاک B، ۰/۱۵ است. کدام مورد درباره جریان آب بین دو خاک درست است؟



- (۱) آب از خاک A به خاک B جریان می‌یابد.
- (۲) آب از خاک B به خاک A جریان می‌یابد.
- (۳) جریان آب بین دو خاک صورت نمی‌گیرد.
- (۴) بستگی به اختلاف پتانسیل اسمزی بین دو خاک دارد.

۵۵- اگر میزان حد قابل تحمل فرسایش خاک در منطقه‌ای در اراضی کشاورزی و مرتعی مجاور به ترتیب ۳/۵ و ۱/۱۵ تن در هکتار در سال باشد، کدام مورد درست است؟

- (۱) اولویت حافظت خاک در این منطقه با اراضی کشاورزی است.

(۲) عملیات کشاورزی باعث افزایش حدود ۳ برابری میزان فرسایش شده است.

(۳) میزان فرسایش خاک در اراضی کشاورزی بیش از ۳ برابر اراضی مرتعی است.

(۴) عملیات کشاورزی باعث افزایش حدود ۳ برابری سرعت تشکیل خاک شده است.

۵۶- اگر بارندگی با میانگین سرعت سقوط قطرات ۵ متربرثانیه رخ دهد و  $\frac{1}{3}$  مقدار کل بارندگی در خاک نفوذ کند، جریان رواناب ورقه‌ای بوده و متوسط سرعت جریان ۰/۵۰ متربرثانیه می‌باشد، نسبت انرژی جنبشی بارندگی به رواناب حدوداً چقدر است؟

- (۱) ۳۵۰
- (۲) ۶۰۰
- (۳) ۱۰۰۰۰
- (۴) ۹۰۰۰۰

۵۷- در حوضه‌ای به مساحت ۵۰۰ کیلومترمربع، اگر میزان تولید رسوب سالانه ۲۰۰ هزار تن و نسبت تحويل رسوب ۴۰ درصد باشد، میزان فرسایش خاک چند تن در هکتار است؟

- (۱) ۰/۱
- (۲) ۱/۶
- (۳) ۱۰
- (۴) ۱۶

۵۸- در یک رخداد بارندگی، حد بالا و پایین شدت تلفات خاک (غلظت رسوب) باتوجه به مقاییم «محدودیت جدا شدن» و «محدودیت انتقال» به ترتیب چقدر است؟

- (۱) حداقل شدت جدا شدن - صفر
- (۲) حداقل شدت جدا شدن - حداقل توان حمل جریان
- (۳) حداقل توان حمل جریان - حداقل شدت جدا شدن
- (۴) حداقل شدت جدا شدن و یا توان حمل جریان - صفر

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۵۹- در محاسبه قدرت جریان برای کندن ذرات خاک، کدام ویژگی کاربرد ندارد؟  
(۱) شتاب ثقل      (۲) چگالی سیال      (۳) سرعت جریان      (۴) قطر ذرات خاک
- ۶۰- کدام مدل فرسایشی، قادر زیرمذکوره است؟  
Eurosem (۴)      SWAT (۳)      WEPP (۲)      USLE (۱)
- ۶۱- در حوضه‌ای به مساحت ۱۰۰ هکتار، مقدار پتانسیم تبادلی خاک ۲۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک است. اگر در معادله USLE حاصل ضرب  $LSCP\text{K} = ۰,۲$  و مقدار  $EI = ۱۰۰ \text{ MJ.ha}^{-۱}.\text{mm.h}^{-۱}$  باشد، مقدار پتانسیمی که همراه با ذرات خاک در اثر فرسایش از حوضه خارج می‌شود، چند کیلوگرم است؟  
(۱) ۰/۰۵      (۲) ۰/۵      (۳) ۵      (۴) ۵۰
- ۶۲- مؤثرترین روش حفاظت خاک در مقابل هر سه نوع فرسایش ناشی از بارندگی، رواناب و باد، کدام است؟  
(۱) تراس‌بندی      (۲) کشت نواری      (۳) افزایش زبری سطحی      (۴) پوشاندن سطح خاک
- ۶۳- کلاس فعالیت تبادل کاتیونی در خاکی که در فامیل زیر، طبقه‌بندی شده است در کجا باید تعیین شود؟  
**Fine-loamy over clayey, mixed, active, calcareous, thermic Typic Uderthent**  
(۱) در قسمت خارج از بخش کنترل  
(۲) در قسمت clayey بخش کنترل  
(۳) در قسمت fine-loamy بخش کنترل  
(۴) در هر دو قسمت clayey و fine-loamy بخش کنترل
- ۶۴- کدام مورد درباره رده‌بندی یک خاک در منطقه‌ای با رژیم رطوبتی **xeric** و حرارتی **thermic** و افق‌های مالیک ۸۰-۱۰۵ سانتی‌متر، آرجلیک ۱۵۰-۱۰۵ سانتی‌متر و کلسیک ۱۰۵-۸۰ سانتی‌متر تا سطح زیرگروه درست است؟  
Pachic Argixerolls (۲)      Typic Calcixerolls (۱)  
Calcic Pachic Argixerolls (۴)      Pachic Calcixerolls (۳)
- ۶۵- کدام فرایند، در تشکیل خاک‌های **Plinthosols** مؤثر است؟  
Desilication (۴)      Ferrallitization (۳)      Laterization (۲)      Ferrolysis (۱)
- ۶۶- کدام مورد درباره خاک‌های آرنوسول درست است؟  
(۱) همگی در سطوح جوان تشکیل شده‌اند و حاصلخیز می‌باشند.  
(۲) همگی در اثر رسوب‌گذاری از محیط آبی تشکیل شده‌اند و حاصلخیز هستند.  
(۳) بخشی از آرنوسول‌های مناطق حاره محصول هوازدگی مستقیم درجا هستند و حاصلخیز نیستند.  
(۴) همه آرنوسول‌ها دارای بافت درشت و از عناصر غذایی تخلیه شده و دارای حاصلخیزی ضعیف هستند.
- ۶۷- کدام مورد حداقل اشباع بازی را دارد؟  
(۱) چرنوزم      (۲) اومنیزول      (۳) فانوزم      (۴) کاستانوزم

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۶۸- خاک رخی که دارای افق‌های اکریک، ناتریک، کلسیک و پتروکلسیک در فاصله ۱۰۰ سانتی‌متری از سطح خاک است و در رژیم رطوبتی اریدیک و حرارتی ترمیک قرار دارد، در کدام زیرگروه قرار می‌گیرد؟
- (۱) Calcic Natrargids (۲) Natric Petroargids (۳) Petrocalcic Natrargids (۴) Natric Petrocalcids
- ۶۹- تشکیل خاک حاصل از کدام سنگ مادری در شرایط یکسان، سولوم ضخیم‌تری ایجاد می‌کند؟
- (۱) ریولیت (۲) بازالت (۳) گرانیت (۴) گرانودیبوریت
- ۷۰- اگر خاکی با افق A (۰-۲۵ سانتی‌متر)، Btk1 (۲۵-۵۰ سانتی‌متر)، Btk2 (۵۰-۹۰ سانتی‌متر) و Bty (۹۰-۱۲۰ سانتی‌متر) در یک منطقه با رژیم رطوبتی اریدیک تشکیل شود، زیرگروه خاک کدام است؟
- (۱) Calcic Gypsiargids (۲) Calcic Argigypsids (۳) Gypsic Argicalcids (۴) Gypsic Calciargids
- ۷۱- خاکی دارای افق کلسیک در ۱۰۰ سانتی‌متری از سطح خاک و افق آرجیک در بالای آن که در افق کلسیک نفوذ یافته است، می‌باشد. رده‌بندی درست این خاک در سیستم WRB کدام است؟
- (۱) Haplic Calcisols (۲) Haplic Luvisols (۳) Calcic Luvisol (۴) Luvic Calcisols
- ۷۲- براساس نظر FAO شروع دوره رشد در منطقه‌ای با شرایط اقلیمی  $E_1 = 68/2\text{mm}$  و  $R_1 = 17/22\text{mm}$  در اکتبر و  $E_2 = 29/3\text{mm}$  و  $R_2 = 15\text{mm}$  در نوامبر، برابر با چند ماه اکتبر است؟
- (۱) ۲ (۲) ۱۳ (۳) ۱۵ (۴) ۲۸
- ۷۳- کدام واحد اراضی، بر مبنای نیازهای دوره رشد گیاهان طراحی شده است؟
- (۱) واحد نقشه خاک (۲) واحدهای مدیریتی (۳) واحد سیستم‌های اراضی (۴) واحدهای نواحی زراعی - اکولوژیکی (AEZ)
- ۷۴- اگر در یک منطقه، شاخص تولید معادل ۱۰۰، شاخص محدودیت خاک ۵ و شاخص هزینه‌های عادی معادل ۸ باشد، شاخص پتانسیل خاک چقدر است؟
- (۱) ۸۷ (۲) ۹۷ (۳) ۱۰۳ (۴) ۱۱۳
- ۷۵- براساس نظر FAO یک دوره رشد نرمال یا معمولی شامل کدام گروه از دوره‌های فرعی است؟
- (۱) شروع دوره رشد، مرطوب، پایان بارندگی و ذخیره (۲) شروع دوره رشد، پایان بارندگی، ذخیره و داشت (۳) شروع دوره رشد، مرطوب، داشت و برداشت (۴) شروع دوره رشد، مرطوب، پایان بارندگی و داشت

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۷۶- در ارزیابی کیفی تناسب اراضی، نحوه محاسبه گج و آهک که میزان آن‌ها با عمق افزایش می‌باید، برای گیاهان یکساله و چندساله به کدام صورت است؟
- (۱) در عمق ۱۰۰cm و با استفاده از ضرایب وزنی  
(۲) در عمق ۱۵۰cm و با استفاده از میانگین درصد آن‌ها  
(۳) بهترتبی در عمق ۱۰۰cm و ۱۵۰cm و با استفاده از ضرایب وزنی  
(۴) بهترتبی در عمق ۱۰۰cm و ۱۵۰cm و با استفاده از میانگین درصد آن‌ها
- ۷۷- تفسیر در مدیریت اراضی، در کدام سطح از طبقه‌بندی فانو منعکس می‌شود؟
- (۱) رد (۲) واحد (۳) کلاس (۴) تحت کلاس
- ۷۸- کدام روش ارزیابی و تفسیر خاک‌ها بر مبنای اطلاعات رده‌بندی خاک بنا شده است؟
- USDA (۴) USBR (۳) FAO (۲) FCC (۱)
- ۷۹- در محاسبه شاخص کشت‌پذیری (Tilth index)، کدام فاکتور خاکی لحاظ نشده است؟
- (۱) ماده آلی خاک (۲) چگالی ظاهری خاک (۳) نفوذپذیری خاک (۴) شاخص خمیرایی خاک
- ۸۰- اگر درجات اراضی (Rating) برای پارامترهای خاکی شامل شوری، آهک، گج، بافت و زهکشی به ترتیب ۱۰۰، ۹۰، ۹۰، ۸۰ و ۱۰۰ باشد، مقدار شاخص اراضی به روش استوری و ریشه‌دوم به ترتیب از راست به چه قدر است؟
- (۱) ۸۱ - ۷۲ (۲) ۶۴/۸ - ۷۲ (۳) ۷۲ - ۶۴/۸ (۴) ۷۲ - ۸۱