

پیاچ دی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

کد کنترل



189E

189

E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۶/۱۲/۴
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمدد) - سال ۱۳۹۷

رشته بیماری‌شناسی گیاهی (کد ۲۴۴۰)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: بیماری‌های گیاهی - مدیریت بیماری‌های گیاهی - قارچ‌شناسی تکمیلی - ویروس‌شناسی گیاهی - پروکاربوب‌های بیماری‌زای گیاهی - اصول نمادشناسی و نمادهای انگل گیاهی	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق حا dalle تکری و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از برگزاری آزمون، برای نهاده انتخاب خیص و خوفن تها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برای غرارات رفتار می‌شود.

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

189E

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز)

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- در کدام بیماری، فقط اسپورهای جنسی به عنوان مایه تلقیح اولیه و ثانویه تولید می‌شوند و اسپور غیرجنسی وجود ندارد؟
- (۱) اسکالاد جو (*Rhynchosporium secalis*)
(۲) سفیدک سطحی گندم (*Blumeria graminis*)
(۳) لکه قهوه‌ای برگ یونجه (*Pseudopeziza medicaginis*)
(۴) لکه برگی سرکوسپورایی چغnderقند (*Cercospora beticola*)
کدام بیمارگ منحصرآ خاکزد است؟
- Macrophomina phaseolina (۲) *Rhizoctonia solani* (۱)
Fusarium graminearum (۴) *Gaeumannomyces graminis* (۳)
- ۲- کدام توصیف درباره بیماری زنگ سیب - سرو (*Gymnosporangium juniperi-virginianae*) درست است؟
- (۱) روی درخت سرو به شکل $n + n$ دیده می‌شود.
(۲) روی درخت سیب به شکل n دیده می‌شود.
(۳) روی درخت سرو به شکل n و $2n$ دیده می‌شود.
(۴) روی درخت سیب به شکل $n + n$ و n دیده می‌شود.
- کدام بیماری قارچی چغnderقند در مناطق مرطوب در اثر پراش باران می‌تواند بذر زاد شود؟
- (۱) زنگ چغnderقند
(۲) پوسیدگی اسکلروتیومی چغnderقند
(۳) سفیدک کرکی یا دروغی چغnderقند
(۴) لکه سفید یا لکه سرکوسپورایی چغnderقند
- در کدام مورد دمای بهینه بیماری‌زایی کمتر از دمای بهینه رشد در محیط کشت است؟
- Fusarium culmorum* (۱)
Magnaporthe grisea (۲)
Monographella nivalis (۳)
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (۴)
- ۳- ماندگاری بیمارگ در غیاب میزان حساس معمولاً به صورت رسیه در کدام قارچ دیده می‌شود؟
- Rhizoctonia solani* (۲) *Terfezia clavari* (۱)
Erysiphe necator (۴) *Gaeumannomyces graminis* (۳)
- ۴- بیشترین خسارت کدام بیمارگ در طوفه میزان است؟
- Phytophthora drechsleri* (۲) *Phytophthora cinnamoi* (۱)
Phytophthora nicotianae (۴) *Phytophthora cactorum* (۳)
- ۵- خسارت بیماری غربالی در هلو بیشتر در کدام اندام گیاه دیده می‌شود؟
- (۱) جوانه
(۲) برگ
(۳) ساقه
(۴) میوه

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۹ در کدام بیماری، دمای کم و رطوبت زیاد باعث پیشرفت و توسعه بیماری می‌شود؟
(۱) کپک دودهای در اثر *Capnodium sp.*
(۲) بیماری پیچیدگی برگ در اثر گونه‌های *Taphrina*
(۳) پوسیدگی ریشه در اثر *Phymatotrichopsis omnivora*
(۴) پوسیدگی تلخ سیب در اثر *Colletotrichum gloeosporioides*
- ۱۰ میزان آب، در کدام ویروس بیشتر از بقیه است؟
Tomato yellow leaf curl virus (۲) *Tomato spotted wilt virus* (۱)
Cucumber mosaic virus (۴) *Tobacco mosaic virus* (۳)
- ۱۱ تریپس‌ها به عنوان ناقلین توسپیوویروس‌ها در کدام مرحله از جرخه زندگی خود با تغذیه از گیاه آلوده قادر به انتقال ویروس می‌باشند؟
(۱) شفیرگی
(۲) بورگی
(۳) حشره کامل
(۴) همه مراحل چرخه زندگی
- ۱۲ کدام اجزای سلول به عنوان جایگاه همانندسازی ویروئیدها محسوب می‌شوند؟
(۱) دستگاه گلزاری و هسته
(۲) کلروپلاست و هسته
(۳) واکوئل‌ها و شبکه آندوپلاسمی
(۴) غشای سلولی و دستگاه گلزاری
- ۱۳ کدام مورد درباره **Banana bunchy top virus (BBT)** درست است؟
(۱) محل استقرار در آوند چوبی - تولید عالائم زردی - انتقال با شته‌ها به صورت پایا
(۲) محل استقرار در آوند آبکش - تولید عالائم زردی - انتقال با شته‌ها به صورت پایا
(۳) محل استقرار در هسته - تولید عالائم موزائیک - انتقال با زنجیرک به صورت تکثیری
(۴) محل استقرار در بافت پارانشیم - تولید عالائم زردی - انتقال با شته‌ها به صورت نایایا
- ۱۴ در یک گلخانه حاوی کدوئیان عالائم لکدهای تیره و روشن (موزائیکی) به کدام گروه از بیماری‌ها می‌تواند مربوط باشد؟
(۱) ویروسی و یا لکه زاویه‌ای کدوئیان
(۲) ویروسی و یا آنتراتکنوز کدوئیان
(۳) ویروسی و یا سفیدک کرکی (داخلی) کدوئیان
(۴) ویروسی و یا سفیدک‌های پودری (سطحی) کدوئیان
- ۱۵ کدام بیمارگر، می‌تواند باعث ایجاد حالت ساقه آبله‌ای در درختان میوه هسته‌دار شود؟
(۱) ویروس آبله آلو (PPV)
(۲) ویروس برگ قاشقی گیلاس (CLRV)
(۳) ویروس نقش حلقوی گوجه‌فرنگی (ToRSV)
(۴) ویروس نقش حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته‌دار (PNRSV)
- ۱۶ کدام مورد از خصوصیات عامل بیماری غده دوکی سبب‌زنینی است؟
(۱) در هسته سلول میزبان همانندسازی می‌کند.
(۲) روش تکثیر آن از نوع دایره غلطان متقاضن است.
(۳) تکثیر ویروئید توسط پلی‌پتیدهایی که خودش رمز می‌کند، انجام می‌شود.
(۴) برش نسخه تکثیر شده توسط ریبوزایم‌های چکشی (hammer head ribozymes) (انجام می‌شود).

پیاچ دی تست: نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

189E

صفحه ۵

- ۲۷- کدام مورد، از مواد مترشحه *Gaeumannomyces graminis* که در سرکوب *Pseudomonas fluorescens* پدیده زوال پاخوره گندم نقش مهم‌تری ایفا می‌کند؟
(۱) فلوروگلوسینول‌ها که سبب تخریب غشای سلول قارچ می‌شوند.
(۲) سیدروفورها که آهن را از دسترس قارچ خارج می‌کنند.
(۳) لیپوپیتیدهای حلقوی که نقش بیوسورفتکتات دارند.
(۴) پیرول نیترین‌ها که تنفس قارچ را مختل می‌کنند.
- ۲۸- کدام آنزیم در واکنش دفاعی گیاهان در برابر بیمارگرها مؤثر است؟
(۱) پکتیناز
(۲) فسفاتاز
(۳) DNA پلیمراز
(۴) فنیل آلاتین آمونیالیاز
- ۲۹- احتمال مقاوم شدن قارچ، در مقابل کدام گروه از قارچ‌کش‌ها کمتر است؟
(۱) بنزیمیدازول‌ها
(۲) آنتی‌بیوتیک‌ها
(۳) دی‌تیوکاربامات‌ها
(۴) تفاوت چندانی با هم ندارند.
- ۳۰- کدام مورد به عنوان اولین خط دفاعی گیاه در مقابل دسته وسیعی از میکروارگانیسم‌ها محسوب می‌شود؟
(۱) ایمنی ناشی از رن‌های R
(۲) مقاومت سیستمیک القابی
(۳) ایمنی ناشی از ادراک افکتورها (ETI)
(۴) ایمنی ناشی از ادراک الگوهای مولکولی مرتبط با میکروب‌ها (MAMP)
- ۳۱- تولید کدام ترکیب، مستقیماً تحت تنظیم مثبت سیستم ملکولی GacS/GacA نیست؟
(۱) پرووتاز
(۲) سیدروفور
(۳) سیانید هیدروژن
(۴) دی‌استیل فلوروگلوسینول
- ۳۲- کدام PR پروتئین، مارکری مناسب برای مقاومت اکتسابی سیستمیک (SAR) محسوب می‌شود؟
PR₁₀ (۱) PR₇ (۲) PR₅ (۳) PR₁ (۴)
- ۳۳- آنتی‌بیوتیک‌های دی‌استیل فلوروگلوسینول و پیولوتئورین به ترتیب توسط کدام عوامل بیوکنترل تولید می‌شوند؟
(۱) باسیلوس - استرپتومیسیز
(۲) باسیلوس - سودوموناس
(۳) سودوموناس - استرپتومیسز
- ۳۴- در برهمکنش گیاه - بیمارگر، کدام بیماری تا وقتی که گیاه خیلی جوان است، واکنش مقاومت و در مراحل بعدی رشد، حساس‌تر و دوباره تا قبل از رشد کامل گیاه واکنش مقاومت دارد؟
(۱) زنگ‌ها
(۲) سفیدک‌های کرکی
(۳) لکه موجی گوجه‌فرنگی
(۴) بلایت‌های باکتریایی
- ۳۵- کدام ترکیب در باکتری *Bacillus cereus* اثر اختصاصی علیه *Oomycetes* دارد؟
Bacilysin (۱) Acetoin (۲)
Butandiol (۴) Zwittermicin A (۳)
- ۳۶- کدام ترکیب در جنس *Bacillus* به عنوان البیتیور یا تحریک‌کننده مقاومت القابی (ISR) شناخته شده است؟
(۱) کیتیناز
(۲) سیدروفور
(۳) الیگوپیتیدها
(۴) بوتان دی‌ال

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

۳۷- کدام مکانیسم در مقاوم شدن قارچ‌ها به قارچ‌کش‌ها دخالت دارد؟

MAPK cascade (۲)

ABC Transporters (۱)

GPCRs (۴)

G proteins (۳)

۳۸- با در نظر گرفتن صفات آنالوگ و هومولوگ در مطالعات فیلوزنتیک، کدام مورد درست است؟

(۱) صفات آنالوگ صفات مشابهی هستند که در اثر تکامل واگرا در دو گونه دیده می‌شوند.

(۲) صفات آنالوگ صفات مشابهی هستند که در اثر تکامل همگرا در دو گونه دیده می‌شوند.

(۳) صفات هومولوگ صفات مشابهی هستند که در نتیجه تکامل همگرا در دو گونه دیده می‌شوند.

(۴) صفات هومولوگ صفات مشابهی هستند که در نتیجه تکامل موازی در دو گونه دیده می‌شوند.

۳۹- کدام صفت قارچ‌های آسکومیستی از نظر فیلوزنتیکی، یک صفت اجدادی محسوب می‌شود؟

(۲) وجود آسکوپور

(۱) وجود آسک

(۴) وجود سلول دیکاربیوتیک

(۳) وجود سلول مادر آسک

۴۰- پدیده تکامل همگرا (convergent evolution)، در کدام جنس قارچی مشاهده شده است؟

Entyloma (۴) Microbotryum (۳)

Tilletia (۲)

Puccinia (۱)

۴۱- کدام مورد نشان‌دهنده تفاوت اصلی نوکلئوزوم در قارچ‌ها با سایر یوکاریوت‌های عالی است؟

(۱) تفاوت در هیستون‌ها و رشته کوتاه DNA واسطه بین نوکلئوزوم‌ها است.

(۲) تفاوت در سنتروم کروموزوم‌ها است که نقش مهمی در تقسیم سلولی و بیان ژن‌های مختلف دارند.

(۳) تفاوت در توالی DNA واسطه بین نوکلئوزوم‌ها است که در قارچ‌ها، نواحی تکرارشونده بیشتری نسبت به سایر یوکاریوت‌ها دارند.

(۴) تفاوت در طول DNA واسطه بین نوکلئوزوم‌ها است که طول آن حدود ۱۴-۴۵ جفت باز است، ولی در سایر یوکاریوت‌ها حدود ۶۰ جفت باز است.

۴۲- سیستم سازگاری جنسی در قارچ‌های شاخه بازیدیومیکوتا از نوع هتروتالیسم دو عاملی یا چهارقطبی به‌وسیله کدام مورد کنترل می‌شود؟

(۱) دو لوکوس روی یک کروموزوم

(۲) بیش از یک لوکوس با دو آلل مختلف آمیزش

(۳) بیش از یک لوکوس روی کروموزوم‌های مختلف

(۴) یک لوکوس و با تعداد زیادی آلل روی یک کروموزوم

۴۳- در حال حاضر، ساعت ملکولی بر اساس میزان جانشینی کدام مورد برای درک زمان انشقاق گونه‌ها قابل استفاده است؟

(۱) نوکلئوتیدی در توالی کل ژنوم دو گونه

(۲) نوکلئوتیدی در توالی بخش‌های خاصی از ژن‌های فسیل‌ها

(۳) نوکلئوتیدی در توالی بخش‌های خاصی از ژنوم پروتئین‌ها

(۴) نوکلئوتیدی در توالی بخش‌های خاصی از ژن‌هایی نظیر ۱۸S، ۲۸S، ITST و یا ژن‌های دیگر

۴۴- کدام قارچ، معروف تیره Xylariaceae و آسیبرسان روی درختان جنگلی شناسایی شده است؟

(۱) Biscogniauxia spp. و Leptosphaeria spp. با تشکیل سودوتسیوم

(۲) Biscogniauxia spp. و Rosellinia spp. با تشکیل پریتسیوم و آسکوپور

(۳) Leptosphaeria spp. و Rosellinia spp. با تشکیل پیکنید و پیکنیدیوپسیور

(۴) Biscogniauxia spp. و Rosellinia spp. با تشکیل پریتسیوم و آسکوپورهای سوزنی‌شکل

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۵- کدام مورد بیانگر **Genealogical Concordance Phylogenetic Species Recognition (GCPSR)** است؟

- (۱) شناسایی دودمان‌های تکاملی غیرمستقل با استفاده از توالی نوکلئوتیدی یک ناحیه زنومی مرتبط است.
- (۲) شناسایی دودمان‌های تکاملی غیرمستقل با استفاده از توالی نوکلئوتیدی چند ناحیه زنومی مرتبط است.
- (۳) شناسایی دودمان‌های تکاملی مستقل با استفاده از توالی نوکلئوتیدی چند ناحیه زنومی غیرمرتبط است.
- (۴) شناسایی دودمان‌های تکاملی مستقل با استفاده از توالی نوکلئوتیدی یک ناحیه زنومی غیرمرتبط است.

- ۴۶- در فرآیند تفکیک آلل‌های زن‌ها تیپ آمیزشی در قارچ *Neurospora crassa* اگر کراسینگ اور در طی تقسیم میوز

انجام نشود، نحوه تفکیک زن‌ها به کدام صورت می‌شود؟

- (۱) تفکیک زن‌های تیپ آمیزشی به صورت MAT-1 و MAT-2 صورت می‌گیرد.
- (۲) آسکوسپورها در داخل آسک به صورت دو ردیفی توأم روشن 2-MAT و تیره 1-MAT قرار می‌گیرند.
- (۳) تفکیک زن‌های تیپ آمیزشی به صورت غیر یکنواخت و پراکنده MAT-2 و MAT-1 صورت می‌گیرد.
- (۴) آسکوسپورها در داخل آسک به صورت یک ردیف چهارتایی تیره با 1-MAT و یک ردیف چهارتایی روشن با 2-MAT قرار می‌گیرند.

- ۴۷- کدام جنس قارچی، دو نوع کنیدیوفور تولید می‌کند؟

Clonostachys (۲)

Acremonium (۱)

Cylindrocarpon (۴)

Gliocladium (۳)

- ۴۸- در بین قارچ‌شناسان، کدام مورد به ترتیب ویژگی افراد **Splitter** و **Lumper** را بهتر نشان می‌دهد؟

- (۱) افراد علاقمند به ایجاد گونه‌های جدید با مشاهده تفاوت‌های کوچک، افراد محاط در ایجاد آرایه‌های جدید
- (۲) تاکسونومیست‌های صاحب‌نظر در آرایه‌های سطوح بالا، تاکسونومیست‌های صاحب‌نظر در آرایه‌های سطوح پایین
- (۳) افراد محاط در ایجاد آرایه‌های جدید، افراد علاقمند به ایجاد گونه‌های جدید با مشاهده تفاوت‌های کوچک
- (۴) افراد معتقد به ارجحیت فیلوزنی ملکولی، افراد محاط در استفاده از فیلوزنی مولکولی

- ۴۹- کدام مورد ارتباط بین هر کدام از گروه‌های مونوفیلتیک، پارافیلتیک و پلی‌فیلتیک با هر کدام از عبارات زیر است؟

- | | |
|---|---|
| (۱) هموپلاسی - سیمپلزیومورفیک - سین‌آپومورفیک | (۲) سین‌آپومورفیک - سیمپلزیومورفیک - هموپلاسی |
| (۳) سین‌آپومورفیک - هموپلاسی - سیمپلزیومورفیک | (۴) سیمپلزیومورفیک - سین‌آپومورفیک - هموپلاسی |

- ۵۰- جدول زیر حداکثر تفاوت بین گونه‌ای و داخل گونه‌ای توالی نوکلئوتیدی سه گونه از یک جنس را برای ناحیه ITS روی rDNA نشان می‌دهد. با توجه به این جدول، کدام مورد درست است؟

تفاوت نوکلئوتیدی روی زن			
	Species 1	Species 2	Species 3
Species 1	10	-	-
Species 2	22	0	-
Species 3	26	16	0

- (۱) این زن، سه گونه را به خوبی از همدیگر تشخیص می‌دهد و مناسب انتخاب برای بارکدگذاری DNA است.
- (۲) اگرچه این زن سه گونه را به خوبی از همدیگر تشخیص نمی‌دهد، ولی مناسب انتخاب برای بارکدگذاری DNA است.
- (۳) این زن، سه گونه را از همدیگر تشخیص می‌دهد و گونه یک براساس این زن یک گونه کمپلکس است اما این زن مناسب انتخاب برای بارکدگذاری DNA نیست.
- (۴) این زن، سه گونه را از همدیگر تشخیص می‌دهد، اما گونه یک براساس این زن احتمالاً یک گونه کمپلکس است، این زن مناسب انتخاب برای بارکدگذاری DNA است.

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۵۱- اگر بخواهیم آلودگی گیاهان به یک بیماری ویروسی در سطح وسیع را مورد بررسی قرار دهیم، کدام روش توصیه می‌شود؟
- (۱) PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
 - (۲) ELISA با استفاده از آنتی‌بادی‌های تک همسانه‌ای (مونوکولونال)
- ۵۲- ویروس‌های گیاهی به طور عمده از کدام طریق با سیستم دفاعی خاموشی ژن (gene silencing) مقابله می‌کنند؟
- (۱) با افزایش بیان سالسیلیک اسید
 - (۲) با افزایش بیان جاسمونیک اسید
 - (۳) با افزایش بیان ژن پروتئین‌های سرکوبگر (suppressors)
 - (۴) بیان پروتئین‌های سرکوبگر (suppressors)
- ۵۳- کدام مورد درباره ویروس موزائیک کلم‌گل (Cauliflower mosaic virus) درست است؟
- (۱) در هسته از روی ترانسکریپت (mRNA) بزرگ‌تر با کمک آنزیم RT و DNA ویروس ساخته می‌شود.
 - (۲) در هسته از روی ترانسکریپت‌های (mRNAs) کوچک‌تر با کمک آنزیم RT و DNA ویروس ساخته می‌شود.
 - (۳) دی‌ان‌ای ویروس در سیتوپلاسم تولید چند ترانسکریپت (mRNA) می‌کند که به هسته مهاجرت کرده و پروتئین‌های ویروس از روی آن‌ها بیان می‌شود.
 - (۴) دی‌ان‌ای ویروس در هسته به یک مینی‌کروموزوم (minichromosome) تبدیل شده و تولید چند ترانسکریپت (mRNA) می‌کند که به سیتوپلاسم مهاجرت کرده و پروتئین‌های ویروس از روی آن‌ها بیان می‌شود.
- ۵۴- بلوک سه‌زنی (Triple gene block) در کدام گروه از ویروس‌های زیر وجود دارد و مربوط به کدام نقش است؟
- (۱) پوتی ویروس‌ها و کوکوموویروس‌ها - انتقال با ناقل
 - (۲) پوتکس ویروس‌ها و توباموویروس‌ها - همانندسازی
 - (۳) رابدوویروس‌ها و توسبوویروس‌ها - اتصال به گیرنده‌های میزانی
 - (۴) پوتکس ویروس‌ها و هوردهای ویروس‌ها - حرکت سلول به سلول
- ۵۵- در ویروس‌ها خانواده Caulimoviridae. ساخته شدن RNA از روی DNA با کمک کدام موارد صورت می‌گیرد؟
- (۱) آنزیم RNA polymerase II میزان و بدون کمک آغازگر
 - (۲) آنزیم RNA polymerase II میزان و آغازگرهای میزان
 - (۳) آنزیم RNA polymerase II ویروس و آغازگرهای tRNA میزان
 - (۴) آنزیم RNA polymerase II و آغازگرهای tRNA هر دو مربوط به میزان
- ۵۶- کدام مورد درباره نوکلئیک اسیدهای ستلایت (satellite nucleic acids) درست است؟
- (۱) در ژنوم ویروس کمکی ادغام می‌شوند.
 - (۲) در چرخه همانندسازی ویروس کمکی نقش کلیدی دارند.
 - (۳) از لحاظ ترافق نوکلئوتیدی به ژنوم ویروس کمکی شباهت دارند.
 - (۴) برای همانندسازی کپسیدپوشی وابسته به ویروس کمکی هستند.
- ۵۷- در ویروس‌ها، کدام مورد درباره پروتئین حرکتی (movement protein) درست است؟
- (۱) پروتئینی از گیاه است که ویروس را به حرکت در می‌آورد.
 - (۲) پروتئینی از ناقل است که با ویروس برهمنش برقرار می‌کند.
 - (۳) پروتئینی از ویروس است که در عبور ویروس از سلولی به سلول مجاور نقش دارد.
 - (۴) پروتئینی از گیاه است که از یک سو با ویروس و از سوی دیگر با ناقل آن ویروس برهمنش برقرار می‌کند.

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۵۸- کدام پروتئین‌ها از رابدوویروس‌ها، درگیر ترانویسی و همانندسازی ژنوم این ویروس‌ها است و وجود آن‌ها برای انجام این دو پدیده ضروری است؟
- (۱) N و P و L (۲) N و G و L (۳) P و M و L (۴) L و G و M
- ۵۹- کدام روش، برای تهیه آمده خالص ویروس‌های موجود در گیاهان با آلودگی مخلوط مناسب است؟
- (۱) واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (۲) سانتریفیوژ به روش شیب چگالی (۳) الکتروفورز دوبعدی پروتئین‌های موجود در گیاهان آلوده (۴) (High Performance Liquid Chromatography) HPLC
- ۶۰- کدام مورد درباره جنس **Sensory Membrane Protein** توسط کدام ژن کد می‌شود؟
- Vir H (۴) Vir D (۳) Vir B (۲) Vir A (۱)
- ۶۱- کدام مورد درباره جنس **Xanthomonas** درست است؟
- (۱) دارای تازک‌های محیطی - هوایی اجباری - اکسیداز منفی (۲) دارای یک تازک قطبی - بی‌هوایی اختیاری - اکسیداز منفی (۳) دارای تازک‌های محیطی - هوایی اجباری - اکسیداز مثبت (۴) دارای یک تازک قطبی - هوایی اجباری - اکسیداز منفی
- ۶۲- دامنه میزانی کدام بیمارگر گیاهی، وسیع‌تر است؟
- Agrobacterium tumefaciens* (۱) *Xanthomonas citri* subsp. *citri* (۲) *Candidatus 'Phytoplasma aurantifolia'* (۳) *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (۴)
- ۶۳- کدام بیمارگر غیرقابل کشت است و در کلاس **Mollicutes** طبقه‌بندی می‌شود؟
- Spiroplasma citri* (۱) *Candidatus 'Liberibacter asiaticus'* (۲) *Candidatus 'Phlomobacter fragariae'* (۳) *Candidatus 'Phytoplasma aurantifolia'* (۴)
- ۶۴- فیتوپلاسمها از نظر فیلوزنی به کدام میکروارگانیزم‌ها نزدیک‌تر هستند؟
- Clostridium ramosum* (۲) *Spiroplasma citri* (۱) *Ureaplasma urealyticum* (۴) *Acholeplasma laidlawii* (۳)
- ۶۵- فعالیت ژن‌های غیر بیماری‌زایی (**avirulence**) در باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی به کدام نوع دستگاه ترشحی وابسته است؟
- IV (۴) III (۳) II (۲) I (۱)

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۶۶- وجود مگاپلاسمید (megaplasmid) از ویژگی کدام بیمارگر گیاهی است؟
Erwinia amylovora (۱)
Ralstonia solanacearum (۲)
Agrobacterium tumefaciens (۳)
Xanthomonas citri subsp. citri (۴)
- ۶۷- در کدام پدیده دخالت دارند؟ Competence Specific Proteins -۶۷
- | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Transformation (۴) | Transduction (۳) | Conjugation (۲) | Mutation (۱) |
| کدام مورد درباره «فیتوپلاسمها» درست است؟ -۶۸ | | | |
| (۱) واجد دیواره سلولی - محل فعالیت در آوندهای چوب گیاهان آلوده - قابل کشت | | | |
| (۲) قادر دیواره سلولی - محل فعالیت در آوندهای آبکش گیاهان آلوده - غیرقابل کشت | | | |
| (۳) قادر ناقل حشره‌ای - حساس به پنسیلین - متعلق به شاخه باکتری‌های گرم منفی | | | |
| (۴) غیرقابل تکثیر در ناقل حشره‌ای - مقاوم به تتراسایکلین - متعلق به شاخه باکتری‌های گرم مثبت | | | |
| ناقل باکتری 'Candidatus 'Liberibacter asiaticus' کدام است؟ -۶۹ | | | |
| Myzus persicae (۲) | | Thrips tabaci (۱) | |
| Dalbulus maydis (۴) | | Diaphorina citri (۳) | |
| کدام بیمارگر در ناقل حشره‌ای خود تکثیر نمی‌شود؟ -۷۰ | | | |
| Pantoea stewartii (۲) | | Spiroplasma citri (۱) | |
| Candidatus 'Phytoplasma aurantifolia' (۴) | | Candidatus 'Phytoplasma asteris' (۳) | |
| دایرید در کدام جنس‌ها وجود ندارد؟ -۷۱ | | | |
| Pratylenchus – Scutylenchus – Nagelus (۱) | | | |
| Geocenamus – Zygotylenchus – Merlinius (۲) | | | |
| Helicotylenchus – Pratylenchus – Scutylenchus (۳) | | | |
| Tylenchorhynchus – Pratylenchoides – Amplimerlinius (۴) | | | |
| کدام مورد درباره یک فرد نماد هرمافروdit درست است؟ -۷۲ | | | |
| (۱) نماد ماده‌ای است که دارای بیضه و تخمدان است. | | | |
| (۲) نماد ماده‌ای است که اول اسپرم و بعد تخمک تولید می‌کند. | | | |
| (۳) از نظر ظاهر شبیه به افراد ماده بوده و دارای ovotestis می‌باشد. | | | |
| (۴) نماد شبیه به ماده‌ای است که اول تخمک و بعد اسپرم تولید می‌کند. | | | |
| در آرایه‌بندی جدید که براساس نتایج بررسی‌های مولکولی ارائه می‌شوند، خانواده Trichodoridae با کدام گروه از نمادهای زیر در یک راسته قرار می‌گیرند؟ -۷۳ | | | |
| Tripylids و Tobrilids (۲) | | Nygolaimids و Tripylids (۱) | |
| Dorylaimids و Mermithids (۴) | | Tobrilids و Dorylaimids (۳) | |
| ساخთار Caecum در کدام نماد انگل گیاهی مشاهده شده و در کدام قسمت از بدن آن‌ها قرار دارد؟ -۷۴ | | | |
| (۱) در افراد نمادهای سیستی و ریشه‌گرهی - در سطح پشتی انتهای مری | | | |
| (۲) در نمادهای نر برخی از گونه‌های Meloidogyne - در سطح پشتی انتهای مری | | | |
| (۳) در لاروهای سن دو و نمادهای نر گونه‌های Meloidogyne - در سطح شکمی انتهای مری | | | |
| (۴) در لاروهای سن دو و نمادهای نر گونه‌های Meloidogyne - در سطح پشتی انتهای مری و بعد از راستروده | | | |

پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

- ۷۵ - جهت و وضعیت همپوشانی (overlapping) انتهای مری روی روده، فاصله محل ریزش غده پشتی مری از گرههای استایلت و طول دم، کدام دو جنس زیر را متمایز می‌سازد؟
- Pratylenchus* و *Paratylenchus* (۲) *Rotylenchus* و *Rotylenchulus* (۱)
Tylenchorhynchus و *Merlinius* (۴) *Rotylenchus* و *Helicotylenchus* (۳)
- ۷۶ - کدام مورد وجه تمایز ریخت‌شناختی جنس *Trophurus* در خانواده *Dolichodoridae* است؟
- (۱) ضخامت هیالین دم - شکل دم
(۲) تعداد شیارهای طولی سطوح جانبی - بلندی سر
(۳) میزان رشد شبکه کوتیکولی سر - نحوه اتصال انتهای مری به ابتدای روده
(۴) تعداد لوله تناسلی در نمادهای ماده - استایلت و شبکه کوتیکولی سر ضعیف
- ۷۷ - وجود تشابه نمادهای نر جنس‌های *Trichodorus* و *Xiphinema* کدام است؟
- (۱) تعداد بیضه و پوست متورم
(۲) تعداد غدد مری و شکل آلت نرینه
(۳) محل قرارگرفتن آمفید و وجود پاپیل‌های گردانی
(۴) نداشتن بورسا و وجود پاپیل‌های تناسلی در سطح شکمی
- ۷۸ - وجود تشابه جنس‌های *Pratylenchoides* و *Hirschmanniella* کدام است؟
- (۱) محل فاسمید و شکل دم
(۲) میزان رشد غدد مری و نوع همپوشانی مری
(۳) مراحل آلوده‌کنندگی آن‌ها و بافت گیاهی مورد حمله (۴) تعداد لوله‌های تناسلی در ماده‌ها و اندازه بورسا در نرها
- ۷۹ - ارتباط احتمالی *Wolbachia* با کدام دو جنس از نمادهای زیر گزارش شده است؟
- Radopholus* – *Heterodera* (۱)
Xiphinema – *Meloidogyne* (۲)
Meloidogyne – *Radopholus* (۳)
Heterodera – *Xiphinema* (۴)
- ۸۰ - تشابه - تمایز ریخت‌شناختی جنس‌های *Hemicycliophora* و *Hemicriconemoides* کدام است؟
- (۱) تحلیل رفتن مری و استایلت در نرها - شکل و جهت حلقه‌های بدن در ماده‌ها
(۲) تحلیل رفتن مری و استایلت در نرها - وجود غلاف کوتیکولی (sheath) در لاروها
(۳) وجود غلاف کوتیکولی (sheath) در لاروها و ماده‌ها - وجود تزئینات کوتیکولی در لاروها
(۴) وجود غلاف کوتیکولی (sheath) در لاروها و ماده‌ها - فاصله روزنه تناسلی تا انتهای بدن در ماده‌ها

پیاچدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

189E

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتری در وبسایت پیاچدی تست