

# پیاچ دی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

کد کنترل



193

E

محل امضای:

نام:  
نام خانوادگی:

صبح جمعه

۱۳۹۶/۱۲/۴

دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمركز) - سال ۱۳۹۷

رشته علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان (کد ۲۴۴۴)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی  | تعداد سوال | از شماره | نا شماره |
|------|---|------------|----------|----------|
| ۱    | مجموعه دروس تخصصی: اکولوژی و ماهی شناسی -<br>تکثیر و پرورش تکمیلی (ماهی، آبزیان و غذای زنده)<br>- مدیریت آبزی پروری (بهداشتی، زنگنه و نهدیه،<br>فیزیولوژی آبزیان) | ۸۰         | ۱        | ۸۰       |

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاب، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی انتخاب حلقی و حرفی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با مخالفین برای معرفات رفتار می شود.

## آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتری در وبسایت پیاچ دی تست

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

193E

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- کدام مورد از ویژگی‌های گونه‌های اولیه یا پیشرو (Pioneer) در فرایند توالی نیست؟
- (۱) جثه کوچک  
(۲) سرعت رشد بالا  
(۳) تولید زیاد دانه  
(۴) سرعت تولیدمثل پایین
- ۲- کدام تنوع در اثر فعالیت‌های انسان در زیستگاه‌های طبیعی زودتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
- (۱) آلفا  
(۲) بتا  
(۳) گاما  
(۴) تتا
- ۳- کدام مورد درباره اندازه‌گیری تنوع زیستی درست است؟
- (۱) هر چه یکنواختی کمتر باشد، تنوع بیشتر است.  
(۲) هر چه یکنواختی بیشتر باشد، تنوع بیشتر است.  
(۳) هر چه فراوانی گونه‌ها بیشتر باشد، تنوع نیز بیشتر است.  
(۴) هر چه تفاوت در فراوانی گونه‌ها بیشتر باشد، تنوع نیز بیشتر است.
- ۴- وجود غذا و شرایط محیطی مناسب، برای حضور یک گونه ماهی و عدم حضور آن، بیانگر کدام مورد نمی‌تواند باشد؟
- (۱) رقابت با سایر گونه‌ها  
(۲) وجود بیماری‌های بومی  
(۳) حضور گونه‌های شکارچی  
(۴) عدم حمایت از دوره‌های مختلف زندگی
- ۵- کدام مورد بیانگر یک گروه از موجودات است که از یک منبع مشابه و با روش مشابه استفاده می‌کنند؟
- (۱) Local Guilds  
(۲) Assemblage  
(۳) Ensembles  
(۴) Guilds
- ۶- طول زنجیره‌های غذایی در مناطق باز اقیانوسی نسبت به مناطق ساحلی چگونه است و چه تأثیری بر تولید زنجیره‌های نهایی دارد؟
- (۱) بلندتر بوده و تولید زنجیره‌های نهایی بیشتر است.  
(۲) کوتاه‌تر بوده و تولید زنجیره‌های نهایی کمتر است.  
(۳) بلندتر بوده و تولید زنجیره‌های نهایی کمتر است.  
(۴) کوتاه‌تر بوده و تولید زنجیره‌های نهایی بیشتر است.
- ۷- کدام مورد به ترتیب معرف اوت اکولوژی (Autecology) و سین اکولوژی (Syneccology) است؟
- (۱) اوت اکولوژی و سین اکولوژی مطالعه گروهی از موجودات زنده است بر روی هم واحد مجتمعي را تشکیل می‌دهند.  
(۲) اوت اکولوژی مربوط به مطالعه یک فرد یا گونه است. سین اکولوژی مطالعه گروهی از موجودات زنده است بر روی هم واحد مجتمعي را تشکیل می‌دهند.  
(۳) سین اکولوژی مربوط به مطالعه یک فرد یا گونه است. اوت اکولوژی مطالعه گروهی از موجودات زنده است بر روی هم واحد مجتمعي را تشکیل می‌دهند.  
(۴) اوت اکولوژی و سین اکولوژی مربوط به مطالعه یک فرد یا گونه است.

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

193E

صفحه ۳

- ۸ با وجود اینکه اقیانوس‌ها به هم پیوسته هستند، مهم‌ترین مورد برای جلوگیری از حرکت آزاد موجودات زنده دریاها کدام است؟
- جهت‌یابی صحیح
  - جريان‌های زیرسطحی آب
  - درجه حرارت، غلظت نمک و عمق دریا
  - تفییرات به وجود آمده در زیستگاهها توسط فعالیت‌های انسانی
- ۹ کدام عامل سبب می‌شود که در دریاچه‌های مناطق معتدله لا به بندی حرارتی دیده نشود؟
- عمر زیاد
  - مساحت کم
  - مساحت زیاد
  - عمر بسیار کم
- ۱۰ به کدام دلیل، بیشترین مراکز تجاری پرورش ماهی در منطقه فلات قاره است؟
- کاهش هزینه‌های تولید
  - صرف‌بعلت نزدیکی به ساحل
  - استفاده از کیفیت مطلوب آب در مناطق فلات قاره
  - وجود بیشترین تولید اولیه ناشی از جوشش آب سرد
- ۱۱ کدام بخش سیستم دفعی در ماهیان با اندام مشابه آن در مهره‌داران هومولوگ نیست؟
- مانه
  - نفرون
  - میزانی
  - بخش قدامی کلیه
- ۱۲ کدام جنس، در تعداد بیشتری از ۱۹ حوضه آبریز آبهای داخلی ایران پراکنش دارد؟
- Luciobarbus (۴)      Alburnoides (۳)      Rutilus (۲)      Abramis (۱)
- ۱۳ کدام منطقه، منشأ و مرکز تکامل کپورماهیان محسوب می‌شود؟
- شمال آفریقا
  - جنوب اروپا
  - آمریکای مرکزی
  - آسیای جنوب شرقی
- ۱۴ کدام مورد درباره ماهیان «Myctophiformes» و «Scopelomorpha» درست است؟
- هر دو گروه دارای کیسه شنای فیزواستوموس هستند.
  - هر دو گروه دارای کیسه شنای فیزوکلیتوس هستند.
  - ماهیان Myctophiformes کیسه شنای فیزواستوموس و Scopelomorpha کیسه شنای فیزوکلیتوس دارند.
  - ماهیان Myctophiformes کیسه شنای فیزوکلیتوس و Scopelomorpha کیسه شنای فیزواستوموس دارند.
- ۱۵ کدام ویژگی درباره هاگ فیش‌ها (Myxiniformes) درست است؟
- دارای ۴ قلب ابتدایی ناقص هستند.
  - دارای ۲ کanal نیم‌دایره گوش داخلی هستند.
  - دارای دو باله پشتی کاملاً مجرزا از هم هستند.
  - دارای چشم کاملاً عملکردی همراه با گیرنده‌های نوری در سر هستند.
- ۱۶ ماهی دودمی آفریقایی دارای کدام ساختار است؟
- کیسه شنای فیزوستوم (۴)      Arborescent (۲)      یک جفت سبیلک (۳)
- ۱۷ کدام خانواده ماهیان، بیشترین تعداد گونه را در دریای خزر دارند؟
- Acipenseridae (۴)      Salmonidae (۳)      Clupeidae (۲)      Gobiidae (۱)
- ۱۸ کدام ماهی غیربومی دریای خزر، در سال‌های اخیر به دلیل مرگ و میر کاهش شدیدی داشته است؟
- Cyprinidae (۴)      Salmonidae (۳)      Mugilidae (۲)      Gobiidae (۱)
- ۱۹ کدام نوع فلس، می‌تواند منشأ دندان در ماهیان باشد؟
- کاسمونیدی (۴)      پلاکوتیدی (۳)      گتنوئیدی (۲)

# پیاچ دی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

صفحه ۴

193E

- ۲۰- از لحاظ تکاملی هر چه قدر ماهی‌های استخوانی قدمت بیشتری داشته باشند، گدام مورد درست است؟  
۱) فاصله بین باله شکمی و سینه‌ای آنها کمتر است. ۲) فاصله بین باله مخرجی و شکمی آنها کمتر است.  
۳) فاصله بین باله شکمی و سینه‌ای آنها بیشتر است. ۴) فاصله بین باله مخرجی و شکمی آنها بیشتر است.
- ۲۱- ترتیب درست وقوع مراحل مختلف رسیدگی نهایی تخمک از راست به چپ گدام است؟  
GVBD- GVM-Hydration (۲) GVM-Hydration-GVBD (۱)  
Hydration-GVM- GVBD (۴) Hydration- GVBD – GVM (۳)
- ۲۲- گدام عامل منجر به اختلال در فعالیت آنزیم کوریوناز در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌شود و ماحصل آن گدام است?  
۱) pH اسیدی، تأخیر در تفریخ ۲) طیف ماوراءبنفس، تأخیر در هج  
۳) دمای بالا، افزایش اشتها ۴) نور شدید، تلفات حین چشم‌زدگی
- ۲۳- اضافه نمودن گدام دستگاه به سیستم مدار بسته آب‌شور در مقایسه با آب شیرین در تصفیه مواد آلاینده کارآیی بیشتری دارد؟  
۱) درام فیلتر ۲) تانک رسوب‌گیر ۳) پروتئین اسکیمر ۴) سیستم دنیتریفیکاسیون
- ۲۴- نقاط ضعف استفاده از به کارگیری عصاره غده هیپوفیز در القاء تکثیر مصنوعی ماهیان گدام است?  
۱) عدم وجود هورمون GTHII  
۲) عدم وجود استروئیدهای موردنیاز در آن  
۳) داشتن رطوبت غده هیپوفیز و فعل شدن باکتری‌ها در آن  
۴) مشخص نبودن میزان LH موجود در آن و هورمون‌های با اثر بازدارنده
- ۲۵- تعیین جنسیت ماهیان خاویاری در مراحل ابتدایی رشد با استفاده از گدام هورمون امکان‌پذیر است?  
۱) DHP ۲) مقدار G<sub>n</sub>RH  
۳) گناندوتروپین نوع ۱ و ۲  
۴) استروئیدی استرادیول و تستسترون
- ۲۶- در حال حاضر گونه اصلی پرورشی در سیستم قفس در آبهای ایرانی خلیج‌فارس گدام است?  
۱) هامور ۲) سوکلا ۳) صیبیتی ۴) سی‌باس آسیابی
- ۲۷- اوین مرحله اصلاحی بعد از خروج آب از حوضجه‌های پرورش ماهی در سامانه مدار بسته آبزی‌پروری گدام است?  
۱) Aeration ۲) Solid Removal ۳) UV disinfection ۴) Ammonia Removal
- ۲۸- امکان تولید تخم‌های خارج از فصل out-off season eggs در مولдин قزل‌آلای با اعمال گدام روش امکان‌پذیر است?  
۱) استرس شوری و حرارتی ۲) تزریق هورمون G<sub>n</sub>RH  
۳) تغییرات فتوپریود و درجه حرارت آب ۴) کاربرد جیره‌های غنی از پروتئین و چربی
- ۲۹- در القاء تکثیر ماهیان، هورمون G<sub>n</sub>RH بر GTHI به گدام دلیل ترجیح دارد؟  
۱) باعث رشد سریع و رسیدگی نهایی تخمک می‌شود.  
۲) G<sub>n</sub>RH دکاپتیدی است که در مقابل آنتی‌بادی در بدن ماهیان تشکیل نمی‌شود.  
۳) G<sub>n</sub>RH در سطوح پایین‌تر و نزدیک به تخمک تأثیر گذاشته و اثر بهتری دارد.  
۴) تشابه ساختار G<sub>n</sub>RH در ماهیان مختلف، استفاده از آن را راحت‌تر می‌کند.
- ۳۰- گدام فرایند می‌تواند موجب گندی روند تولید بیوفلاک شود؟  
۱) هواده‌ی ۲) تعویض آب ۳) ورود کربن الی  
۴) وجود گونه‌های مصرف‌کننده از بیوفلاک

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

صفحه ۵

193E

- ۳۱- کدام مورد به طور معمول منجر به اختلال جدی در عملکرد فیلترهای زیستی در سامانه مدار بسته آبزی پروری می‌شوند؟
- Total Dissolved Solid (TDS) (۲)      Total Suspended Solid (TSS) (۱)  
Total Hardness (۴)      Dissolved Oxygen (DO) (۳)
- ۳۲- در انکوباسیون کدام گونه، خطر عفونت قارچی *Saprolegnia* بیشتر است؟
- Huso huso (۲)      Tinca tinca (۱)  
Salmo trutta caspius (۴)      Cyprinus carpio (۳)
- ۳۳- تخمک کدام گونه بعد از تماس با آب، قابلیت لفاح خود را مدت زمان بیشتری حفظ می‌کند؟
- (۱) قره‌برون (۲) کپور معمولی (۳) اردک ماهی (۴) فزل‌آلای رنگین‌کمان
- ۳۴- با بروز فوق رسیدگی **Over ripening** در تخمک آزادماهیان کدام پدیده رخ می‌دهد؟
- (۱) افزایش pH مایع تخدمانی (۲) افزایش فضای پیرازردهای (۳) کاهش محتوای پروتئین مایع تخدمانی (۴) افزایش قابلیت جذب آب پس از لفاح
- ۳۵- اثر کدام ترکیب هورمونی در القاء تکثیر ماهیان مولد سوف بیشتر است؟
- (۱) HCG همراه با پروپیلن گلیکول (۲) HCG همراه با سرم فیزیولوژی (۳) G<sub>n</sub>RH همراه با سرم فیزیولوژی (۴) G<sub>n</sub>RH همراه با پروپیلن گلیکول
- ۳۶- روش خوراکی کاربرد RH<sub>n</sub> برای القاء تکثیر کدام گروه از ماهیان استفاده می‌شود؟
- (۱) آزادماهیان (۲) تاس‌ماهیان (۳) کپورماهیان (۴) سوف‌ماهیان
- ۳۷- مستول اصلی در پیدایش پدیده **Algal Bloom** در استخرهای پرورش ماهی کدام است؟
- (۱) دیاتومه‌ها (۲) تازه‌کاران (۳) جلبک‌های رشته‌ای (۴) جلبک‌های سبز - آبی
- ۳۸- در تکثیر خارج از فصل ماهی قزل‌آلای، تغییرات دوره نوری از طریق کدام هورمون به سیستم غدد درون ریز القاء می‌شود؟
- (۱) ملانین (۲) دوبامین (۳) ملاتونین (۴) پرولاکتین
- ۳۹- ارزیابی هورمونی رسیدگی نهایی تخمک (GVBD) در کدام مرحله رشدی تخمک انجام می‌پذیرد؟
- (۱) در زمان اوولاسیون (۲) بعد از رهاسازی تخمک (۳) درست قبل از اوولاسیون (۴) در مرحله میانه وتیلوژنزوفر
- ۴۰- کدام مورد دلیل استفاده از سینی‌های غذاده‌ی در استخرهای پرورشی می‌گوید؟
- (۱) آگاهی از وضعیت تعذیبه‌ای می‌گوها (۲) جلوگیری از پراکنده شدن غذا (۳) جلوگیری از ایجاد رقابت بین می‌گوها (۴) کنترل شکارچیان و رقبای غذایی
- ۴۱- پتانسیمادر می‌گوهای دریایی کدام مورد است؟
- (۱) پایک‌های داخل دومین جفت پای حرکتی است که در زمان بلوغ به هم جوش می‌خورند. (۲) پایک‌های داخلی اولین جفت پای شنا است که در زمان بلوغ به هم جوش می‌خورند. (۳) پایک‌های داخلی دومین جفت پای شنا است که در زمان بلوغ به هم جوش می‌خورند. (۴) پایک‌های داخلی اولین جفت پای حرکتی است که در زمان بلوغ به هم جوش می‌خورند.
- ۴۲- در می‌گوهای دریایی کدام هورمون توسط اندام ایکس (**x-organ**) ترشح نمی‌شود؟
- (۱) هورمون بازدارنده رشد غدد جنسی (۲) هورمون تنظیم‌کننده قند خون (۳) هورمون تنظیم‌کننده رنگ بدن (۴) هورمون پوست‌اندازی

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

صفحه ۶

193E

- ۴۳- در حال حاضر کدام گونه به عنوان مهم‌ترین گونه میگویی پرورشی به ترتیب در ایران و جهان محسوب می‌شود؟  
(۱) میگویی پا سفید غربی (*Litopenaeus vannamei*) - میگویی پا سفید غربی (*Fenneropenaeus indicus*)  
(۲) میگویی پا سفید هندی (*Litopenaeus vannamei*) - میگویی پا سفید غربی (*Fenneropenaeus indicus*)  
(۳) میگویی پا سفید هندی (*Fenneropenaeus indicus*) - میگویی پا سفید غربی (*Litopenaeus vannamei*)  
(۴) میگویی پا سفید هندی (*Fenneropenaeus indicus*) - میگویی پا سفید هندی (*Fenneropenaeus indicus*)
- ۴۴- بیشترین تلفات دوره لاروی میگویی و انامی در کدام مرحله است؟  
(۱) زوا ۲      (۲) زوا ۳      (۳) مایسیس ۲      (۴) مایسیس ۳
- ۴۵- کدام گونه از آبزیان، در پرورش بلی کالجر مستقیم (**Direct polyculture**) با میگوهای دریایی مناسب هستند؟  
(۱) کپورماهیان      (۲) ماهیان تیلاپیا      (۳) صدف‌های دو کفه‌ای      (۴) خارتان دریایی
- ۴۶- کدام مورد به ترتیب به جلبک‌های سبز - آبی و سبز تعلق دارد؟  
(۱) نوستوک و مالوموناس      (۲) اوگلنا و رودوموناس  
(۳) آنابنا و کلادوفورا      (۴) اسپروژیرا و کلامدوموناس
- ۴۷- در کدام روش تکثیر میگوهای دریایی تخم‌ریزی مولدین، تفریخ تخم و پرورش لارو در یک مخزن انجام می‌شود؟  
(۱) زبانی      (۲) آمریکایی      (۳) تایوانی      (۴) تلفیقی
- ۴۸- در کدام مرحله رشد باید به برداشت فیتوپلاتکتون‌ها اقدام کرد؟
- |                             |     |                            |     |
|-----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Death phase of growth       | (۲) | Lag phase of growth        | (۱) |
| Exponential phase of growth | (۴) | Stationary phase of growth | (۳) |
- ۴۹- کدام مورد احتیاج به دمای بالاتری، برای کشت کلادوسراها در استخرهای خاکی دارد؟  
Moina macrocopa (۲)      Daphnia magna (۱)  
Streptocephalus torvicornis (۴)      Daphnia longespina (۳)
- ۵۰- کدام مورد دلیل استفاده از جلبک‌های جنس ایزوکرایسیس در کارگاه‌های تکثیر ماهیان دریایی است؟  
(۱) درصد بالای پروتئین      (۲) درصد بالای اسیدهای چرب PUFA  
(۳) درصد بالای اسیدهای چرب HUFA      (۴) درصد بالای اسیدهای چرب غیراشبع
- ۵۱- کدام گروه از کربوهیدرات‌ها عمدتاً به عنوان منبع پری‌بیوتیک در آبزی پروری کاربرد دارد؟  
(۱) دی‌ساقارید      (۲) منوساکارید      (۳) پلی‌ساقارید      (۴) اولیگوساکارید
- ۵۲- با وجود سویای خام در غذا انتظار کاهش هضم‌پذیری کدام پارامتر وجود دارد؟  
(۱) هضم‌پذیری کل      (۲) هضم‌پذیری پروتئین      (۳) هضم‌پذیری اسید چرب      (۴) اثر چندانی ندارد
- ۵۳- کدام اسید چرب به فاکتورهای استرسی در ماهی ارتباط بیشتری دارد؟  
(۱) لینولیک      (۲) آراشیدونیک اسید      (۳) ایکوزاپنیک نوئیک اسید      (۴) دکوزاهگزا نوئیک اسید
- ۵۴- کدام ماده ضد مغذی می‌تواند با ویسکوزیتی دستگاه گوارش مقابله کند؟  
(۱) تانین      (۲) نتیبات      (۳) ساپونین      (۴) گلوکوسینولات
- ۵۵- کوانزیمی که از ویتامین ..... در بدن ماهی ساخته می‌شود، تیامین پیروفسفات است و در متابولیسم ..... نقش دارد.  
(۱) B1 - چربی‌ها      (۲) B12 - چربی‌ها      (۳) B12 - کربوهیدرات‌ها      (۴) B1 - کربوهیدرات‌ها
- ۵۶- در آزمایشاتی که به منظور تعیین احتیاجات پروتئینی یک گونه آبزی انجام می‌شود، غذادهی چگونه باید باشد؟  
(۱) در حد سیری ظاهری      (۲) در حد زیر اشباع  
(۳) در حد فوق اشباع      (۴) در حد رفع گرسنگی

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

صفحه ۷

193E

- ۵۷- مادهٔ سمی موجود در پنبه‌دانه که می‌تواند بر قابلیت استفاده از بروتین اثر منفی داشته باشد، کدام است؟  
(۱) گوسیپول      (۲) تانن‌ها      (۳) آنتی‌تریپسین      (۴) مواد گواترزا
- ۵۸- افزایش کدام اسید‌آمینه در جیره ممکن است کارایی استفاده از آرژین را کاهش دهد؟  
(۱) والین      (۲) میتوین      (۳) لیزین      (۴) ترثونین
- ۵۹- پدیده **Sparing effect**. بین کدام اسیدهای آمینه رخ می‌دهد؟  
(۱) لیزین و آرژین      (۲) لوسین و ایزولوسین      (۳) گلیسین و تریپتوفان      (۴) فنیل‌آلانین و تیروزین
- ۶۰- کربوکسی متیل سلوژ (CMC) در جبره غذایی آبزیان به عنوان کدام مورد نقش دارد؟  
(۱) همبند      (۲) فیلر یا پرکن      (۳) آنتی‌اکسیدان      (۴) منبع کربوهیدرات
- ۶۱- در تولید جمعیت‌های تمام ماده ماهیان نر نئومال (Neomale) چه مشخصاتی دارد؟  
(۱) در نسل دوم تولید می‌شوند، زنوتیپ XX دارند و اسپرم تولید می‌کنند.  
(۲) در نسل دوم تولید می‌شوند، زنوتیپ XY دارند و اسپرم تولید می‌کنند.  
(۳) در نسل اول تولید می‌شوند، زنوتیپ XX دارند و اسپرم تولید می‌کنند.  
(۴) در نسل اول تولید می‌شوند، زنوتیپ XY دارند و اسپرم تولید می‌کنند.
- ۶۲- در آمیخته‌گری، سعی در بهره‌برداری از کدام جزء واریانس ژنتیکی است؟  
(۱) افزایش      (۲) اپیستاتیک      (۳) غالیت      (۴) کنش متقابل
- ۶۳- کدام صفت در کپور معمولی به صورت اپیستازی باز رکنترل می‌شود؟  
(۱) الگوی فلس      (۲) ارتفاع بدن      (۳) وزن بدن      (۴) شکل باله‌ها
- ۶۴- حضور درصد قابل توجهی از بجه‌ماهیان طلایی در گله قزل‌آلای رنگین کمان، بیانگر کدام مورد است؟  
(۱) آمیخته‌گری      (۲) افزایش هتروزاگوستینی      (۳) حضور افراد تریپلوبloid  
(۴) بالا بودن ضریب هم‌خونی
- ۶۵- در پرورش قزل‌آلای رنگین کمان، کدام گله بازدهی بالاتری برای پرورش در قفس دارد؟  
(۱) تریپلوبloid (All Female)      (۲) تمام ماده (Triploid)  
(۳) جنسیت مخلوط (Mixed sex)      (۴) تمام ماده تریپلوبloid (All female triploid)
- ۶۶- هورمون E<sub>2</sub> از طریق فعالیت آنزیم ..... از هورمون ..... به دست می‌آید.  
(۱) ۳ $\beta$ HSD - تستوسترون      (۲) Aromatase      (۳) ۲۰ $\beta$ HSD - ۱۷hydroxylase  
(۴) ۱۷hydroxylase - پرژسترون
- ۶۷- غده اولتیموبرانشیال (Ultimobranchial) در ماهی، کدام وظیفه را به عهده دارد؟  
(۱) تولید رنگدانه‌ها      (۲) کنترل رنگدانه‌ها      (۳) تنظیم سوخت و ساز کلسیم  
(۴) تنظیم هورمون رشد
- ۶۸- در فرایند استروئیدزایی در محل گنادماهیان، کدام ترکیب، محصول نهایی اثر استرادیول در کبد است؟  
(۱) کلسترول      (۲) ویتلورژین      (۳) آکتیوین B  
(۴) سیکلین
- ۶۹- در کدام گروه از ماهیان، دوره بلوغ نهایی تخمک کوتاه‌تر است؟  
(۱) آزادماهیان      (۲) کپورماهیان      (۳) ماهیان غضروفی  
(۴) ماهیان خاویاری

# پیاجدی تست: نخستین وبسایت تخصصی آزمون دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز)

صفحه ۸

193E

- ۷۰ - نقش هورمون DHP در کدام یک از مراحل بارزتر است؟  
(۱) بلوغ نهایی تخمک - اسپرمیشن  
(۲) بلوغ نهایی تخمک - اسپرماتوزنر  
(۳) کامل شدن میوز اول تخمک - اسپرمیوزنر  
(۴) کامل شدن میوز اول تخمک - اسپرماتوزنر
- ۷۱ - کدام مورد درباره ماهیان آب شیرین درست است؟  
(۱) محیط بیرون hypoosmotic است و آب تمایل زیادی به ورود به داخل بدن ماهی دارد.  
(۲) محیط بیرون hyperosmotic است و آب تمایل به خروج از بدن ماهی دارد.  
(۳) محیط درون سعی در خروج یون‌های چندظرفیتی برای تنظیم اسمزی بدن دارد.  
(۴) محیط درون و بیرون ماهی تفاوت زیادی ندارند و ماهی دارای ادرار معمولی است.
- ۷۲ - پدیده «Imprinting» مربوط به کدام مورد است؟  
(۱) مهاجرت تعذیه‌ای  
(۲) خاطره‌سپاری ماهیان  
(۳) بازگشت به رودخانه مادری  
(۴) مهاجرت از آب شور به آب شور
- ۷۳ - در زمان استرس ماهیان هورمون کورتیزول تحت تأثیر ..... از ..... ترشح می‌شود.  
(۱) CRH هیپوفیز - کلیه  
(۲) TSH هیپوفیز - کبد  
(۳) G<sub>n</sub>RH هیپوتالاموس - بافت کرومافین کلیه  
(۴) ACTH هیپوفیز - بافت اینترینال کلیه
- ۷۴ - هورمون دوبامین (DA) از کجا ترشح می‌شود و در تکثیر ماهیان چه تأثیری دارد؟  
(۱) مغز - مثبت  
(۲) هیپوفیز - مثبت  
(۳) هیپوتالاموس - منفی  
(۴) گناد - منفی
- ۷۵ - کدام مورد برای ضد عفونی تخم‌های آلوده به ویروس آبزیان مناسب‌تر است?  
(۱) هلامید  
(۲) ترکیبات یددار  
(۳) آکریفلاؤین  
(۴) سولفات مس
- ۷۶ - مهم‌ترین راه انتقال عامل بیماری ایکتیوفونیازیس در ماهیان کدام است?  
(۱) چشم  
(۲) آبشش  
(۳) خوراکی  
(۴) زخم‌های پوستی
- ۷۷ - کدام مورد انگل داخل سلولی است?  
(۱) هنگویا  
(۲) ترکودینا  
(۳) سراتومیکسا  
(۴) ایکتیوسپوریدیوم
- ۷۸ - کدام بی‌مهره آبزی میزان واسط آکانترسفالها است?  
(۱) آمفی‌پودها  
(۲) سیکلوبس  
(۳) گرم‌های کم تار
- ۷۹ - اگزوفتالمی همراه با خونریزی در کره چشم از علائم کدام بیماری ویروسی است?  
(۱) SVC  
(۲) IPN  
(۳) IHN  
(۴) VHS
- ۸۰ - کدام بیماری با افزایش میزان روتیفر در فصول سال مرتبط است?  
(۱) Aeromonasis  
(۲) Yersiniosis  
(۳) Vibriosis  
(۴) Pseudomonas