

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری



کد کنترل

189

E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۹

رشته بیماری‌شناسی گیاهی – کد (۲۴۴۰)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: بیماری‌های گیاهی – مدیریت بیماری‌های گیاهی – قارچ‌شناسی تکمیلی – ویروس‌شناسی گیاهی – پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی – اصول نمادشناسی و نمادهای انگل گیاهی	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقرورات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - کد (۲۴۴۰) ۱۸۹E

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

-۱ کدام بیمارگر با گرده گل آلوده، منتقل می شود؟

Mauginiella scaettae (۲)

Fusarium graminearum (۱)

Ustilago nuda (۴)

Monilinia laxa (۳)

-۲ بیماری های زردی شدید کدوئیان، زوال شاخه درختان و پوسیدگی انتهایی میوه، به ترتیب ناشی از کمبود کدام عنصر است؟

(۱) پتاسیم، گوگرد و فسفر

(۱) آهن، روی و بزر

(۳) مولیبدن، مس و کلسیم

(۳) منگنز و نیتروژن

-۳ کدام مورد جزو انفجار اکسیداتیو در گیاهان محسوب نمی شود؟

O_۲⁻ (۴)

•OH (۳)

NO (۲)

H_۲O_۲ (۱)

-۴ ناقل در کدام گزینه زیر شناخته شده است؟

Fusarium oxysporum f.sp. *lycopersici* (۲)

Cercospora beticola (۱)

Rhizoctonia solani f.sp. *sasakii* (۴)

Phytophthora cactorum (۳)

-۵ بیماری سوختگی غلاف برنج یا شیت بلاست، در اثر کدام قارچ ایجاد شده و چگونه زمستان گذرانی می کند؟

(۱) *Rhizoctonia solani* گروه آناستوموزی AG-1-IA و به صورت اسکلروت های خاکزی

(۲) *Rhizoctonia solani* گروه آناستوموزی AG-4 و به صورت میسلیوم و کلامیدوسپور های خاکزی

(۳) *Rhizoctonia oryzae* گروه آناستوموزی AG-1-IA و به صورت میسلیوم در آب و خاک

(۴) *Rhizoctonia oryzae-sativae* گروه آناستوموزی AG-1-IB و به صورت اسکلروت های خاکزی

-۶ در کدام بیماری، بیمارگر قادر به تکثیر لگاریتمی است؟

(۱) برق زدگی نخود (۲) پیچیدگی برگ هلو (۳) سیاهک برگی گندم (۴) لکه آجری برگ بادام

-۷ در مورد علف جادوگر، کدام گزینه درست است؟

(۱) سلول های حاصل از هسته مکینه، به آوند آبکش میزبان متصل می شوند.

(۲) ریشه های مویی منشاء تشکیل مکینه ها هستند.

(۳) زمستان گذرانی و انتشار آن توسط ریزومها و قطعات گیاهی انجام می گیرد.

(۴) مکینه ها روی ساقه گیاهان میزبان تولید می شوند.

-۸ کدام بیمارگر در آوندهای آبکش فعالیت ندارد؟

Candidatus 'Phytoplasma asteri' (۲)

Candidatus 'Liberibacter asiaticus' (۱)

Leifsonia xyli (۴)

Spiroplasma citri (۳)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۳

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - کد (۲۴۴۰) - ۱۸۹E

- ۹ دامنه میزان کدام بیمارگر، وسیع تر است؟
- Candidatus 'Phytoplasma aurantifolia'* (۲) *Agrobacterium vitis* (۱)
- Xylella fastidiosa* (۴) *Leifsonia xyli* subsp. *xyli* (۳)
- علل بیماری گل سبزکنجد، با کدام بیمارگر ارتباط بیشتری دارد؟
- Candidatus 'Phytoplasma phoenicium'* (۲) *Candidatus 'Liberibacter asiaticus'* (۱)
- Xylella fastidiosa* (۴) *Spiroplasma citri* (۳)
- کدام بیمارگر در رده **Mollicutes** طبقه‌بندی می‌شود؟
- Candidatus 'Phytoplasma asteris'* (۲) *Agrobacterium vitis* (۱)
- Xylella fastidiosa* (۴) *Ralstonia solanacearum* (۳)
- کدام ترکیب مولکولی فقط در ساختار سلولی باکتری‌ها وجود دارد؟
- (۱) پپتیدوگلیکان (۲) فسفولیپید (۳) لیپوپلی‌ساکارید
- (۴) لیپوبروتنین (۵) درباره عامل بیماری زردی مینا و ناقل آن (*aster yellows*)، کدام مورد درست است؟
- (۱) اسپیروپلاسمـا - زنجرک (۲) فیتوپلاسمـا - زنجرک (۳) ویروس - زنجرک (۴) ویروس - شته
- در کدام نماتد، مرحله آلوده‌کننده، ماده‌های جوان است و کیسه‌تخم ایجاد کرده و لوله تناسلی دارد؟
- Tylenchulus* (۲) *Trophotylenchulus* (۱)
- Rotylenchus* (۴) *Rotylenchulus* (۳)
- وجه تشابه نماتدهای «*Ditylenchus dipsaci*» و «*D. destructor*» کدام است؟
- (۱) حضور در خاک و امکان تغذیه از قارچ در غیاب میزان
- (۲) دمای بهینه برای فعالیت و مرحله شروع کننده چرخه زندگی
- (۳) داشتن مرحله مقاوم و مدت زمان بقاء
- (۴) داشتن چند نسل در سال و نحوه تغذیه از گیاه
- کدام نماتدکش، از گروه ایزوتوپوسیات‌ها محسوب می‌شود؟
- (۱) بازامید (۲) تمیک (۳) کلروپیکرین (۴) کاربوفوران
- از نظر تغذیه و بیماری‌زایی، وجود مشترک نماتدهای سیستی و نماتدهای ریشه‌گری، کدام است؟
- (۱) ایجاد سلول‌های تغذیه‌ای و مرحله تشکیل دهنده آن‌ها
- (۲) تعداد هسته سلول‌های تغذیه‌ای و نحوه بوجود آمدن سلول‌ها
- (۳) مراحل شروع کننده آلوگی و نحوه حرکت آن‌ها درون ریشه
- (۴) نوع سلول‌های تغذیه‌ای و تعداد آن‌ها در بافت ریشه
- نماتدهای ریشه‌گری از نظر آرایه‌بندی مبنی بر داده‌های مولکولی و ریخت شناسی، در کدام خانواده قرار می‌گیرند؟
- Hoplolaimidae* (۲) *Heteroderidae* (۱)
- Pratylenchidae* (۴) *Meloidogynidae* (۳)
- ویروس‌های کدام خانواده با پیوند انتقال نمی‌یابند؟
- Endornaviridae* (۲) *Bunyaviridae* (۱)
- Tymoviridae* (۴) *Reoviridae* (۳)
- همانند سازی ژنوم رئوویروس‌ها، در کجای سلول‌های گیاهان آلوده، انجام می‌گیرد؟
- (۱) در بین دو غشای هسته (۲) میتوکندری
- (۳) هسته (۴) سیتوپلاسم

پی اج دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۴

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۴۴۰) ۱۸۹E

- ۲۱ - ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (*Cucurbit yellow stunting disorder virus*) از کدام جنس و تیره است و بوسیله کدام حشره منتقل می شود؟ (به ترتیب از راست به چپ)
- (۱) Bromoviridae - Cucumovirus (۲) Sccoviridae - Comovirus (۳) *Bemisia tabaci* - Closteroviridae - Crinivirus (۴) *Bemisia tabaci* - Geminiviridae - Begomovirus
- ۲۲ - اگر در مطالعه یک بیماری ویروسی، به عاملیت ویروس موزائیک خیار مشکوک شده اید، برای تشخیص قطعی ویروس، کدام روش غیرقابل استفاده است؟
- (۱) الیزا (ELISA) با آنتی بادی اختصاصی ویروس (۲) پی‌سی‌آر (PCR) با آغازگرهای اختصاصی (۳) تعیین وزن مولکولی پروتئین و نوکلئیک اسید ویروس (۴) تعیین وزن مولکولی پروتئین و نوکلئیک اسید ویروس
- ۲۳ - کدام مشخصه مهم، جنس «*Bevemovirus*» را از بقیه جنس‌های خانواده «*Potyviridae*» مجزا می‌کند؟
- (۱) اندازه زنوم با تعداد نوکلئوتید کمتر (۲) عدم وجود ناقل (۳) فقدان (VPs) Viral protein genome – linked (۴) فقدان (HC-Pro) Helper component protease
- ۲۴ - داشتن ناقل اختصاصی شته در کدام گروه از ویروس‌ها، گزارش شده است؟
- (۱) رئوویروس‌ها (۲) توپوویروس‌ها (۳) جمینی ویروس‌ها (۴) مارافی ویروس‌ها
- ۲۵ - اصطلاح (Transmissible small nuclear RNA (TSN-RNA)) جهت اشاره به کدام گزینه است؟
- Nanoviruses (۲) Defective RNA viruses (۱)
Viroids (۴) Satellite RNAs (۳)
- ۲۶ - کدام قارچ کش، واکنش‌های دفاعی گیاه میزبان و سنتز فیتوآلکسین‌ها را برشد آمیخته‌ها تحریک می‌کند؟
- (۱) فوزتیل آلومینیوم (۲) آزوکسی استروبین (۳) بنومیل (۴) کاربن‌دازیم
- ۲۷ - اختلال در سیستم حدنصاب احساس کدام باکتری (QS)، موجب کاهش بیماری‌زایی می‌شود؟
- Pseudomonas syringae* (۲) *Spiroplasma citri* (۱)
Pectobacterium carotovorum (۴) *Pseudomonas viridiflava* (۳)
- ۲۸ - در باکتری «*Pseudomonas fluorescens*» کدام جزء یا متابولیت میکروبی موجب القای مقاومت در گیاه می‌شود؟
- (۱) تازک - پلی‌ساقارید خارج سلولی (۲) تازک - لیپوپلی‌ساقارید (۳) تازک - لیپوپیتیدهای حلقوی (۴) پیلوس - لیپوپیتیدهای حلقوی
- ۲۹ - کدام ترکیب در باکتری «*Bacillus cereus*» اثر اختصاصی علیه «*Oomycetes*» دارد؟
- Zwittermicin A (۴) Siderophore (۳) Bacilysin (۲) Acetoin (۱)
- ۳۰ - کدام مورد، آنتی‌بیوتیک ضد قارچی است که به‌وسیله گونه‌ای از *Trichoderma* تولید می‌شود؟
- (۱) دی‌استیل فلوروگلوبینول (۲) فنازین (۳) کتومین (۴) گلیوتوكسین

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۴۴۰) – ۱۸۹E

- ۳۱ - افزایش رطوبت خاک در کاهش کدام بیمارگر، مؤثر است؟

Macrophomina phaseolina (۲) *Aphanomyces euteichus* (۱)

Verticillium dahliae (۴) *Rhizoctonia solani* (۳)

- ۳۲ - در کدام نوع واکنش گیاه به بیمارگر، بافت مردگی یا واکنش فوق حساسیت روی می دهد؟

(۱) تحمل (۲) افقی (۳) مقاومت نژاد اختصاصی (۴) مقاومت نامیزبانی

- ۳۳ - با توجه به تحقیقات انجام گرفته در ایران و جهان، کدام ترکیب لیپوپیتیدی برای کنترل بیماری های ناشی از فیتوپلاسمما، مؤثر شناخته شده است؟

(۱) ایتورین ها (۲) سورفکتین ها (۳) فنجایسین ها (۴) ویسکوزین ها

- ۳۴ - کدام عامل کنترل بیولوژیک (نام جنس) در تولید سیدروفور نسبت به سایر میکرووارگانیسم ها برتری دارد؟

Trichoderma (۴) *Pseudomonas* (۳) *Chaetomium* (۲) *Bacillus* (۱)

- ۳۵ - مکانیسم اصلی کنترل طبیعی بلایت شاهبلوط در جنگل های اروپا، کدام است؟

(۱) افزایش جمعیت باکتری های آنتاگونیست

(۲) پدیده آنتی بیوز ناشی از سویه های ضعیف قارچ بیمارگر

(۳) غالب شدن جمعیت های هیپوویرولانت قارچ بیمارگر

(۴) مقاومت القایی ناشی از سویه های ضعیف قارچ بیمارگر

- ۳۶ - تولید سیدروفور نوع سالیسیلیک اسید، سبب کدام نوع مقاومت القایی در گیاه می شود؟

ISR (۱) SAR (۱) LAR (۳) ISR (۲)

- ۳۷ - کدام سیستم تنظیم کننده در باکتری ها، بیشتر با رفتارهای وابسته به جمعیت مرتبط است؟

(۱) حد نصاب احساس (QS)

(۲) دو جزئی فسفات

(۳) فاکتور سیگما

- ۳۸ - تفاوت اصلی تولید کنیدیوم به روش تالیک غیرمریستامیک با تالیک مریستامیک، کدام است؟

(۱) تولید زنجیره کنیدیوم در تالیک مریستامیک و کنیدیوم های تکی در تالیک غیرمریستامیک

(۲) تولید زنجیره کنیدیوم در تالیک غیرمریستامیک و کنیدیوم های تکی در تالیک مریستامیک

(۳) رشد سلول زیرکنیدیوم در تالیک غیرمریستامیک و عدم رشد آن در تالیک مریستامیک

(۴) رشد سلول زیرکنیدیوم در تالیک مریستامیک و عدم رشد آن در تالیک غیرمریستامیک

- ۳۹ - کدام گزینه معرف اسپرسوسیست است؟

(۱) سلول های متورم در تراوی ای بازیدیوکارپ

(۲) سلول های عقیم در ریسه اعضای شاخه آمبیکوتا

(۳) سلول های تخم با دیواره ضخیم در اعضای شاخه کیتریدیومیکوتا

(۴) سلول های دارای دیواره ضخیم در دیواره سودوپارانشیمی آسکوکارپ

- ۴۰ - کدام جنس از نظر انتوژنی کنیدی زایی در گروه «meristem arthrosporae» قرار می گیرد؟

Ramularia (۴) *Geotrichum* (۳) *Erysiphe* (۲) *Curvularia* (۱)

- ۴۱ - وجود سلول های تازک دار و متحرک در قارچ های واقعی، کدام پدیده فیلوزنیکی را نشان می دهد؟

(۱) حالت آپومورفیک

(۲) وجود صفات همگرا

(۳) وجود صفات واگرا

پي اچ دي تست؛ نخستين و پ ساپت تخصصي آزمون دكتري

- ۴۲ کدام گزینه جنس *Glovinomyces* را کامل تر توصیف می‌کند؟

 - (۱) آسکوکارپ از نوع پریتیسیوم، آسک‌ها یک عدد در هر آسکوکارپ، کنیدیوم‌ها زنجیری
 - (۲) آسکوکارپ از نوع پریتیسیوم، آسک‌ها بیش از یک عدد در هر آسکوکارپ، کنیدیوم‌ها زنجیری
 - (۳) آسکوکارپ از نوع کاسموتیسیوم، آسک‌ها بیش از یک عدد در هر آسکوکارپ، کنیدیوم‌ها منفرد
 - (۴) آسکوکارپ از نوع کاسموتیسیوم، آسک‌ها بیش از یک عدد در هر آسکوکارپ، کنیدیوم‌ها زنجیری

-۴۳ چگونه وجود قارچ‌های هموتالیک، مسئله تشخیص گونه بیولوژیک در قارچ‌ها را دچار محدودیت می‌کند؟

 - (۱) آزمون باروری بین دو تیپ آمیزشی امکان‌پذیر نیست.
 - (۲) در این قارچ‌ها هرگز تولید مثل جنسی دیده نمی‌شود.
 - (۳) آگر چه آزمون باروری بین دو تیپ آمیزشی امکان‌پذیر است ولی در این قارچ‌ها تولید مثل جنسی دیده نمی‌شود.
 - (۴) آزمون باروری بین دو تیپ آمیزشی امکان‌پذیر نیست و در این قارچ‌ها هرگز تولید مثل جنسی دیده نمی‌شود.

-۴۴ دلیل به وجود آمدن ساختار قوس اتصال در ریسه‌های **Basidiomycota** کدام است؟

 - (۱) انتقال مواد غذایی به سلول مجاور
 - (۲) تولید بازیدیوکارپ در زمان مناسب
 - (۳) حفظ حالت دیکاریوتیک در ریسه‌ها
 - (۴) کمک به تقسیم میوزی در اندام جنسی

-۴۵ انشعابات در درخت فیلوژنتیکی ناشی از کدام صفات است؟

 - (۱) آنالوگ
 - (۲) آپومورفیک
 - (۳) پلزیومورفیک
 - (۴) زنولوگ

-۴۶ آنالیز فیلوژنی مولکول قارچ‌ها بر پایه کدام عامل تحولی در ظنوم قارچ‌ها استوار است؟

 - (۱) تنوع در اثر نوترکبی
 - (۲) تنوع در اثر تولیدمثل جنسی
 - (۳) جهش نقطه‌ای از نوع جانشینی
 - (۴) جهش نقطه‌ای از نوع حذف یا اضافه شدن

-۴۷ مفهوم «متراffد اختیاری» در نام‌گذاری قارچ‌ها را کدام گزینه نشان می‌دهد؟

 - (۱) به دلایل مختلف، یک آرایه دو یا چند نام پیدا کرده است، به طوری که همه مرتبط با یک تیپ هستند.
 - (۲) متراffد اختیاری، همان مفهوم متوتیپیک است و با علامت \equiv نشان داده می‌شود.
 - (۳) ریشه در تاکسونومی دارد، به طوری که نمونه تیپ آن‌ها یکی نیست.
 - (۴) ریشه در نام‌گذاری دارد و مفهوم تاکسونومیک ندارد.

-۴۸ منشأ پیدایش هیف‌های آسکزا در قارچ‌های **Ascomycota** کجا است؟

 - (۱) از آسکوگونیوم منشأ می‌گیرند و در صورت نبود آسکوگونیم، از سلول‌های دیگر خارج می‌شوند و عموماً دو هسته هاپلوبیوت سازگار نر و ماده دارند.
 - (۲) از آنتریدیوم منشأ می‌گیرند و در صورت نبود آن، از سلول‌های دیگر خارج می‌شوند و عموماً یک هسته هاپلوبیوت دارند.
 - (۳) از پایه آسکوگونیوم منشأ می‌گیرند و در صورت نبود آن از سلول‌های آنتریدیوم خارج می‌شوند و عموماً دیپلوبیوت هستند.
 - (۴) از آنتریدیوم منشأ می‌گیرند و عموماً یک هسته دیپلوبیوت دارند.

-۴۹ مهم‌ترین خصوصیات فراساختاری زتوسپور در قارچ‌های **Chytridiales** که در طبقه‌بندی آن‌ها نیز کاربرد دارد، کدام است؟

 - (۱) در زتوسپور، هسته به کینوتوزوم متصل است و یک قطره چربی بزرگ در کنار هسته قرار دارد.
 - (۲) در زتوسپور، هسته به کینوتوزوم متصل نیست و یک قطره چربی بزرگ در برابر هسته قرار دارد.
 - (۳) در زتوسپور، ریبوزوم‌ها پراکنده بوده و چندین قطره چربی بزرگ در اطراف هسته قرار دارد.
 - (۴) در زتوسپور، ریبوزوم‌ها در بالای هسته تجمع پیدا کرده‌اند و چند قطره چربی بزرگ در اطراف میتوکندری‌ها وجود دارد.

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۷

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۴۴۰) ۱۸۹E

- ۵۰- با توجه به مفهوم جنسیت و سازگاری در قارچ‌ها، کدام گزینه درست است؟
۱) در قارچ‌های یکپایه هرتال لزوماً دارای دو ساختار جنسی نر و ماده سازگار با هم است.
۲) یک قارچ با سیستم هموتال ثانویه در اصل هتروتال و خودناباور است.
۳) یک قارچ هتروتال ممکن است هرمافروخت بوده و با تولید اسپور جنسی، ریسمای تولید کند که خودبارور باشد.
۴) یک قارچ هتروتال ممکن است بعد از تولید اسپور جنسی، ریسمای تولید کند که خودبارور باشد.
- ۵۱- جایگاه ناکسونومیکی ویروس موزائیک بذرزاد گندم، کدام است؟
۱) جنس Benyvirus و فاقد تیره Varicosavirus
۲) جنس Virgaviridae و تیره Tobamovirus
۳) جنس Furovirus و تیره Virgaviridae
- ۵۲- کدام خصوصیت در تفکیک دو جنس *Polerovirus* و *Luteovirus* اهمیت ندارد؟
۱) ساختار انتهای ۳' زنوم
۲) ساختار انتهای ۵' زنوم
۳) حضور چارچوب خوانش باز ۰
۴) فاصله دو بلوك زنی
- ۵۳- در کدام گروه از ویروس‌ها، آنزیم لازم برای شروع تکثیر ژنوم در پیکره‌های ویروس، جای‌سازی شده است؟
۱) بروموویروس‌ها
۲) تنوئی ویروس‌ها
۳) کالیمووویروس‌ها
۴) نانوویروس‌ها
- ۵۴- پدیده «cap-snatching» در کدام گروه از ویروس‌ها، وجود دارد؟
۱) بروموویروس‌ها
۲) پوتی ویروس‌ها
۳) تنوئی ویروس‌ها
۴) لوٹکووویروس‌ها
- ۵۵- کدام گزینه در مورد چگونگی انجام disassembly در ویروس TMV درست است؟
۱) فقط از طرف ۳' توسط رپلیکاز ویروسی انجام می‌شود.
۲) فقط از طرف ۵' توسط ریبوزوم میزان انجام می‌شود.
۳) از طرف ۵' و ۳' به ترتیب توسط هلیکاز و رپلیکاز ویروسی انجام می‌شود.
۴) از طرف ۵' و ۳' به ترتیب توسط ریبوزوم میزان و رپلیکاز ویروسی انجام می‌شود.
- ۵۶- کدام خصوصیت در طبقه‌بندی ویروئیدها به دو خانواده مؤثر نیست؟
۱) تجمع درون سلولی
۲) دامنه میزانی
۳) ساختار ثانویه ژنوم
۴) فعالیت خود بُرشی
- ۵۷- تاکنون سامانه کریپسپر برای کنترل کدام گروه‌های ویروسی استفاده نشده است؟
۱) دارای ژنوم دی ان ای تک لا
۲) دارای ژنوم آر ان ای تک لا
۳) دارای ژنوم دی ان ای دو لا
۴) دارای ژنوم آر ان ای دو لا
- ۵۸- کدام مورد، جزو اجزای تشکیل‌دهنده مجموعه تکثیر در ویروس‌ها، نیست؟
Replicative form (۲)
Replicative intermediate (۴)
Host factors (۱)
Viral replicase (۳)
- ۵۹- در طبقه‌بندی جنس‌های تیره Closteroviridae، کدام خصوصیت کاربرد ندارد؟
۱) اندازه ژنوم
۲) تعداد پیکره
۳) موقعیت ژن پروتئین پوششی
۴) ناقل
- ۶۰- جنس «*Liberibacter*»، به کدام گروه تعلق دارد?
β - Proteobacteria (۲)
ε - Proteobacteria (۴)
α - Proteobacteria (۱)
γ - Proteobacteria (۳)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۸

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - کد (۲۴۴۰) ۱۸۹E

- ۶۱ از نظر تاکسونومی، باکتری *Xylella fastidiosa* به کدام جنس نزدیک‌تر است؟
- Xanthomonas* (۴) *Pseudomonas* (۳) *Erwinia* (۲) *Clavibacter* (۱)
- ۶۲ کدام ترکیب در پدیده *Agrobacterium tumefaciens* باکتری **chemotaxis** دخالت دارد؟
- Syringomycin* (۴) Octopine (۳) Acetosyringone (۲) Agrocine (۱)
- ۶۳ در باکتری‌های جنس *Pectobacterium spp.*، آنزیم‌های پکتیناز، با سیستم ترشحی نوع چند، خارج می‌شوند؟
- (۱) (۱) (۲) (۲) (۳) (۳) (۴) (۴)
- ۶۴ کدام توکسین باکتریایی در چرخه اوره گیاه میزان، اختلال ایجاد می‌کند؟
- (۱) تب توکسین (۴) (۲) تاکستومین (۳) (۳) فازئولوتوكسین (۴)
- ۶۵ ناقل باکتری 'Candidatus' *Liberibacter asiaticus*' از کدام گروه حشرات است؟
- (۱) پسیل‌ها (۴) (۲) سفید بالک‌ها (۳) شته‌ها (۴) زنجرک‌ها
- ۶۶ کدام باکتری از گروه **Fastidious Bacteria** نیست؟
- Liberibacter asiaticus* (۲) *Leifsonia xyli* (۱)
Xanthomonas campestris (۴) *Xylella fastidiosa* (۳)
- ۶۷ فیتوپلاسمها با کدام تاکسون قرابت بیشتری دارند؟
- Candidatus 'Phlomobacter fragariae'* (۱) *Candidatus 'Liberibacter asiaticus'* (۲)
Spiroplasma kunkelii (۳) *Xylella fastidiosa* (۴)
- ۶۸ در کدام باکتری‌ها وجود دارد؟
- outer membrane
Proteobacteria (۴) *Mollicutes* (۳) *Firmicutes* (۲) *Archaea* (۱)
- ۶۹ کدام توکسین باکتریایی باعث نشت یونی از داخل سلول به فضای میان سلولی می‌شود؟
- Tabatoxin* (۴) *Syringomycin* (۳) *Syringoline* (۲) *Phaseolotoxin* (۱)
- ۷۰ در فرایند بیماری‌زای باکتری *Agrobacterium tumefaciens*، سیگنال‌های مولکولی گیاهان میزان توسط محصول کدام جفت زن دریافت می‌شوند؟
- virC و virF (۴) virD و virH (۳) virA و chvE (۲) virB و virC (۱)
- ۷۱ تولیدمثل به طریق بکرزاوی میتوژی در کدام جنس دیده می‌شود و چه حالتی دارد؟
- Globodera* (۲) - اختیاری *Globodera* (۱) - اجباری
Meloidogyne (۴) - اجباری *Meloidogyne* (۳) - اختیاری
- ۷۲ در بروز کدام بیماری گیاهی، تنها عامل نمادی دخالت دارد؟
- (۱) پژمرده‌گی کاج (۲) خوش صمغی گندم (۳) سفیدی نوک برگ برنج (۴) گل کلم توت‌فرنگی
- ۷۳ ایجاد بیماری زوال سریع در مرکبات، داشتن دو شکلی جنسی در جلوی بدن، داشتن دو لوله جنسی و تخریب سلول‌های پوست ریشه گیاه میزان، به کدام گونه مربوط است؟
- Nacobbus aberrans* (۲) *Pratylenchus penetrans* (۱)
Tylenchulus semipenetrans (۴) *Radopholus similis* (۳)

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز) – کد (۲۴۴۰) ۱۸۹E

- ۷۴- در مورد همه نمادهای انگل داخلی اندام‌های زیرزمینی گیاهان زراعی، کدام گزینه صادق است؟^۳
- (۱) داشتن stomatostyle و مری همپوشان
 - (۲) داشتن onchiostyle و شبکه کوتیکولی سر رشد یافته
 - (۳) داشتن odontostyle و عدم توانایی تغذیه از فارج
 - (۴) داشتن stomatostyle و توانایی بقاء به مدت چند سال در غیاب میزان
- ۷۵- در کدام گزینه، نماد ماده به نوعی سیستم تبدیل می‌شود؟
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <i>Meloidoderita</i> (۲) | <i>Cacoparus</i> (۱) |
| <i>Trophotylenchulus</i> (۴) | <i>Tylenchocriconema</i> (۳) |
- ۷۶- در کدام گروه از نمادهای انگل گیاهی، مری دارای همپوشانی و سطوح جانبی دارای چهار شیار طولی است؟^۴
- | | |
|--|--|
| <i>Rotylenchus - Scutellonema</i> (۲) | <i>Hoplolaimus - Pratylenchoides</i> (۱) |
| <i>Tylenchorhynchus - Pratylenchus</i> (۴) | <i>Rotylenchulus - Zygatylenchus</i> (۳) |
- ۷۷- در آرایه‌بندی مبتنی بر داده‌های مولکولی در زیرراسته *Tylenchina*، کدام خانواده از نمادهای انگل حشرات (EPNs) قرار می‌گیرد؟
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Mermithidae</i> (۲) | <i>Heterorhabditidae</i> (۱) |
| <i>Steinernematidae</i> (۴) | <i>Neotylenchidae</i> (۳) |
- ۷۸- تفاوت بارز *Psilenchus* با دیگر اعضای خانواده *Tylenchidae*، کدام است؟
- (۱) دو شکلی جنسی
 - (۲) شکل و اندازه گره‌های استایلت
 - (۳) میزان رشد شبکه کوتیکولی سر
 - (۴) وجود فاسمید و داشتن دو لوله تناسلی در ماده‌ها
- ۷۹- دو جنس «*Hemicyclophora*» و «*Hemicriconemoides*» را می‌توان با کدام صفت‌ها از همدیگر تشخیص داد؟
- (۱) آرایش شیارهای عرضی پوست - شکل مری
 - (۲) شکل و جهت تمایل گره‌های استایلت - فاصله شکاف تناسلی تا انتهای بدن
 - (۳) شکل مری - آرایش شیارهای عرضی و شیارهای سطوح جانبی پوست
 - (۴) شکل دم - تعداد لوله‌های جنسی در افراد ماده
- ۸۰- شباهت و تفاوت دو جنس *Tylenchulus* و *Pratylenchus* به ترتیب، کدام است؟
- (۱) داشتن یک لوله جنسی در افراد ماده - نحوه اتصال مری با روده
 - (۲) داشتن دو لوله جنسی در افراد ماده - عدم رشد لوله اولیه مری
 - (۳) دو شکلی جنسی - داشتن یک لوله جنسی در افراد ماده
 - (۴) نحوه اتصال انتهای مری با روده - دو شکلی جنسی

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیر) – کد (۲۴۴۰) – ۱۸۹E

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۱

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیر) – کد (۲۴۴۰) – ۱۸۹E

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیر) – کد (۲۴۴۰) – ۱۸۹E