



214E

کد کنترل

214

E

دفترچه شماره (1)

صبح جمعه

۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۳۹۹

رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان - کد (۲۷۰۸)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: بیماری‌های طیور - تغذیه و پرورش طیور - پاتوبیولوژی (فارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، باکتری‌شناسی، ایمونولوژی، آسیب‌شناسی، اتکل‌شناسی و کلینیکال پاتولوژی)	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و یا متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱- کدام بیماری خطر انتقال عمودی داشته و برای مقابله با رخداد آن در نتاج، گله های مادر بر علیه آن واکسینه می شوند؟

(۱) آبله	(۲) لکوز	(۳) مارک	(۴) آنسفالومیلیت پرندگان
----------	----------	----------	--------------------------
- ۲- عامل هیپاتیت همراه با گنجیدگی IBH از کدام سروتیپ نمی باشد؟

(۱) Fadv 4	(۲) Fadv 1	(۳) Fadv 8	(۴) Fadv 2
------------	------------	------------	------------
- ۳- سویه واکسن لاسوتا در نیو کاسل قرار گرفته است و ICPI آن برابر با می باشد.

(۱) ژنوتیپ ۱-۶/۰	(۲) ژنوتیپ ۳-۴/۰	(۳) ژنوتیپ ۲-۴/۰	(۴) ژنوتیپ ۳-۶/۰
------------------	------------------	------------------	------------------
- ۴- در کالبدگشایی مرغان مبتلا، وجود غشاء نکروتیک در قسمت حنجره و نای و نیز وجود تورم در سینوس ها در قسمت فوقانی دستگاه تنفس و نیز حضور دانه های سفید رنگ در محوطه دهان، شما را به کدام بیماری بیشتر مشکوک می کند؟

(۱) آبله	(۲) کمبود ویتامین A	(۳) ILT	(۴) کریزای عفونی
----------	---------------------	---------	------------------
- ۵- چرا در بیماری نیوکاسل از آزمایش ELISA استفاده نمی شود؟
 - (۱) چون آزمایش پرهزینه و زمان بری می باشد.
 - (۲) چون قادر به اندازه گیری اختصاصی آنتی بادی های خنثی کننده ویروس نیست.
 - (۳) چون حساسیت و ویژگی پایین تری نسبت به HI دارد.
 - (۴) چون ویژگی بالاتری دارد ولی آزمایش پر خطایی است.
- ۶- پرولاپس دستگاه تناسلی پرندۀ نر و خونریزی عروقی دستگاه گوارش از علائم بالینی کدام بیماری در اردک سانان است؟

(۱) پاستورلوز پرندگان	(۲) هیپاتیت ویروسی اردک DVH
(۳) آنتریت ویروسی اردک DVE	(۴) آنتریت نکروتیک کلسترییدیایی
- ۷- در مورد سالمونلا پولوروم و گالیناروم کدام گزینه صحیح تر است؟
 - (۱) هر دو دارای آنتی ژن های O_{13} , O_{9} , O_{1} و H می باشند.
 - (۲) از سالمونلاهای پاراتیفوئیدی غیرمتحرک هستند.
 - (۳) واریانت های آنتی ژن O_{13} در پلوروم مشاهده شده ولی در گالیناروم مشاهده نشده است.
 - (۴) تاکنون در آن ها واریانت های آنتی ژنی در آنتی ژن O_{13} مشاهده نشده است.
- ۸- کدام اختلال رخداد بالاتری در جوجه های گوشتی نسبت به مرغ های تخم گذار دارد؟

(۱) دیسکندروپلازی درشتنی	(۲) سندرم کبد چرب خونریزی دهنده
(۳) استئوپروزیس	(۴) اورولیتیاژیس

- ۹- کدام گزینه برای درمان بیماری اسپرژیلور تنفسی در جوجه‌های مبتلا در هفته اول پرورش به کار می‌رود؟
 (۱) ایتراکونازول
 (۲) لینکوسایکتین
 (۳) مترونیدازل
 (۴) کات کبود $CuSO_4$
- ۱۰- در سیر عفونت کدام‌گونه ایمریای ماکیان مراحل جنسی عفونت، جراحات بافتی بیش‌تری را نسبت به مراحل غیر جنسی ایجاد می‌کند؟
 (۱) ایمریا ماکزیما
 (۲) ایمریا تنلا
 (۳) ایمریا نکاتریکس
 (۴) ایمریا برونٹی
- ۱۱- وقوع تلفات بالا همراه با علائم تنگی نفس شدید و خروج موکوس خون‌آلود از محوطه دهانی در کدام بیماری دیده می‌شود؟
 (۱) فرم مزمن پاستورلوز
 (۲) فرم حاد پاستورلوز
 (۳) فرم آنزوتیک لارنگوتراکئیت عفونی
 (۴) فرم ایی‌زئوتیک لارنگوتراکئیت عفونی
- ۱۲- تمام موارد درباره‌ی بیماری برونشیت عفونی درست است مگر.....
 (۱) تخمک‌گذاری پرندگان مبتلا دچار اختلال می‌شود.
 (۲) سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید تخم‌مرغ می‌شود.
 (۳) شکل تخم‌مرغ در پرندگان فاقد ایمنی تغییر می‌کند.
 (۴) مرگ و میر قابل اغماص است مگر در شرایط محیطی نامناسب و بیماری‌های هم‌زمان.
- ۱۳- منشاء کدام سروتیپ ویروس‌های بیماری مارک از بوقلمون است؟
 (۱) سروتیپ ۴
 (۲) سروتیپ ۳
 (۳) سروتیپ ۱
 (۴) سروتیپ ۲
- ۱۴- کدام گزینه در مورد آنفلوآنزای پرندگان تیپ A درست است؟
 (۱) عامل آن به روش افقی و عمودی بین پرندگان منتقل می‌شود.
 (۲) عامل آن یک DNA ویروس دارای ژنوم ۸ قطعه‌ای است.
 (۳) علاوه بر پرندگان، انسان، اسب و خوکچه هندی را مبتلا می‌کند.
 (۴) تفاوت آن با تیپ‌های B و C در پادگن‌های نوکلئوپروتئین است.
- ۱۵- کدام فاکتور برای رشد سویه‌های مستقل از NAD یا Nicotinamide Adenine Dinucleotide هموفیلوس (آویباکتریوم) پاراگالیناروم (*H. paragallinarum* strain - independent NAD) ضروری است؟
 (۱) فاکتور X
 (۲) فاکتور V
 (۳) فاکتورهای X و V
 (۴) نیاز به فاکتورهای X و V ندارد.
- ۱۶- کدام عبارت در مورد سندروم آسیت و سندروم مرگ ناگهانی درست است؟
 (۱) وقوع درگیری هر دو سندروم در طیور گوشتی بین هفته‌های ۳ و ۶ می‌باشد.
 (۲) هر دو سندروم به شکل حاد طیور گوشتی را درگیر می‌کند.
 (۳) هر دو سندروم موجب تورم شدید کبد همراه با خونریزی می‌شود.
 (۴) هر دو سندروم موجب نارسایی قلبی - ریوی می‌شوند.
- ۱۷- معمول‌ترین شیوه برای کاهش انتقال عمودی آلودگی میکوبلاسمایی به جوجه‌های گوشتی کدام است؟
 (۱) تزریق آنتی‌بیوتیک به داخل تخم‌مرغها
 (۲) غوطه‌ور کردن تخم‌مرغها در محلول‌های آنتی‌بیوتیکی
 (۳) اضافه کردن آنتی‌بیوتیک در آب گله‌های مادر
 (۴) حرارت دادن تخم‌مرغها تا دمای ۴۶ درجه سانتی‌گراد

- ۱۸- ویروس نیوکاسل چه مدت در لاشه و بستر به ترتیب زنده می‌ماند؟
 (۱) حدود دو ماه - دو هفته
 (۲) حدود دو ماه - دو ماه
 (۳) حدود دو سال - دو ماه
 (۴) حدود دو ماه - دو سال
- ۱۹- در کدام یک از بیماری‌های ویروسی پرندگان حالت نهفته ویروس بیش‌تر رخ می‌دهد؟
 (۱) آنفلوآنزای پرندگان (۲) لارنگوتراکئیت (۳) برونشیت عفونی (۴) نیوکاسل
- ۲۰- همهٔ افزودنی‌های دان در هفته‌های اول پرورش می‌توانند از بروز سندروم آسیت پیش‌گیری کنند بجز
 (۱) ویتامین C (۲) آهن و مس
 (۳) ویتامین F₁ و سلنیوم (۴) آل - آرژینین و آل - کارنیتین
- ۲۱- نکروز آتشفشانی در کبد، از نشانی‌های کدام بیماری است؟
 (۱) کلأمیدوزیس (۲) اسپروکتوزیس (۳) هیستومونیاژیس (۴) تریکوماناسیوزیس
- ۲۲- نکروز برجسته و تکمه مانند از جمله در مری اردک از علائم کدام بیماری است؟
 (۱) DVE (۲) DVH (۳) AI (۴) FC
- ۲۳- کدام عبارت در مورد ویروس عامل بیماری AE صحیح‌تر است؟
 (۱) پاتوتیپ نروتروویک همان سویه طبیعی فیلد است.
 (۲) ویروس بیماری دارای دو سروتیپ است.
 (۳) جدایه‌های ویروس از نظر سرولوژیکی متفاوت هستند.
 (۴) دو پاتوتیپ از ویروس در این بیماری شناسایی شده است.
- ۲۴- بوتولیسم حیوانات معمولاً توسط سویه‌های متعلق به کدام گروه به وجود می‌آید؟
 (۱) III (تیپ C و D) (۲) IV (تیپ C و D) (۳) I (تیپ C و D) (۴) II (تیپ F و G)
- ۲۵- کدام عامل ویروسی در هسته سلول تکثیر می‌یابد؟
 (۱) آنفلوآنزای پرندگان (۲) نیوکاسل
 (۳) برونشیت (۴) هر سه گزینه درست است.
- ۲۶- متحمل‌ترین منبع آلودگی با تیپ کلستری‌دیوم در واحدهای طیور چیست؟
 (۱) لاشه‌های تلف شده (۲) بستر (۳) خوراک (۴) لارو حشرات
- ۲۷- عامل بیماری نیوکاسل از نظر سرولوژیک با کدام یک از دیگر پارامیکسو ویروس‌های پرندگان (APMV) واکنش متقاطع نشان می‌دهد؟
 (۱) APMV-۹ (۲) APMV-۲ و APMV-۵
 (۳) APMV-۲ و APMV-۷ (۴) APMV-۴ و APMV-۵
- ۲۸- در مورد آبله پرندگان یا FP کدام گزینه صحیح‌تر است؟
 (۱) در قناری سیستمیک است و گنجیدگی‌های داخل سیتوپلاسمی دارد.
 (۲) هیپرپلازی اپی‌تلیوم و گنجیدگی داخل هسته مشاهده می‌شود.
 (۳) این بیماری در کبوتر سیستمیک هم بوده و هیپرپلازی اپی‌تلیوم مشاهده می‌شود.
 (۴) در قناری سیستمیک هست و گنجیدگی‌های داخل هسته‌ای هم مشاهده می‌شود.
- ۲۹- تفاوت حدت بین سویه‌های ویروس بروس عفونی مربوط به اختلاف در کدام پروتئین است؟
 (۱) VP₅ (۲) VP₂ (۳) VP₁ (۴) VP₂ و VP₁
- ۳۰- عامل کدام بیماری ایمنوساپرسیو نمی‌باشد؟
 (۱) ND - FP (۲) ND - CIA (۳) FP - DVE (۴) IBD - MD

- ۳۱- برای نگهداری و ذخیره آووسیت‌های آیمربا از کدام محلول استفاده می‌شود؟
 (۱) دی سولفات (۲) بی کرومات پتاسیم (۳) دی کرومات پتاسیم (۴) کلرید آمونیوم
- ۳۲- کدام گزینه در مورد IBDV صحیح است؟
 (۱) VP_۱ در آزادسازی و انتشار نقش دارد. (۲) دو سروتیپ توسط VP_۲ از هم تفکیک می‌شوند.
 (۳) VP_۲ نقش اصلی را در حفاظت پرنده بر عهده دارد. (۴) VP_۲ دارای پادگن خاص گروهی هر دو سروتیپ است.
- ۳۳- کمبود کدام ویتامین در جوجه‌ها می‌تواند سبب تورم مشخص عصب سیاتیک شود؟
 (۱) B_۲ (۲) B_۱ (۳) B_۶ (۴) B_{۱۲}
- ۳۴- کدام مایکوتوکسین دارای فعالیت استروژنی است؟
 (۱) سیتربینین (۲) زیرانون (۳) آفلاتوکسین (۴) مونیلی فرمین
- ۳۵- جهت جداسازی سالمونلا از پوسته تخم‌مرغ آلوده به مدفوع کدام محیط ترجیح دارد؟
 (۱) Blood Agar (۲) Trypticase Soy Broth
 (۳) Buffered Peptone Water (۴) Tetrathionate Broth
- ۳۶- کدام گزینه در مورد بیماری پلوروم صحیح نمی‌باشد؟
 (۱) نام دیگر آن اسهال سفید باسیلی است.
 (۲) از نظر سلامت عمومی بسیار حائز اهمیت است.
 (۳) عمدتاً در جوجه‌های زیر ۳ هفته دیده می‌شود.
 (۴) این بیماری باعث تلفات بالای جنین‌ها در تخم‌مرغ می‌شود.
- ۳۷- مصرف کدام کوکسیدیواستات در بوقلمون ایجاد مسمومیت می‌کند؟
 (۱) لازالوسید (۲) نیکاربازین (۳) سالینوماسین (۴) آمپرولیوم
- ۳۸- در آزمایش آنتی‌بیوگرام به روش انتشار دیسک نتیجه آزمایش به چه صورت اعلام می‌شود؟
 (۱) شعاع هاله عدم رشد باکتری اطراف دیسک (۲) شعاع هاله رشد باکتری اطراف دیسک
 (۳) قطر هاله رشد باکتری اطراف دیسک (۴) قطر هاله عدم رشد باکتری اطراف دیسک
- ۳۹- در درمان عفونت کیسه زرده کدام گزینه صحیح است؟
 (۱) درمان ندارد (۲) بهبود تهویه
 (۳) تجویز الکترولیت (۴) تجویز انروفلوکساسین بلافاصله پس از تشخیص
- ۴۰- کدام گزینه در مورد بیماری برونشیت عفونی صحیح نمی‌باشد؟
 (۱) این بیماری سبب کاهش کیفیت داخلی و خارجی تخم‌مرغ می‌شود.
 (۲) ویروس عامل بیماری می‌تواند از راه هوا منتقل شود.
 (۳) ویروس عامل بیماری به اکثر ضدعفونی‌کننده‌ها حساس است.
 (۴) شدت بیماری در بوقلمون بیش‌تر از ماکیان است.
- ۴۱- کدام عبارت در مورد کلی پاسیلوز پرندگان صحیح‌تر است؟
 (۱) پان‌افتالمیت از عفونت‌های شایع موضعی پرندگان بالغ است.
 (۲) سینوویت از عوارض شایع متعاقب کلی سپتی سمی پرندگان است.
 (۳) کلی گرانولوما از عوارض شایع متعاقب کلی سپتی سمی پرندگان بالغ است.
 (۴) آنسفالیت از عوارض متعاقب کلی سپتی سمی پرندگان جوان است.

- ۴۲- عامل بیماری **PBFD** در طوطی سانان چیست؟
 (۱) کرونا ویروس
 (۲) رتو ویروس
 (۳) آنترو ویروس
 (۴) سیرکو ویروس
- ۴۳- کدام عبارت در مورد عامل وبای پرندگان یا پاستورلوز صحیح تر است؟
 (۱) پاستورلا مولتی سیدا از راه تخم مرغ منتقل می شود.
 (۲) پاستورلا مولتی سیدا از راه گوارش منتقل می شود.
 (۳) پاستورلا مولتی سیدا در محیط مک کانکی رشد نمی کند.
 (۴) پاستورلا مولتی سیدا دارای ۱۸ سروتیپ است.
- ۴۴- تعداد زیادی از پرندگان یک گله ماکیان گوشتی در سن ۲ هفته، علائمی نظیر پارالیز پاها، عدم تمایل به راه رفتن، راه رفتن روی مفصل خرگوشی با کمک بال ها نشان دادند. در برخی از پرندگان پنجه ها به سمت داخل خم شده بودند. در بررسی جراحات کالبدگشایی، ضخیم شدن اعصاب سیاتیک مشاهده گردید. به کدام یک از موارد زیر مشکوک می شوید؟
 (۱) بیماری مارک
 (۲) کمبود تیامین
 (۳) کمبود ریوفلاوین
 (۴) انسفالومیلیت پرندگان
- ۴۵- اردک به صورت طبیعی به کدام یک از بیماری ها مبتلا نمی شود؟
 (۱) پاستورلوز
 (۲) EDS
 (۳) اسپرژیلوز
 (۴) آنسفالومیلیت پرندگان
- ۴۶- کدام جراحی پاتولوژیک، شایع ترین جراحی ایجاد شده به دنبال سیتی سمی باکتری اشریشیاکولای می باشد؟
 (۱) پریکاردیت
 (۲) آرتریت - سینوویت
 (۳) پان افتالمیت
 (۴) گرانولومای کبدی
- ۴۷- واگیری زیاد بدون مرگ و میر در پی رخداد کدام یک از بیماری های طیور رایج تر است؟
 (۱) استافیلوکوکوز
 (۲) بوردتلوز
 (۳) کامپیلوباکتریوز
 (۴) سالمونلوز
- ۴۸- کدام عبارت در مورد کریپتوسپوریدیوز نا درست است؟
 (۱) در بورس و کلواک پرنده آلوده یافت می شود.
 (۲) دستگاه تنفسی پرنده را درگیر می کند.
 (۳) سبب آلوده شدن انسان می شود.
 (۴) برای انسان غیر پاتوژن است.
- ۴۹- کدام عبارت در مورد بیماری کم خونی عفونی جوجه ها صحیح تر است؟
 (۱) حساسیت پرندگان مسن تر بیش تر از پرندگان جوان تر است.
 (۲) بیماری فقط از راه دهانی و تنفس منتقل می شود.
 (۳) در اولین بیماری انتقال عمودی وجود ندارد.
 (۴) ویروس از سلول های Buffy Coat و نیز محتویات رکتوم پرنده آلوده جدا می شود.
- ۵۰- مرگ و میر در کدام بیماری می تواند زیاد تر باشد؟
 (۱) نیوکاسل
 (۲) برونشیت عفونی
 (۳) مارک
 (۴) سل مرغی
- ۵۱- دوره ی نهفتگی بیماری در کدام مورد کوتاه تر است؟
 (۱) نیوکاسل
 (۲) آبله
 (۳) لارنگوتراکئیت
 (۴) برونشیت عفونی
- ۵۲- برای ایجاد ایمنی پاسیو در جوجه های جوان علیه بیماری گامبورو (IBD):
 (۱) جوجه های جوان با واکسن کشته IBD و به صورت آشامیدنی واکسینه می شوند.
 (۲) جوجه های جوان با واکسن کشته IBD و به صورت تزریقی واکسینه می شوند.
 (۳) گله های مادر با واکسن کشته IBD و به صورت تزریقی واکسینه می شوند.
 (۴) گله های مادر با واکسن کشته IBD و به صورت آشامیدنی واکسینه می شوند.

- ۵۳- پیشگیری بیماری آنسفالمیلیت پرندگان در جوجه‌ها بر چه اساسی است؟
 (۱) ایمن‌سازی گله مادران در ۱۸-۱۶ هفتگی
 (۲) ایمن‌سازی جوجه‌ها در طی ۳ روز اول زندگی
 (۳) انجام واکسیناسیون تا قبل از پایان هفته سوم
 (۴) واکسیناسیون گله مادری در ۲۸-۲۶ هفتگی
- ۵۴- در بیماری گامبورو کدام جمله صحیح است؟
 (۱) واکسن‌های ساخته شده از سروتیپ I استاندارد حاد در واکسن‌سازی کاربرد ندارد.
 (۲) واکسن‌های موجود در بازار، عمدتاً با استفاده از سروتیپ II که ملایم‌تر است، ساخته می‌شود.
 (۳) با استفاده از تست AGP، می‌تواند سروتیپ‌های گامبورو را از هم تفکیک کرد.
 (۴) واکسن‌های ساخته شده از سروتیپ I کلاسیک، بر علیه ویروس‌های واریانت حفاظت ایجاد نمی‌کنند.
- ۵۵- کدام عبارت صحیح‌تر است؟
 (۱) پلی آرتریت می‌تواند متعاقب کلی سیتی سمی در مرغان رخ دهد.
 (۲) متعاقب عفونت ناشی از ویروس انتریت هموراژیک در بوقلمون، امکان بروز استئومیلیت وجود ندارد.
 (۳) سینوویت از عفونت‌های اولیه ناشی از اشریشیا کلی در پرندگان است.
 (۴) متعاقب هرگونه عفونت موضعی، اشریشیا کلی در بافت‌های سینوویال می‌تواند منجر به بروز استئوآرتریت شود.
- ۵۶- سالپنژیت مرغان توسط کدام مورد می‌تواند به وجود آید؟
 (۱) کمپیلوباکتر ژژونی
 (۲) سالمونلا
 (۳) اشریشیا کولای و کمپیلوباکتر ژنیکولی
 (۴) گسترش اکسودای عفونی به حفره بدن
- ۵۷- به دنبال نخستین تزریق مواد آلوده به ویروس بیماری برونشیت عفونی به تخم‌مرغ‌های جنین‌دار ۱۱-۱۰ روزه
 (۱) ۹۰٪ جنین‌ها تا ۱۹ روزگی بدون عارضه خاصی زنده می‌مانند.
 (۲) ۹۰٪ جنین‌ها تا ۱۹ روزگی با علامت کوتولگی (Dwarfing) تلف می‌شوند.
 (۳) هر چه تعداد پاساژها بیشتر می‌شود، میزان تلفات در جنین‌ها کاهش می‌یابد.
 (۴) مشاهده رسوب اورات در مجرای مزونفروس جنین علامت اختصاصی آلودگی با ویروس برونشیت عفونی است.
- ۵۸- کدام بیماری در ارتباط با ویژگی‌های واکسن‌های زنده صحیح نمی‌باشد؟
 (۱) نگهداری واکسن‌های زنده در مقایسه با واکسن‌های غیرفعال، دشوارتر است.
 (۲) اثر واکسن‌های زنده ممکن است تحت تأثیر پادتن‌های مادری کاهش یابد.
 (۳) تجویز واکسن‌های زنده موجب ایجاد ایمنی یکنواخت و با دوام می‌شود.
 (۴) میکروارگانسیم‌های مورد استفاده برای تهیه واکسن، می‌توانند از پرنده واکسینه شده به سایر افراد گله انتقال یابند.
- ۵۹- کدام پرنده در مقابل ویروس مارک مقاوم است؟
 (۱) بوقلمون
 (۲) ماکیان
 (۳) اردک
 (۴) قرقاول
- ۶۰- کدام انگل خونی در پرندگان معمولاً با علائم بالینی واضح‌تر و شدیدتری همراه است؟
 (۱) Leukocytozoon
 (۲) Haemoproteus
 (۳) Plasmodium
 (۴) Cryptosporidium
- ۶۱- در کدام زمان ضد عفونی تخم‌مرغ‌ها در ستر امکان دارد؟
 (۱) ۹۶ ساعت اول
 (۲) ۲۴ ساعت اول
 (۳) ۲۴ تا ۹۶ ساعت اول
 (۴) روز ۱۷ انکوباسیون
- ۶۲- ردآیلند رد و نیوهمشایر از نظر بهره‌دهی جزء کدام دسته طبقه‌بندی می‌شوند؟
 (۱) زینتی
 (۲) تخم‌گذار
 (۳) گوشتی
 (۴) گوشتی - تخم‌گذار

- ۶۳- درجه حرارت اتاق ذخیره‌سازی تخم‌مرغ و سالن ستر به ترتیب از راست به چپ حدود چند درجه سانتی‌گراد است؟
 (۱) ۲۵-۳۷/۵ (۲) ۱۵-۲۵ (۳) ۲۵-۳۷/۵ (۴) ۱۵-۳۷/۵
- ۶۴- به‌طور معمول ovulatory cycle در ماکیان چند ساعت طول می‌کشد؟
 (۱) ۲۵-۲۶ (۲) ۱۰-۱۲ (۳) ۲۰-۲۲ (۴) ۳۰-۳۲
- ۶۵- بزرگ شدن قلب، به‌خصوص بطن راست، آسیت و افزایش فیبرین در حفرات بدن و بر روی کپسول کبد از عوارض افزایش مصرف چیست؟
 (۱) سدیم (۲) پتاسیم (۳) منگنز (۴) مس
- ۶۶- کدام گزینه به ترتیب موجب بروز آنمی ماکروسیتیک می‌شوند؟
 (۱) اسید فولیک، آهن (۲) پیریدوکسین (ب۶)، کوبالامین
 (۳) کوبالامین (ب۱۲)، اسید فولیک (۴) آهن، پیریدوکسین
- ۶۷- کدام یک در پیگمانتاسیون پره‌ای رنگی نقش ندارد؟
 (۱) روی (۲) آهن (۳) مس (۴) اسید فولیک
- ۶۸- عارضه Clubbed down در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد می‌شود؟
 (۱) C (۲) B_۶ (۳) B_۶ (۴) A
- ۶۹- در جیره آغازین فرموله شده برای جوجه‌های گوشتی بر اساس Corn-soy. اضافه نمودن کدام اسید آمینه به جیره، کاملاً ضروری است؟
 (۱) فنیل آلانین (۲) لیزین (۳) تریپتوفان (۴) متیونین
- ۷۰- بحرانی‌ترین مرحله در الگوی طبیعی مرگ و میر جنین چه زمانی است؟
 (۱) هشت تا هجده روزگی جنینی (۲) مرحله پیش تخمک‌گذاری
 (۳) یک تا سه روزگی جنینی (۴) سه روز آخر جنینی (۱۹-۲۰-۲۱)
- ۷۱- نیمه عمر تیترا پادتن نیوکاسل در گله‌های گوشتی چند روز محاسبه می‌شود؟
 (۱) ۳/۵ (۲) ۳ (۳) ۴/۵ (۴) ۴
- ۷۲- در جوجه‌های تازه هچ شده، کدام یک از ایمونوگلوبولین‌ها در روده و کدام یک در خون یافت می‌شوند؟
 (۱) IgA, IgG در خون - IgM در روده (۲) IgA, IgG در روده - IgM در خون
 (۳) IgA, IgM در روده - IgG در خون (۴) IgM, IgG در خون - IgA در روده
- ۷۳- در کدام فرم بیماری لکوز اندام‌ها به رنگ قرمز گیلانی مشاهده می‌شود؟
 (۱) میلوبلاستوز (۲) لکوز لنفوئید (۳) میلوسیتوز (۴) اریتروبلاستوز
- ۷۴- حضور ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A به ترتیب در کدام یک از منابع زیر محتمل‌تر است؟
 (۱) صفرا - زرده - سطوح موکوسی (۲) زرده - سرم - صفرا
 (۳) سطوح موکوسی - زرده - سرم (۴) زرده - صفرا - سرم
- ۷۵- متاپنومو ویروس عامل ایجادکننده سندروم تورم سر در ماکیان با ویروس عامل کدام بیماری هم خانواده است؟
 (۱) نیوکاسل (۲) برونشیت عفونی
 (۳) لارنگوتراکئیت عفونی (۴) آنفلونزای پرندگان
- ۷۶- ویروس عامل ایجادکننده کدام بیماری پوشش (Envelope) ندارد؟
 (۱) آنفلونزای پرندگان (۲) نیوکاسل
 (۳) برونشیت عفونی (۴) گامبورو

- ۷۷- کدام ارگان، در کالبدگشایی پرندگان تلف‌شده از بیماری مارک، تغییرات ماکروسکوپیک و ظاهری قابل مشاهده ندارد؟
 (۱) پوست (۲) تخمدان (۳) مغز (۴) چشم
- ۷۸- کدام گزینه در ارتباط با تابلوی کالبدگشایی یک گله طیور گوشتی مبتلا به کم‌خونی عفونی ماکیان درست است؟
 (۱) آتروفی ملایم یا عدم آتروفی بورس، آتروفی شدید تیموس، خونریزی‌های زیر جلدی و عضلانی
 (۲) آتروفی شدید بورس، آتروفی شدید تیموس، خونریزی‌های در سطح موکوس پیش معده
 (۳) آتروفی شدید بورس، آتروفی ملایم یا عدم آتروفی تیموس، خونریزی در سطح موکوس پیش معده
 (۴) آتروفی ملایم یا عدم آتروفی بورس، آتروفی ملایم یا عدم آتروفی تیموس، خونریزی‌های زیرجلدی و عضلانی
- ۷۹- در بیماری **Black head** بوقلمون چه ضایعه‌ای ایجاد می‌شود؟
 (۱) گاستروانتریت (۲) انتروهپاتیت (۳) انتروکولیت (۴) کولانژیوهپاتیت
- ۸۰- انسفالومالاسی، ادم زیر جلدی و دیستروفی عضلانی ناشی از کمبود کدام ماده در طیور است؟
 (۱) کمبود نیاسین (۲) کمبود ویتامین B_۶ (۳) کمبود تیامین (۴) ویتامین E
- ۸۱- در کدام باکتری تاژک پری پلاسمیک وجود دارد؟
 (۱) کلبسیلا (۲) سالمونلا (۳) اسپروکت (۴) پاستورلا
- ۸۲- کدام ویروس دارای آنتی‌ژن‌های هم‌انگوتینین در پوشش خارجی ویروس یا انولوپ هستند؟
 (۱) ویروس بیماری لکوز (۲) ویروس بیماری مارک
 (۳) ویروس سندروم افت تولید (۴) ویروس بیماری گامبورو
- ۸۳- ردبایی کدام یک از ایمونوگلوبین‌ها در خون و مخاطات طیور نشان می‌دهد که اخیراً با ویروس یا واکنش تماس داشته‌اند؟
 (۱) IgY (۲) IgM (۳) IgG (۴) IgA
- ۸۴- کدام عامل بیماری ویروسی طیور نسبت به دما، شرایط محیطی و ضد عفونی‌کننده‌های معمول در مرغداری‌ها حساس‌تر است؟
 (۱) نیوکاسل (۲) گامبورو
 (۳) کم‌خونی عفونی جوجه (۴) سندرم افت تولید تخم‌مرغ
- ۸۵- کدام گزینه در مورد پیکنوز و کاریولیز درست است؟
 (۱) هر دو از اجسام داخل سیتوپلاسم هستند.
 (۲) هر دو در هسته سلول رخ می‌دهد.
 (۳) هر دو در سیتوپلاسم سلول رخ می‌دهد.
 (۴) اولی در هسته و دومی در سیتوپلاسم سلول رخ می‌دهد.
- ۸۶- در مورد نماتدهای پرندگان کدام عبارت صحیح‌تر است؟
 (۱) کاپیلاریا آنولاتا انگل مری و چینه‌دان پرندگان است.
 (۲) هتراکیس گالیناروم انگل دوازدهه پرندگان است.
 (۳) اسکاریدیا گالی انگل پیش معده پرندگان است.
 (۴) سنگاموس تراکته انگل روده کور پرندگان است.
- ۸۷- در آرتريت مفصلی مشاهده شده در یک گله مرغ مادر گوشتی، باکتری استافیلوکوکوس جدا شده است. کدام آزمون بیوشیمیایی برای تفریق استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؟
 (۱) ایندول (۲) اکسیداز (۳) کاتالاز (۴) کوآگولاز
- ۸۸- غلظت سرمی کدام اجزای سیستم کمپلمان از سایر اجزای آن بیشتر است؟
 (۱) C_۵ (۲) C_۲ (۳) C_۳ (۴) C_۹

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - کد (۲۷۰۸) 214E

۸۹- به منظور جداسازی باکتری *Pasturella multocida* کشت اولیه از نمونه‌ها روی چه محیط یا محیط‌های به‌طور

هم‌زمان انجام می‌شود؟

(۱) ژلز خون‌دار و مک کانکی

(۲) مک کانکی و SS

(۳) مک کانکی و TSI

(۴) محیط مک کانکی و اوره

۹۰- غده مولد کف در چه پرنده‌ای وجود دارد؟

(۱) بوقلمون

(۲) بلدرچین

(۳) کبوتر

(۴) قناری

